

1) Identifique entre las siguientes la afirmación verdadera respecto a las lesiones microquísticas.

- a) Son típicas de las malformaciones linfáticas axilares.
- b) Son las malformaciones linfáticas que más habitualmente se presentan en la clínica.
- c) Su respuesta a la esclerosis con Picibanil es rápida y efectiva.
- d) Requieren frecuentemente cirugía por su baja respuesta a la esclerosis.
- e) El agente más efectivo es la doxiciclina.

2) Señale la respuesta INCORRECTA en relación con las malformaciones linfáticas cervicofaciales.

- a) Suelen presentarse en la región parotídea o submandibular.
- b) Lo habitual es que sea unilateral y de naturaleza macroquística.
- c) En la boca suele combinarse con lesiones venosas o capilares.
- d) El diagnóstico diferencial se establece con el de tumores del cuello.
- e) El lado derecho es el que se ve afectado con más frecuencia.

3) Señale cuál debe ser la pauta de seguimiento tras la esclerosis de una malformación linfática resuelta sin incidencias.

- a) Primera revisión a las 2 semanas, seguida de otra un mes después y de control de imagen a los 6 meses.
- b) Primera revisión a las 24 horas, seguida de otra una semana después y de control de imagen al mes.
- c) Ecografía a las 2 semanas, seguida de revisión con resonancia magnética a los 6 meses.
- d) Primera revisión a las 4 semanas, con control de imagen, y revisión clínica a los 3 meses.
- e) Primera revisión a las 2 semanas, con control de imagen, y revisión clínica a los 6 meses.

4) Señale la respuesta INCORRECTA respecto al papel del estudio electrofisiológico en la cirugía de las malformaciones linfáticas.

- a) Hay que utilizarlo siempre en los casos que haya posible afectación nerviosa.

- b) Debemos utilizar electrobisturías bipolares.
- c) No es necesario utilizarlo salvo en las malformaciones linfáticas faciales.
- d) Se debe utilizar antes, durante o después de la operación cuando existe afectación nerviosa.
- e) Su uso reduce las posibles secuelas derivadas de la intervención.

5) Señale la afirmación verdadera respecto a las malformaciones linfáticas intraabdominales.

- a) Pueden aparecer tanto en la cavidad peritoneal como en el retroperitoneo.
- b) Son lesiones exclusivas del mesenterio.
- c) Son mucho más frecuentes en el borde antimesentérico del intestino.
- d) El lugar más frecuente de aparición es el espacio pélvico.
- e) Los quistes suelen ser de pequeño tamaño.

6) Identifique entre las siguientes la afirmación verdadera respecto a la forma de presentación de las malformaciones linfáticas.

- a) Las formas macroquísticas se observan preferentemente en la región cervical.
- b) Son más frecuentes en la parte inferior del cuerpo.
- c) Se suelen acompañar de otras malformaciones venosas.
- d) No se observan dentro de las cavidades corporales.
- e) Son lesiones exclusivamente de aparición neonatal o en lactantes.

7) Existen varios motivos por los que debemos tratar las malformaciones linfáticas. Señale cuál de los siguientes NO es uno de ellos.

- a) Pueden infectarse.
- b) Pueden sangrar.
- c) Producen alteraciones anatómicas.
- d) Producen alteraciones psicológicas.

- e) Pueden involucionar en el tiempo.

8) Señale la afirmación verdadera respecto a la doxiciclina en el tratamiento de la esclerosis de malformaciones linfáticas.

- a) Se comercializa en forma de polvo en viales de 1 mg.
- b) Su acción es más lenta que la de la bleomicina, pero tiene una eficacia similar.
- c) Su inyección es muy dolorosa y requiere mayores dosis de analgésicos.
- d) El éxito global medio de eficacia es igual al de Picibanil.
- e) Es un fármaco caro y difícil de encontrar.

9) Señale la afirmación verdadera respecto al tratamiento quirúrgico de las malformaciones linfáticas.

- a) Ha sido y sigue siendo el tratamiento definitivo.
- b) Es una intervención sencilla, dado que se trata de lesiones quísticas.
- c) Es el tratamiento de elección para las lesiones macroquísticas.
- d) Es imprescindible la realización de una resonancia magnética.
- e) La ecografía es suficiente para planificar la cirugía.

10) Señale la respuesta correcta en relación con el método de inyección del agente esclerosante.

- a) En niños se lleva a cabo habitualmente con anestesia local.
- b) Se realiza guiada por TC.
- c) La aguja debe ser de tipo palomilla de 23 G o de 25 G.
- d) La utilización de un medio de contraste es fundamental para ver la lesión.
- e) La ecografía entraña un elevado riesgo de fracaso.