

MODULO 2 URGENCIAS

En el shock hipovolémico la dobutamina se administración en una dosis de:

Seleccione una:

- a. Si TAS mayor que 90 mm Hg. 250 mg + 230 ml SG5% a 21 ml/h. ✓
- b. Si TAS menor que 100 mm Hg. 250 mg + 235 ml SG/dx5% a 21 ml/h.
- c. 250 ml + 230 ml SG/dx 5% a 40 ml/h.
- d. Si TAS = 90 mm Hg. 150 mg + 250 ml SSF 0.9% a 50 ml/h.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Primera medida ante paciente con sospecha de cetoacidosis diabética:

Seleccione una:

- a. Valorar ABCD. ✓
- b. Hacer glucemia capilar.
- c. Buscar cuerpos cetónicos.
- d. Administrar dextrosa/glucosa.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual de las siguientes medicaciones antihipertensivas no se recomienda se administre en perfusión continua:

Seleccione una:

- a. Labetalol.
- b. Urapidilo.
- c. Nitroglicerina.
- d. Hidralacina. ✓

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una alcalosis implica:

Seleccione una:

- a. Descenso del Ph.
- b. Aumento del Ph. ✓
- c. Intoxicación por pilar alcalina AAA.
- d. Descenso del la PIC.

Pregunta 5

Incorrecta


Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la escala de NIHSS, que puntuación se le asigna a un paciente con sospecha de ICTUS, si es capaz de decirnos en que mes estamos o su edad:

Seleccione una:

- a. 1.
- b. 0. 
- c. 3.
- d. 2.

Pregunta 6

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Son contraindicaciones para usar sueros glucosados:

Seleccione una:

- a. TCE e hipertensión intracraneal. 
- b. Hipoglucemia y ansiedad.
- c. Ansiedad e hipoglucemia.
- d. Hipertensión e hipoglucemia.

Pregunta 7

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el shock hipovolémico la dopamina se administración en una dosis de:

Seleccione una:

- a. 200mg + 245 ml SG/Dx5% o SSF 0,9 a ritmo mayor o igual que 10µgr/kg/min = 21 ml/h.
- b. 200ml + 245 ml SG/Dx5% o SSF 0,9 a ritmo mayor o igual que 10µgr/kg/min = 21 ml/h. 
- c. 70 gr.
- d. 100mg+100 ml de SSF 0.9%.

Pregunta 8

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Siguiendo las últimas recomendaciones de tratamiento del Síndrome Coronario Agudo, la saturación de oxígeno del paciente deberá estar:

Seleccione una:

- a. Entre 95% y 100%.
- b. Entre 90% y 95%. 
- c. En 90%.
- d. En 100%.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es un objetivo al colocar una Sonda Nasogástrica (SNG) en el contexto de una posible hemorragia digestiva:

Seleccione una:

- a. Cuantificar perdidas de volemia.
- b. Confirmar sangrado/diagnostico.
- c. Garantizar alimentación y toma de medicación. ✓
- d. Proteger vía aérea.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es un signo de complicación en un cólico reno ureteral:

Seleccione una:

- a. Fiebre. ✓
- b. Vómitos.
- c. Dolor.
- d. Disuria.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una acidosis implica:

Seleccione una:

- a. Descenso del Ph. ✓
- b. Hipotensión - Bradicardia - Bradipsiquia.
- c. Aumento del Ph.
- d. Triplicar la PCO₂.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que medicación, aún no siendo analgésico puro, alivia el dolor tipo cólico en un cuadro intestinal o urinario:

Seleccione una:

- a. Paracetamol.
- b. Ancha fibrin.
- c. Buscapina. ✓
- d. Nolotil.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El patrón de Cheyne-Stokes es:

Seleccione una:

- a. Un patrón Electrocardiografico.
- b. Respiratorio. ✓
- c. Diabético.
- d. Urinario.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La clasificación de Killip ordena:

Seleccione una:

- a. La única clasificación de Killip es la que junto a Kimbal, clasifica la relación de Insuficiencia Cardíaca con Síndrome Coronario Agudo de mayor a menor, de tal forma que "I" es Shock Cardíaco y "IV" infarto NO complicado
- b. El origen de la Insuficiencia Cardíaca.
- c. El grado y tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca. ✓
- d. Los bloqueos aurículo-ventriculares de 2º grado

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La FiO₂ máxima que obtendremos con una mascarilla venturi a 15 lpm será de:

Seleccione una:

- a. 1.
- b. 0,8.
- c. 50%-60%. ✓
- d. 27%-31%.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es una solución cristalinoide hipertónica:

Seleccione una:

- a. Ringer Lactato. ✓
- b. Bicarbonato 1M.
- c. Glucosa 20%.
- d. Salino al 7,5 %.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En que rango debe estar el PH en sangre arterial para considerarlo normal:

Seleccione una:

- a. De 7,35 a 7,45. ✓
- b. Entre 7 y 8.
- c. De 7,05 a 7,25.
- d. Entre 6 y 7.

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El principal riesgo de una crisis asmática que no cede, es:

Seleccione una:

- a. Los vomitos. ✗
- b. El agotamiento.
- c. La infección.
- d. El mareo.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De los siguientes, cual es un síntoma diferenciador del vértigo:

Seleccione una:

- a. Nauseas.
- b. Cefalea.
- c. Malestar general.
- d. Mareo con giro de objetos. ✓

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Tratamiento de elección ante sospecha de úlcera en un dolor abdominal:

Seleccione una:

- a. Omeprazol.
- b. Ondansetron.
- c. Buscapina.
- d. Omeprazol y Ranitidina. ✓

[Finalizar revisión](#)

CASO CLINICO

Hombre de 70 años con EPOC, llega a urgencias con mal estado general, disnea, palidez, sudoración, ...

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
No marcadasMarcar pregunta
Texto de la pregunta
Valorar primero

Seleccione una:
a. A-B-C-D. Correcta
b. Pulsioximetria.
c. Frecuencia respiratoria.
d. Tiraje.

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
No marcadasMarcar pregunta
Texto de la pregunta
Si no esta consciente:

Seleccione una:
a. Valorar hipercapnia.
b. VMNI.
c. Algoritmo SVA. Correcta
d. VMI.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
No marcadasMarcar pregunta
Texto de la pregunta
Si está consciente, es criterio de gravedad:

Seleccione una:
a. La cianosis intensa. Correcta
b. Tolera el decubito supino.
c. Mantiene una conversación fluida.
d. Deambula sin esfuerzo.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
No marcadasMarcar pregunta
Texto de la pregunta
No nebulizar:

Seleccione una:
a. Salbutamol.
b. Bromuro de ipatropio.
c. Budesonida.
d. Adrenalina. Correcta

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
No marcadasMarcar pregunta
Texto de la pregunta
No administrar de inicio:

Seleccione una:
a. Antitermico si fiebre.
b. Protectores gastricos.

c. Antibioticos Correcta

d. Corticoides.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La dosis del salbutamol será:

Seleccione una:

a. De 2,5 a 5 mg según FC. Correcta

b. de 10mg.

c. 1 ampolla.

d. 7,5 mg.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La dosis de bromuro de ipatropio será:

Seleccione una:

a. 100 microgr

b. 250 microgr.

c. 500 microgr. Correcta

d. 600 microgr.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La dosis de budesonida será:

Seleccione una:

a. 0,5 mg.

b. 1 mg. Correcta

c. 2 mg.

d. 5 mg.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La dosis de hidrocortisona será:

Seleccione una:

a. 2 mg /kg. Correcta

b. 1 mg/kg.

c. 100 mg.

d. 500 mg.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Tras el primer tratamiento y atención, reevaluar a los

Seleccione una:

a. 5 minutos.

- b. 10-15 minutos. Correcta
 - c. 30 minutos.
 - d. 60 minutos.
- Finalizar revisión