

TEST: Aplicación integrada del proceso de la vacunación en la atención a los cuidados de la población

Pregunta 1

La expresión "(00186) Disposición para mejorar el estado de inmunización" es un:

Seleccione una:

- a. Diagnóstico de enfermería: Diagnóstico de salud
- b. Diagnóstico de enfermería: Diagnóstico real. **Incorrecta**
- c. Diagnóstico de enfermería: Diagnóstico de riesgo.
- d. Proceso vital de cuidados. **Incorrecta**

Retroalimentación

Los diagnósticos de salud compatibles con el PVC inmunización son: - (00186) Disposición para mejorar el estado de inmunización.

Pregunta 2

¿Cuándo se administró la primera vacuna de viruela?

Seleccione una:

- a. 200 a C en las regiones de India y China.
- b. **Hace más de 200 años fue cuando Edward Jenner administró la primera vacuna de viruela.**
- c. No ha existido vacuna de viruela, es una enfermedad que se erradicó sin necesidad de vacunarse.
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

Pregunta 3

¿Cómo se denomina a aquellas vacunas que presentan distintos tipos antigénicos, que corresponden a una misma especie?

- a. **Vacunas polivalentes. Correcta**
- b. Vacunas recombinantes.
- c. Vacuna multipatógena.
- d. Vacuna de síntesis.

Pregunta 4

Respecto al mantenimiento de la temperatura de la nevera señale la opción correcta:

- a. La temperatura de la nevera tiene que estar en 2°C y 8°C.
- b. No se deben utilizar los frigoríficos tipo no frost.
- c. En el estante inferior, colocar las botellas de agua y/o de suero fisiológico para mantener la temperatura en caso de avería o corte de suministro.
- d. **Todas son correctas.**

Pregunta 5

La siguiente definición: "problemas, situaciones o etapas vitales que pueden generar respuestas humanas disfuncionales que precisen la puesta en marcha de planes de cuidados para resolver o controlar el problema o sus manifestaciones" corresponde al término:

- a. **Proceso vital de cuidados.**
- b. Diagnóstico de enfermería.
- c. Intervención enfermera.
- d. Diagnóstico de salud.

Pregunta 6

Según la composición de las vacunas estas pueden ser:

- a. De gérmenes vivos.
- b. De gérmenes atenuados.
- c. Recombinantes.

TEST: Aplicación integrada del proceso de la vacunación en la atención a los cuidados de la población

d. Monovalentes.

Pregunta 7

¿Cuándo fue erradicada la viruela?

- a. 8 de mayo de 1980 Correcta
- b. 8 de mayo de 1880
- c. 8 de mayo de 1990
- d. No se ha erradicado.

Pregunta 8 **todas son incorrectas....**

Sobre consideraciones generales de las vacunas señale la respuesta correcta:

- a. Todas las vacunas pueden aplicarse en el mismo momento y en el mismo sitio anatómico.
- b. Una vacuna de gérmenes vivos atenuados debe aplicarse o en la misma sesión o separadas de otras 3 semanas de otra vacuna de virus vivos.
- c. Durante el embarazo está indicada la vacunación, debe evitarse en el tercer trimestre de embarazo.
- d. En caso de administración de tratamiento anticoagulado la vía de administración será la intradérmica.

Pregunta 9

¿Qué tipo de prevención nace ante la necesidad de controlar la iatrogenia de la propia medicina?

- a. Prevención primaria.
- b. Prevención secundaria.
- c. Prevención terciaria.
- d. **Prevención cuaternaria.**

Pregunta 10

Respecto a los efectos adversos locales señale la respuesta incorrecta:

- a. Suelen aparecer a las 48 horas de la inyección. **Incorrecta**
- b. Los más comunes son enrojecimiento, edema, induración...
- c. Los más comunes son fiebre, dolor, malestar general...
- d. Estos efectos ceden a los pocos días espontáneamente.

Pregunta 11

¿Qué se define como el resultado de dividir el número de personas (numerador) a los que se les ha administrado una determinada vacuna, entre las personas (denominador) a las que se les debería haber administrado?

- a. Índice vacunal.
- b. Cobertura poblacional.
- c. Estado vacunal.
- d. **Ninguna de las opciones es correcta.**

Pregunta 12

¿Cuánto tiempo debe dejarse para la administración entre dos vacunas de gérmenes vivos si no se ponen al mismo tiempo?

- a. **4 semanas.**
- b. 6 semanas.
- c. 8 semanas.
- d. Es indiferente.

TEST: Aplicación integrada del proceso de la vacunación en la atención a los cuidados de la población

Pregunta 13

¿A qué se refiere la siguiente definición “aquella sustancia que potencia la respuesta inmunitaria frente a un antígeno específico prolongando el efecto inmunogénico”?

- a. Adyuvante.
- b. Dosis de refuerzo.
- c. Antígeno.
- d. Toxoide.

Pregunta 14

¿Cuál fue la siguiente vacuna a la de la viruela que generó un gran avance en este tema?

- a. Varicela. **Incorrecta**
- b. Poliomielitis.
- c. Tos ferina.
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 15

¿Qué calendario se debe aplicar en caso tener un niño o adolescente que no recibe las vacunas contempladas en el calendario oficial de vacunaciones a la edad recomendada?

- a. Calendario infantil.
- b. Calendario sistemático.
- c. Calendario acelerado.
- d. Calendario de adultos.

Pregunta 16

¿Cuáles de las siguientes vacunas presentan más riesgo de afectación por la exposición solar?

- a. Triple vírica.
- b. Varicela.
- c. Gripe.
- d. Todas son correctas.

Pregunta 17

Sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano, señale la respuesta incorrecta:

- a. La vacuna de serotipos 16 y 18 está indicada para mujeres entre 10 y 55 años.
- b. La vacuna de serotipos 6, 11, 16 y 18 está indicada para mujeres de 9 a 26 años.
- c. La vacuna de serotipos 6, 11, 16 y 18 está indicada para mujeres de 10 a 55 años.
- d. La forma de administración es intramuscular.

Pregunta 18

Señale la opción correcta sobre la situación de la polio en España:

- a. La cobertura vacunal en España de la polio es mayor del 90 %.
- b. El último brote autóctono fue a finales de los años 80.
- c. A y B son correctas.
- d. Ninguna es correcta.

TEST: Aplicación integrada del proceso de la vacunación en la atención a los cuidados de la población

Pregunta 19

Respecto a la prevención terciaria señale la respuesta correcta:

- a. El concepto de prevención terciaria nace con características propias, ante la necesidad de controlar la iatrogenia de la propia medicina.
- b. En este caso las intervenciones del personal sanitario irán dirigidas a aquellas personas que ya presentan la enfermedad pero están asintomáticas.
- c. Este primer tipo de intervención va dirigido a todos aquellos individuos sanos con el fin de evitar posibles enfermedades evitables y sus consecuencias.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.**

Pregunta 20

La siguiente definición aportada por la OMS en 1988 “Son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o condicionantes” pertenece a:

- a. Prevención primaria.**
- b. Prevención secundaria.
- c. Prevención terciaria.
- d. Prevención cuaternaria.