

Exámen caso práctico II Agentes Citostáticos**Revisión del intento 1**[Finalizar revisión](#)

Comenzado el	miércoles, 28 de enero de 2015, 18:04
Completado el	miércoles, 28 de enero de 2015, 18:06
Tiempo empleado	1 minutos 48 segundos
Puntos	15/15
Calificación	10 de un máximo de 10 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

1 Añadir condimentos, tipo limón u orégano, a los alimentos suele ser otra de las recomendaciones frecuentes para prevenir náuseas y vómitos.

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- a. Verdadero. ✓
- b. Falso. ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

2 Acostarse justo después de las comidas es aconsejable para mejorar el tránsito digestivo y prevenir así vómitos.

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- a. Verdadero. ✗
- b. Falso. ✓

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

3 Algunas medidas, como mantener un ambiente limpio y ventilado durante las comidas ayudan a evitar náuseas y vómitos.

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- a. Falso. ✗
- b. Verdadero. ✓

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

4 Aumentar la ingesta de líquidos suele aliviar las náuseas y vómitos asociadas al tratamiento con quimioterapia.

Puntos: 1
Seleccione una respuesta.
 a. Falso. ✘
 b. Verdadero. ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

5 Puntos: 1
Como regla general, una hora después de vomitar, se aconseja la ingesta de líquidos en pequeñas cantidades.

Seleccione una respuesta.
 a. Falso. ✘
 b. Verdadero. ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

6 Puntos: 1
Con un tratamiento antiemético adecuado la mayoría de los pacientes controlan adecuadamente las náuseas y vómitos asociadas al tratamiento con quimioterapia.

Seleccione una respuesta.
 a. Verdadero. ✘
 b. Falso. ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

7 Puntos: 1
Dependiendo del momento de instauración de la emesis, podemos hablar de emesis aguda, retardada o anticipada.

Seleccione una respuesta.
 a. Verdadero. ✔
 b. Falso. ✘

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

8 Puntos: 1
El aumento de la ingesta de grasas en la dieta diaria suele contribuir a un mejor control de las náuseas.

Seleccione una respuesta.
 a. Verdadero. ✘
 b. Falso. ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

9 Puntos: 1
Entre los cuidados aconsejados para prevenir las náuseas asociadas al tratamiento con quimioterapia no se encuentra hacer comidas frecuentes.

Seleccione una respuesta.
 a. Falso. ✔
 b. Verdadero. ✘

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

10 La administración de laxantes pautados es una medida eficaz para el control del estreñimiento.

Puntos:

1

Seleccione una respuesta. a. Falso. ✘ b. Verdadero. ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

11 La emesis aguda es la que aparece en el mes siguiente a la administración del tratamiento con quimioterapia.

Puntos:

1

Seleccione una respuesta. a. Falso. ✔ b. Verdadero. ✘

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

12 La emesis anticipada es la que se presenta antes de la administración del tratamiento quimioterápico.

Puntos:

1

Seleccione una respuesta. a. Verdadero. ✔ b. Falso. ✘

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

13 Las náuseas son una sensación desagradable que en ocasiones suele preceder al vómito.

Puntos:

1

Seleccione una respuesta. a. Verdadero. ✔ b. Falso. ✘

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

14 Los antieméticos no se deben tomar de forma programada, reservándolos para cuando aparecen las náuseas y vómitos.

Puntos:

1

Seleccione una respuesta. a. Falso. ✔ b. Verdadero. ✘

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

15 Se aconseja aprovechar el momento del día que mayor apetito se tiene para tomar aquellos alimentos más proteicos.

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- a. Falso. ✘
- b. Verdadero. ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

Finalizar revisión

Usted se ha autenticado como [JUAN MARTINEZ MORALES](#) (Salir)

AMAC