

Comenzado el	jueves, 26 de septiembre de 2019, 02:20
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 26 de septiembre de 2019, 03:09
Tiempo empleado	49 minutos 13 segundos
Puntos	19,00/20,00
Calificación	9,50 de un máximo de 10,00 (95%)
Comentario -	Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es la dosis de Amioradona que se administra tras la 5ª descarga en PCR-A:

Seleccione una:

- ☐ a. 300 mg.
- ☐ b. 120 mg.
- ☒ c. 150 mg. ✓
- ☐ d. 200 mg.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es el valor de APGAR del niño sano:

Seleccione una:

- ☒ a. Entre 7 a 10. ✓
- ☐ b. De 3 a 5.
- ☐ c. De 10 a 12.
- ☐ d. 8.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

En la comprobación de la respiración en RCP básica usamos la fórmula:

Seleccione una:

- ☒ a. Veo-Oigo-Siento. ✓
- ☐ b. Ver-Oir-Saber.
- ☐ c. A-B-C.
- ☐ d. START.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es el ciclo correcto de desfibrilación con un equipo bifásico en caso de PCR desfibrilable:

Seleccione una:

- ☐ a. Entre 150-360 julios la primera y las sucesivas entre 120-200 julios.
- ☒ b. Entre 150-200 julios la primera y las sucesivas entre 150-360 julios. ✓
- ☐ c. 360 julios.
- ☐ d. 200 julios.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuánto julios programaremos en la primera descarga, para desfibrilar en RCP-A con un equipo bifásico?

Seleccione una:

- ☐ a. 100-120 Julios.
- ☐ b. 500 watios.
- ☐ c. 150-360 Julios.
- ☒ d. 150-200 Julios. ✓

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

A que potencia se dan las descargas en un desfibrilador manual monofásico en caso de PCR por TVSP y/o FV:

Seleccione una:

- ☒ a. 360 julios. ✓
- ☐ b. 120 julios.
- ☐ c. 150 julios.
- ☐ d. 200 julios.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

No se considera donación en asistolia controlada:

Seleccione una:

- ☐ a. Pacientes a la espera del paro cardiaco.
- ☐ b. Pacientes con paro cardiaco y muerte encefálica en hospital.
- ☒ c. Pacientes con resucitación extrahospitalaria infructuosa. ✓
- ☐ d. Pacientes con paro cardiaco y muerte encefálica antes de quirófano.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

En la PCR Pediátrica, con respecto a la de adulto, aparece:

Seleccione una:

- ☒ a. Las 5 respiraciones de rescate antes de iniciar RCP. ✓
- ☐ b. La apertura de la vía aérea con subluxación mandibular.
- ☐ c. El uso del cardiocompresor automático de forma precoz.
- ☐ d. El golpe precordial.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

En que momento se administrarán 300mg de Amioradona en una PCR-A:

Seleccione una:

- ☐ a. Tras la 2ª descarga.
- ☐ b. Tras la 3ª adrenalina.
- ☒ c. Tras la 3ª descarga. ✓
- ☐ d. Tras la 4ª descarga con desfibriladores monofásicos y la 5ª en bifásicos.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

Que haremos ante una PCR extrahospitalaria, si formamos parte del equipo de soporte vital avanzado que está atendiendo el aviso:

Seleccione una:

- ☒ a. Informar al centro coordinador o central. ✓
- ☐ b. Pedir un DESA/DEA.
- ☐ c. Solicitar servicio de bomberos de apoyo.
- ☐ d. Llamar al 061.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

No es una mejora a valorar en la RCP-A:

Seleccione una:

- ☐ a. Ecografía.
- ☐ b. Compresor torácico mecánico.
- ☐ c. RCP-ECMO Extracorporea.

- ☐ d. Hipertermia controlada. ✓

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

No es un cuidado post-parada:

Seleccione una:

- ☐ a. Vía aérea avanzada.
- ☐ b. Control de temperatura.
- ☐ c. Mantener oxigenación.
- ☐ d. Retirar capnografía. ✓

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es el tiempo máximo en el que debe poder llegar un paciente al hospital, para poder considerarlo donante, desde que se inicio la PCR:

Seleccione una:

- ☐ a. 60 minutos.
- ☐ b. 240 minutos.
- ☐ c. 120 minutos. ✓
- ☐ d. De 100 a 120 minutos.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

En el caso de que aparezcan signos evidentes de isquemia en el ECG de un paciente en fase post-parada, deberemos:

Seleccione una:

- ☐ a. Ignorarlos, es secundario a la RCP.
- ☐ b. Hacer una angiografía coronaria urgente. ✓
- ☐ c. Inducir una hipotermia severa.
- ☐ d. Tratar las tiritonas que causan los cambios en el ECG.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

Las cinco "H" que definen las PCR reversibles son:

Seleccione una:

- ☐ a. 1)Hipovolemia 2)Hipotermia 3)Hipotiroidismo 4)Hipopotasemia 5)Hiperpotasemia.

☐ b. 1)Hipovolemia 2)Hipotermia 3)Hipotiroidismo 4)Hipopotasemia 5)Hipertermia.

☐ c. 1)Hipovolemia 2)Hipoxia 3)Hidrogeniones (acidosis) 4)Hipo e Hiper potasemia

5)Hipotermia. ✓

☐ d. Son sólo 4 "H": 1) Hipoxia. 2) Hipovolemia. 3) Hipo/Hipertermia. 4) Hipo/Hipermetabólicas.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cada cuantos minutos podemos administrar Adrenalina en un PCR?

Seleccione una:

☐ a. De 1 a 2 minutos.

☒ b. De 3 a 5 minutos. ✓

☐ c. Cada 10 minutos.

☐ d. De 10 a 15 minutos.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

Quien es el "gran olvidado" en la RCP básica instrumental y avanzada

Seleccione una:

☐ a. El médico.

☐ b. El centro coordinador.

☒ c. El aspirador de secreciones. ✓

☐ d. El cardio-compresor.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores normales de Tensión Arterial Sistólica (TAS) de un niño recién nacido medida en milímetros de mercurio (mmHg) son:

Seleccione una:

☒ a. 50-75 mmHg. ✓

☐ b. 60-80 mmHg.

☐ c. 120 mmHg.

☐ d. 40-50 mmHg.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores normales de Tensión Arterial Diastólica (TAD) de un niño entre los 8 y 10 años medida en milímetros de mercurio (mmHg) son:

Seleccione una:

- ☐ a. 60-80 mmHg.
- ☐ b. 95 mmHg.
- ☐ c. 50-80 mmHg.
- ☒ d. 55-90 mmHg. ✓

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una vez aislada la vía aérea en una RCP-A cual es la relación compresiones torácicas - ventilaciones a seguir:

Seleccione una:

- ☒ a. 30:2. ✗
- ☐ b. 15:2.
- ☐ c. Una vez aislada la vía aérea la relación de masajes torácicos y insuflaciones boca a boca son 30:1.
- ☐ d. Una vez aislada la vía aérea se procurarán 100 compresiones torácicas sin pausa o interrupción.

[Finalizar revisión](#)