

La técnica endoscópica que sirve para valorar las paredes del tracto digestivo y/o las estructuras que rodean a estas vísceras es la:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Cápsula endoscópica

B

Enteroscopia

C

Ecoendoscopia

D

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

La imagen creada por la fotoestimulación del CCD es en blanco y negro, el encargado de tornar esa imagen a color es el:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

El mismo CCD

B

El videoprocessador

C

El monitor

D

La fuente de luz fría

Junto a las ruedas de movimiento del endoscopio se encuentran los frenos de dichos mandos. Estos se usan para:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Facilitar en las duodenoscopias la canalización de material accesorio debido a que mantienen enfrente el endoscopio a la papila de Vater

B

Mantener fijo el endoscopio y facilitar tratamientos endoscópicos como polipectomías complejas

C

Evitar bucles a la hora de progresar el endoscopio en las colonoscopias

D

A y B son ciertas

La porción umbilical del endoscopio es la parte del endoscopio que:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Conecta el endoscopio a la fuente de luz y el videoprocador

B

El endoscopista sujeta y se sirve para dirigir su parte distal

C

Se introduce en el paciente

D

Se encuentra en su porción distal flexible

¿Cual fue el primer método para el examen visual de una cavidad interna del organismo?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Espéculo

B

Lichleiter

C

Videoendoscopio

D

Fibroscopio

¿A quién se le atribuye la palabra endoscopia?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Phillip Bozzini

B

A. J. Desormeaux

C

A. Kussmaul

D

Johan Mikulicz

Son métodos de generación de color:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Sistema de iluminación secuencial

B

Sistema de filtro de color en el chip

C

A y B son ciertas

D

Ninguna es cierta

¿Cuáles son las etapas de la endoscopia digestiva?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Endoscopia rígida / Endoscopia semiflexible / Videoendoscopia

B

Endoscopia rígida / Endoscopia semiflexible / Endoscopia flexible

C

Endoscopia rígida / Fibroendoscopia / Videoendoscopia

D

Endoscopia rígida / Endoscopia semirígida / Endoscopia flexible

¿A quien se le atribuye ser la madre de la enfermería en endoscopia?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Schindler

B

Orem

C

Henderson

D

Anderson

La principal finalidad de la Unidad de argón plasma es la de:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Ablación de lesiones polipoides

B

Propiedades hemostáticas

C

Tratamiento de varices esofágicas

D

Ninguna de las anteriores

Entre otras las indicaciones de la energía laser en endoscopia es:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Tratamientos paliativos de tumores

B

Tratamientos curativos de pólipos sesiles

C

La anteriores son correctas

D

Tratamiento del divertículo de Zenker

Entre las técnicas para obtención de material citológico nos encontramos con:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Escobillado

B

Citología por punción

C

Citología por lavado

D

Todas son correctas

Los dispositivos hemostásicos (loop) tienen como finalidad:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Inducir isquemia tras su colocación en pedículos grandes

B

El paso de corriente corte-coagulación conectados a una fuente electroquirúrgica

C

La resección de pólipos sésiles

D

Todas son correctas

Entre las sustancias que se inoculan a través de las agujas de hemostasia utilizadas para cohibir las hemorragias no nos encontramos con:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Adrenalina

B

Etanolamina

C

Polidocanol

D

Nitinol

El dilatador mas habitual del grupo de dilatadores con guía es:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Dilatadores de Eder-Puestow

B

Bujías de Savary y col.

C

Dilatador de Witzel

D

Dilatadores de Tridil

Cuál de los papilotomos no es de tracción:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Los papilotomos de tracción convencional

B

Papilotomos de nariz larga

C

Papilotomos con alambre-guía

D

Papilotomo de aguja

Entre los accesorios para hemostasia nos encontramos:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Agujas de hemostasia

B

Bandas elásticas para ligadura de varices

C

Tratamiento tópico mediante adhesivos tisulares

D

Todas son correctas

Con respecto a los accesorios para tratamiento de tumores, indica la afirmación incorrecta:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Las prótesis de plástico tienen la ventaja que son más baratas

B

Las prótesis metálicas recubiertas están diseñadas para dificultar el crecimiento tumoral a través de la malla

C

Es más frecuente las migraciones de prótesis recubiertas con respecto a las no recubiertas

D

Todas son falsas

Los catéteres o cánulas en CPRE están diseñados para:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Mejorar la canalización de las vías biliar y pancreática

B

Practicar esfinterotomías de Oddi

C

Dilatar estenosis del árbol biliar

D

Extracción de prótesis de vía biliar

Indica la afirmación incorrecta sobre el esfinterotomo de aguja:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

En los esfinterotomos de aguja el hilo de corte se impulsa hacia fuera

B

Indicados para la incisión en la papila cuando no se logra canalizar vía estándar

C

Es un tipo de papilotomo de pulsión

D

Es el papilotomo más utilizado

Dentro de las prótesis biliares de plástico no nos encontramos con:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Prótesis tipo Viena

B

Prótesis tipo Amsterdam

C

Protesis tipo Zimmon

D

Prótesis con pigtail simple

Bloque 2

En la Insuficiencia hepática con trombocitopenia:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

El riesgo de sangrado espontáneo aumenta cuando el recuento plaquetario es mayor de 20.000

B

Se precisa un recuento plaquetario mayor de 50.000 para procedimientos de alto riesgo

C

Se precisa un recuento plaquetario mayor de 20.000 para procedimientos de bajo riesgo

D

B y C son ciertas

En la Insuficiencia hepática, señala la afirmación falsa:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Ante procedimientos endoscópicos de alto riesgo el INR se debe encontrar por debajo de 1,7 y 1,4

B

Ante procedimientos endoscópicos que solo requieran toma de biopsias el INR se debe encontrar por debajo de 2,5

C

En procedimientos de bajo riesgo el médico no debe corregir la coagulación

D

Todas son falsas

Son consideradas técnicas endoscópicas de bajo riesgo hemorrágico:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

La endoscopia digestiva alta o baja con o sin biopsias

B

La CPRE sin esfinterotomía

C

La EED sin punción

D

Todas son correctas

Son situaciones de alto riesgo embólico:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

FA asociada a valvulopatía

B

Prótesis valvular mecánica en posición mitral

C

Prótesis valvular mecánica en cualquier posición con antecedentes embólicos

D

Todas son correctas

No son trastornos de la coagulación que pueden interferir a la hora de practicar endoscopia digestiva:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Enfermedad de Von Willebrand

B

Hemofilia A

C

Hemofilia B

D

Hepatitis

Se debe revertir el efecto anticoagulante en pacientes con INR por encima de valores terapéuticos:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Bajo ningún concepto

B

Mediante la técnica habitual que es la de administrar plasma fresco, sopesando la indicación de la endoscopia

C

La técnica mas factible es la de administrar vitamina K

D

El INR no es un parámetro a valorar

Ante pacientes anticoagulados y antiagregados podemos encontrarnos una serie de complicaciones:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Sangrado

B

Tromboembolismo

C

Complicaciones gastrointestinales derivadas de la medicación anticoagulante

D

Todas son correctas

Ante un paciente con Insuficiencia Renal Crónica:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Se sucede un defecto de la función plaquetaria lo que genera una coagulopatía

B

El método para remediar esa situación es la hemodiálisis

C

A y B son ciertas

D

La Insuficiencia Renal Crónica no cursa con coagulopatías

Indica la afirmación falsa con respecto a la profilaxis antibiótica:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Su objetivo es el disminuir la probabilidad de complicaciones infecciosas

B

La frecuencia de complicaciones infecciosas graves frente a un procedimiento endoscópico es escasa

C

La mayor incidencia de bacteriemias secundaria a endoscopia son en procedimientos de alto riesgo como la dilatación esofágica y la toma de biopsias

D

No está demostrado la disminución de complicaciones infecciosas tras profilaxis antibiótica

Son cardiopatías de alto riesgo para contraer endocarditis infecciosa:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Prótesis valvular cardíaca

B

Historia previa de endocarditis

C

Cardiopatías congénitas cianóticas complejas

D

Todas son ciertas

Son procedimientos de alto riesgo de bacteriemias, señala la falsa:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Dilatación de estenosis esofágicas

B

Escleroterapia de varices esofágica

C

PEG

D

Polipectomía

Entre las indicaciones de endoscopia en el embarazo no se encuentra:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Alta sospecha de neoformación de colon

B

Daño biliar o pancreático

C

Hemorragia digestiva significativa

D

Prurito anal

Test 3

Indica la afirmación verdadera con respecto a la endoscopia digestiva alta:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

No es recomendable la aplicación de anestésico en spray en pacientes ansiosos

B

El tabaco estimula la secreción gástrica, es recomendable no fumar en un período previo de 10 horas

C

Se recomienda ayunas de 8 horas a la realización de la EDA

D

La sedación profunda en la EDA requiere unas ayunas de 24 horas.

La EDA está contraindicada en:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Deformidad de la columna cervical

B

Sospecha o certeza de perforación del tubo digestivo

C

Divertículo de Zenker

D

Aneurisma del cayado aórtico

Histológicamente el esófago se divide en:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Capa mucosa, capa submucosa, capa muscular y la capa adventicia

B

Esófago cervical, torácico, diafragmático y abdominal

C

Esófago cervical, torácico y abdominal

D

Epidermis, dermis e hipodermis

Forman parte de las porciones anatómicas del esófago, señala la falsa:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Esófago cervical

B

Esófago torácico

C

Esófago abdominal

D

Esófago faríngeo

Señala la afirmación falsa con respecto al estómago:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Histológicamente el epitelio del estómago es de tipo plano estratificado no queratinizado

B

Localizado en la parte superior de la cavidad abdominal

C

Es una cavidad en forma de “J”

D

Su volumen medio en adultos es de 1,5 litros

Indica la afirmación incorrecta con respecto a la faringe:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

La faringe es un conducto musculomembranoso

B

La faringe es un conducto mixto dado que a su través pasa el alimento y el aire de la respiración

C

La faringe se divide en 3 porciones: Rinofaringe, Nasofaringe y Orofaringe

D

La porción bucal de la faringe se llama técnicamente orofaringe

Señala la afirmación falsa con respecto a la incisura angularis:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Se encuentra localizada en la curvatura mayor

B

Separa el cuerpo gástrico del antro gástrico

C

Se valora con más facilidad en retroflexión

D

Área del estómago donde se localiza abundante patología ulcoide

La porción nasal de la faringe corresponde a la:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Rinofaringe

B

Orofaringe

C

Cavum

D

A y C son correctas

Señala la afirmación falsa con respecto al fundus:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Es la parte superior izquierda del estómago

B

En él se acumulan los gases liberados por la digestión química

C

En él se encuentran abundantes glándulas

D

Área del estómago que comunica el cuerpo con el antro

Señala la afirmación verdadera:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Los conductos biliares y pancreáticos desembocan en la primera porción duodenal a través de la papila de Kerckring

B

Los conductos biliares y pancreáticos desembocan en la segunda porción duodenal a través de la papila de Vater

C

Los conductos biliares y pancreáticos desembocan en la primera porción duodenal a través de la papila de Vater

D

Los conductos biliares y pancreáticos desembocan en la segunda porción duodenal a través de la papila de Kerckring

El duodeno se llama como tal porque:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Porque su longitud aproximada es de 12 traveses de dedo

B

Porque tiene 12 pliegues de Kerckring

C

Porque es el duodécimo tramo diferenciado del tracto digestivo

D

Porque 12 son las ramas vasculares que lo irrigan

Indica la afirmación falsa con respecto a las indicaciones de la endoscopia digestiva alta:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Por lo general las exploraciones radiológicas son las exploraciones iniciales ante la sospecha de Enfermedad del tubo digestivo, por delante de la endoscopia digestiva

B

Una indicación de EDA son síntomas persistentes del tracto digestivo superior

C

Una indicación de EDA es el seguimiento de una úlcera gástrica

D

Una indicación de EDA es odinofagia

Son complicaciones importantes en la EDA, indica la falsa:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Perforación

B

Luxación mandibular

C

Hemorragia

D

Alteraciones cardiopulmonares

La introducción del endoscopio en la EDA se puede realizar de las siguientes maneras:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Bajo visión directa

B

Introducción a ciegas

C

Utilización de los dedos como guía

D

Todas son correctas

Con respecto a la entrada del endoscopio, ¿qué técnica es más ventajosa, la entrada rápida a duodeno, o una entrada más lenta con la valoración previa de esófago y estómago a la entrada a duodeno?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

La primera porque así evitamos confusiones con posibles lesiones traumáticas provocadas por la entrada del endoscopio

B

La segunda porque la insuflación de aire facilita la canalización del duodeno

C

La respuesta correcta es la segunda, dado que la primera no tiene ningún tipo de ventaja

D

Ambas técnicas son válidas, ambas tienen sus ventajas propias

Con respecto al esófago, la imagen endoscópica reconoce como normal:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

El fino dibujo vascular en su recorrido

B

Nódulos de Acantosis Glucogénica

C

El esófago de Barrett

D

A y B son correctas

En pacientes en decúbito lateral izquierdo, la zona más declive del estómago donde se ubica el lago mucoso, es:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Cara anterior de Antro gástrico

B

Incisura Angularis

C

Entre fundus y la porción proximal del cuerpo gástrico

D

Cara posterior de Antro gástrico

Para la correcta valoración del fórnix y de la región subcardial nos serviremos de:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Las técnicas de rectificación

B

Las técnicas de retrovisión

C

El asa en Alfa

D

Únicamente mediante visión directa

Con respecto a la retrovisión esofágica, indica lo correcto:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Se debe practicar con extremado cuidado para evitar complicaciones

B

Se puede practicar para valorar lesiones en hernias de hiato

C

No está indicada bajo ningún concepto

D

A y B son correctas

La porción duodenal donde con más frecuencia se objetiva patología es:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Bulbo duodenal

B

Segunda porción duodenal

C

Tercera porción duodenal

D

Cuarta porción duodenal

En la segunda porción duodenal con la EDA se valorará:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Las válvulas conniventes

B

La superficie mucosa

C

La papila de Vater

D

A y B son correctas, dado que aunque en la EDA se puede valorar tangencialmente la papila de Vater la duodenoscopia con endoscopio de visión lateral es la más adecuada para este fin

Test 5

La pared del colon se puede dividir en:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Mucosa y submucosa

B

Mucosa, submucosa, muscular y serosa

C

Muscular y submucosa

D

Mucosa y serosa

¿Por qué tipo de arterias es irrigado el conducto anal?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Arterias ilíacas internas

B

Arteria mesentérica inferior

C

Arteria mesentérica superior

D

Arteria aorta

Las válvulas de Houston están formadas por tres pliegues semicirculares:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

El pliegue transversal superior del recto

B

El pliegue transversal medio o pliegue de Kolrausch

C

El pliegue transversal inferior del recto

D

Todas son verdaderas

La función específica del colon transversal y ascendente consiste en:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Absorber agua y electrolitos

B

Almacenar las materias fecales hasta su expulsión por el ano

C

Digestión química de proteínas

D

Todas son correctas

El íleon terminal se diferencia entre otras del colon por:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

El diámetro de su luz, el cual es mayor respecto al colon

B

Su mucosa, la cual es prácticamente lisa

C

La existencia de tenias musculares a lo largo del recorrido del íleon

D

A y B son ciertas

Con respecto a la Línea Pectínea, selecciona la afirmación verdadera:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

También se denomina Línea dentada

B

Determina el cambio de mucosa estratificada a cilíndrica

C

Separa el Endodermo del Ectodermo

D

Todas son verdaderas

Con respecto al ángulo esplénico, indicar la afirmación verdadera:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Ángulo aproximado de 40-50°

B

Ligado al diafragma por el ligamento frenocólico

C

Es el ángulo que forma el colon transversal con el colon ascendente

D

A y B son correctas

Pertenece al mecanismo esfinteriano del ano el:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Esfínter anal interno

B

Diafragma pélvico (esfínter anal externo, puborrectal, elevador del ano)

C

Esfínter de Oddi

D

A y B son ciertas

El intestino grueso está dividido en diferentes porciones anatómicas:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Recto

B

Colon descendente

C

Canal anal

D

Todas son correctas

¿Cuál es la porción anatómica del colon más distal al ano?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Sigma

B

Recto

C

Ciego

D

Colon transverso

Señala la respuesta correcta:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

En la EDB es difícil ubicarse por la gran uniformidad de sus tramos

B

No siempre es posible finalizar la prueba llegando a ciego

C

En la EDB se emplean endoscopios de visión frontal

D

Todas son correctas

Con respecto al canal anal:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Es el inicio del paso del endoscopio

B

Se encuentran en él las Válvulas de Houston

C

Localizado en el ángulo hepático

D

Localización de pliegues prominentes

Señala la respuesta correcta, con respecto al ciego:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Se encuentra la válvula ileocecal

B

Orificio apendicular donde confluyen las tenias

C

Es la porción anatómica más lejana del intestino grueso

D

Todas son correctas

En que se caracteriza el íleon terminal:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Tendencia a colapsarse

B

Tiene un diámetro mayor con respecto a otros tramos del intestino (10-12cm)

C

Tiene una gran cantidad de pliegues prominentes

D

No importa la edad del paciente para la morfología del íleon terminal

Cuando hablamos de colonoscopia corta, hablamos de:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

70-110cm

B

130-140cm

C

5-10cm

D

165-180cm

Las pautas fundamentales para la limpieza del colon se basa en:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Enemas de fosfatos o agua

B

Uso conjunto de purgantes y enemas

C

Solución oral

D

Todas son correctas

Un divertículo es:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Una anomalía estructural

B

Un resultado postquirúrgico

C

Lesión vascular

D

Ninguna es correcta

Entendemos por lesiones vasculares:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Hemorroides

B

Varices rectales

C

Divertículos

D

A y B son ciertas

Cuando hablemos de enfermedad de Crohn, hablamos de:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Una anomalía estructural

B

Una enfermedad inflamatoria intestinal

C

Una lesión vascular

D

Una infección intestinal

Test 6

¿Cómo hay que colocar al paciente para la realización de la CPRE?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Decúbito supino

B

Decúbito lateral izquierdo con cierta pronación

C

Decúbito supino o Decúbito lateral izquierdo con cierta pronación

La CPRE es el estudio directo vía biliar desde el interior del tubo digestivo, mediante la inyección de contraste radiopaco y control fluoroscópico.

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

VERDADERO

B

FALSE

Las siglas CPRE significan: colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

VERDADERO

B

FALSE

¿Qué esfínter forma parte de la papila de Vater?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Esfínter de Santorini

B

Esfínter de Oddi

C

Esfínter de Kaeai

¿En qué año se realizó la primera canulación de la papila?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

1968

B

1986

C

1992

Las vías biliares se dividen en vía biliar principal y vía biliar accesoria.

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

VERDADERO

B

FALSE

¿Quién introdujo la CPRE?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Classen

B

McCUNE

C

Delming

La misión fundamental de la vesícula biliar es servir de reservorio para almacenar la bilis en una alta concentración y expulsarla al duodeno según se vaya necesitando para intervenir en la digestión de las grasas.

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

VERDADERO

B

FALSE

El conducto colédoco surge de la unión de:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Unión conducto hepático común y pancreático.

B

Unión conducto hepático izquierdo y derecho

C

Unión conducto cístico y hepático.

El páncreas posee dos conductos excretores; Wirsung y Santorini.

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

VERDADERO

B

FALSE

¿El conducto Wirsung o principal desemboca en?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Papila minor

B

Papila mayor

C

Papila divisum

¿Cuál es la función de los esfínteres?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Impedir el reflujo del contenido duodenal hacia colédoco

B

Regular expulsión de bilis al duodeno

C

Las dos afirmaciones son correctas

¿Qué tipo de endoscopio se utiliza para la realización de la CPRE?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Visión lateral

B

Visión frontal

C

Visión frontal y visión lateral

La técnica de la CPRE tiene que ser estéril

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

VERDADERO

B

FALSE

Al paciente hay que prepararlo...

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Psicológicamente

B

Físicamente

C

Psicológicamente y físicamente

Al tener una dependencia radiológica será necesario llevar protección plomada

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

VERDADERO

B

FALSE

La única función de enfermería durante la CPRE es colaborar en la técnica diagnóstica o terapéutica

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

TRUE

B

Falso (tiene más funciones)

La canulación con esfinterotomos mejora los resultados

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

VERDADERO

B

FALSE

¿Cuándo será necesario la utilización del endoscopio de visión frontal?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Pacientes menores de 2 años

B

Embarazadas

C

Paciente intervenido de Billroht II

La papila se situa en la cara interna de la 2ª porción duodenal

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

VERDADERO

B

FALSE

La cantidad de contraste administrado no intervine en la aparición de pancreatiti

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

TRUE

B

Falso (si intervine)

Existen indicaciones diagnósticas y terapéuticas

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

VERDADERO

B

FALSE

¿Cuál es la principal indicación terapéutica?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Ictericia

B

Coledocolitiasis

C

Parásitos

¿Cuál es la principal indicación diagnóstica?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Ictericia

B

Miscelánea

C

Hemofilia

¿Cuál de las siguientes es una complicación genérica importante?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Luxaciones

B

Hemorragias

C

Espasmo laríngeo

Un ampuloma es un tumor maligno o benigno situado en la papila de Vater

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

VERDADERO

B

FALSE

La coloración de los cálculos puede ser:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Amarilla y marrón–negro

B

Amarilla

C

Marrón-negro

Según la anatomía de la papila puede ser:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Embarazada, diverticular e invertida

B

Diverticular y embarazada

C

Embarazada, divertivular y peridiverticular

Existen únicamente prótesis biliares

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

TRUE

B

Falso (también existen pancreáticas)

Test 7

El ácido peracético es un componente que nos sirve para:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

La esterilización

B

La desinfección

C

La limpieza

D

El lavado

Cual de los siguientes procedimientos endoscópicos tiene más riesgo de infección:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Endoscopia digestiva alta

B

Endoscopia digestiva baja

C

CPRE

D

A y C

Un germicida es:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Un compuesto que elimina totalmente los microorganismos del medio ambiente

B

Un compuesto que reduce pero no necesariamente elimina los microorganismos del medio ambiente y de objetos inanimados

C

Un compuesto capaz de desencadenar la autoinmunidad ante ciertos microorganismos

D

Todas son falsas

Indica cual es la respuesta correcta con respecto al endoscopio:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Es un instrumento reutilizable

B

Es un instrumento cuya función es meramente diagnóstica

C

Es un instrumento complejo

D

A y C son ciertas

Cuál de estos microorganismos es más resistente frente a sustancias desinfectantes:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Hongos

B

Virus de tamaño medio

C

Mycobacterias

D

Priones

La desinfección se clasifica en estos tipos:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Desinfección de bajo nivel y alto nivel

B

Desinfección de bajo nivel, nivel intermedio y máximo nivel

C

Desinfección de alto nivel

D

Desinfección de bajo nivel, nivel intermedio y alto nivel

Cuales son los pasos dentro del procesamiento del material médico reutilizable:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Un primer paso que es la limpieza y un segundo paso que es la descontaminación

B

Un primer paso que es la limpieza y un segundo paso que es la desinfección o esterilización dependiendo del tipo de material

C

Un primer paso que es la limpieza y un segundo paso que es el secado

D

La esterilización

La desinfección en la Unidad de Endoscopias, es función primordial de:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

El médico anestesista

B

El paciente

C

El enfermero

D

El médico de digestivo

¿Qué entendemos por material crítico según la clasificación de Spaulding?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Instrumental que no entra en contacto con membranas mucosas o piel que no está intacta

B

Instrumental en contacto con tejidos estériles, cavidades estériles y sistema vascular

C

Instrumental que entra en contacto con membranas mucosas o piel que no está intacta

D

Todas son falsas

La limpieza es:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Es el primer paso y principal procedimiento en los procesos de desinfección

B

Es un proceso físico y químico que permite eliminar la suciedad visible de material orgánico e inorgánico

C

Comprende fricción externa e interna

D

Todas son verdaderas

¿Qué tipo de detergentes no es recomendado en el proceso de descontaminación del endoscopio?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Detergentes de baja espuma

B

Detergentes de baja espuma Detergentes aldehidos

C

A y B son falsas

D

Todas son verdaderas

Con respecto a las cualidades ideales de un desinfectante, es falso:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

No tóxico

B

Rápida acción

C

Con olor

D

Amplio espectro

Con respecto a los desinfectantes electrolíticos es falso que:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Tienen un alto coste

B

Es el desinfectante más antiguo del mercado

C

Seguro para el paciente

D

A y B son correctas

Como se denomina la infección transcurrida las 72 horas al ingreso:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Infección respiratoria

B

Infección de orina

C

Infección nosocomial

D

Infección sistémica

Qué microorganismo es más resistente a los desinfectantes. El VIH o el VHC:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Todos estos microorganismos dado que se encuentran dentro de la familia de virus grandes de envoltura lipídica son de resistencia similar a los desinfectantes (Resistencia alta)

B

VIH

C

VHC

D

Todos estos microorganismos dado que se encuentran dentro de la familia de virus grandes de envoltura lipídica son de resistencia similar a los desinfectantes (Resistencia baja)

Con respecto a la desinfección automática, es falso:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Realizar test de fugas

B

Mantenimiento regular

C

Instrucciones y enseñanza por fabricante

D

Agua de aclarado reutilizable

¿Qué medidas debe tomar el personal de endoscopias?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Vacunación VHB

B

Conocimiento del producto

C

Lavado de manos

D

Todas son correctas

Señala la respuesta incorrecta con respecto a la limpieza del endoscopio:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Inmersión en solución enzimática

B

Aspiración detergente enzimático

C

No retirada de válvulas

D

Cepillado terminación distal

Cuando hablamos de desinfección de Alto Nivel, ¿Cuál es el primer paso a seguir de los que vemos a continuación:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Bombeo de desinfectante con la jeringa

B

Secado

C

Inmersión en solución desinfectante

D

Aclarado

¿Por qué cepillamos el endoscopio?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Para conseguir un brillo

B

Condición necesaria para una desinfección adecuada

C

Para evitar que el endoscopio se inunde por fuga positiva

D

Todas son correctas

¿Cuánto tiempo debemos dedicar para el bombeo de agua a través del canal operativo en el proceso de limpieza?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

10-15 segundos

B

1 minuto

C

5 segundos

D

15 minutos

Cuando hablamos de ensayos clínicos aleatorizados, en que nivel dentro del grado de recomendación nos encontramos:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Nivel 1c

B

Nivel 5

C

Nivel 1a

D

Ninguno es correcto

Dentro del procesamiento del endoscopio cuando hablamos de la limpieza, cual es el primer paso que debemos realizar:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Test de fugas

B

Aspiración de detergente enzimático

C

Desinfección

D

Bombeo de agua por el canal operativo

¿Por qué es importante aclarar el endoscopio tanto por dentro como por fuera?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Para evitar irritación de mucosas en el paciente

B

Para un mejor funcionamiento

C

Para eliminar el mal olor

D

Todas son verdaderas

Con respecto a la desinfección automática, es correcto que:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Reduce la exposición al desinfectante

B

Es seguro

C

A y B son correctas

D

Es perjudicial para el personal sanitario

Test 8

Dentro de las características propias de la Enfermería no encontramos:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Es práctica

B

Es académica

C

Es individual

D

Aplica conocimientos

Independientemente donde desempeñe un enfermero su profesión desarrollará una combinación de estas funciones:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Función asistencial, docente, administrativa e investigadora

B

Función asistencial, social, administrativa e investigadora

C

Función asistencial, docente, académica e investigadora

D

Función asistencial, social, administrativa e integradora

La función asistencial dentro de una Unidad de Endoscopia va dirigida a:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

La atención al paciente

B

La preparación del material

C

La colaboración en el desarrollo de la técnica

D

Todos son verdaderas

Dentro de la función asistencial practicada a posteriori de la técnica endoscópica no nos encontramos:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Valorar el estado del paciente

B

Registro

C

Confirmar la existencia del consentimiento informado debidamente cumplimentado

D

Información al alta

El seguimiento de la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca... Se encontraría dentro de las actividades de enfermería que se encuentran dentro de la Función:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Administrativa

B

Investigadora

C

Docente

D

Todas son falsas

La comprobación del correcto funcionamiento del material que se vaya a utilizar en la técnica endoscópica es función de:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Enfermería

B

Auxiliar de Enfermería

C

Supervisor de Enfermería

D

Jefe de Servicio

Señala la respuesta correcta:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

El enfermero es un profesional que no tiene una participación activa

B

El enfermero es un profesional que tiene una participación activa, pero pese a ello no precisa de grandes conocimientos acerca del mundo de la endoscopia, de ahí que se contrate a cualquiera

C

El enfermero es un profesional que tiene una participación activa, de ahí que precise de grandes conocimientos acerca del mundo de la endoscopia

D

Todas son falsas

Test fin curso

Entre las normas comunes a todas las técnicas endoscópicas no se encuentra:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

No insuflar demasiado aire

B

No insuflar demasiado aire

C

Evitar la aspiración de secreciones

D

En caso de duda, retirarse

Son partes del equipamiento principal para la realización de una endoscopia digestiva:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Endoscopio

B

Fórceps de biopsia

C

Videoprocador

D

La a y la c son ciertas

El Speculum Auris es un espéculo que se usaba en la especialidad de:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Ginecología

B

Otorrinolaringología

C

Urología

D

Digestivo

¿Cuándo aparece el espéculo?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Siglo I d.C. (Restos arqueológicos de Pompeya)

B

Siglo VII

C

No se sabe a ciencia cierta la fecha de aparición del mismo

D

Siglo X

Adolph Kussmaul pertenece a la etapa de la endoscopia:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Rígida

B

Semiflexible

C

Flexible

D

Videoendoscopia

Las Bandas elásticas para ligadura de varices:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Provocan muerte celular mediante la aplicación de calor

B

Dejan las varices obliteradas por la acción inflamatoria que provocan

C

Provocan necrosis tisular por administración de medicaciones impregnadas en las mismas, vía tópica

D

Todas son correctas

Dentro de los accesorios de hemostasia concretamente dentro de los tratamientos mecánicos, nos encontramos con:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Agujas de esclerosis

B

Clips

C

Bandas elásticas para ligadura de varices

D

Ninguna es correcta

El litotriptor de Soehendra está indicado para:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Extracción de litiasis biliar

B

Es un accesorio utilizado únicamente en los servicios de Litotricia renal

C

Es un accesorio de emergencia cuando la cesta de dormia que ha atrapado el cálculo queda impactada en la papila

D

Dilatación de la papila de Vater

Son accesorios para extracción de litiasis biliar:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Catéteres tipo Fogarty

B

Cestas de extracción de Dormia

C

Cánulas de lavado

D

Todas son correctas

Indica la afirmación incorrecta sobre el esfinterotomo de aguja:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

En los esfinterotomos de aguja el hilo de corte se impulsa hacia fuera

B

Indicados para la incisión en la papila cuando no se logra canalizar vía estándar

C

Es un tipo de papilotomo de pulsión

D

Es el papilotomo más utilizado

Son tipos de alambres guía en CPRE:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Guía tipo Tracer

B

Guía tipo Glidewire

C

Guía tipo Zebra

D

Todas son correctas

Ante la valoración de la mucosa gástrica es importante fijarse en el ritmo y regularidad de las contracciones peristálticas, por la posible existencia de:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Infiltración parietal

B

Síndrome de Intestino irritable

C

Empacho

D

Enfermedad de Crohn

Se puede clasificar la endoscopia digestiva atendiendo al área anatómica a explorar en:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Endoscopia digestiva alta / Endoscopia digestiva baja / CPRE

B

Endoscopia diagnóstica / Endoscopia terapéutica

C

Endoscopia programada / Endoscopia urgente

D

Endoscopia diagnóstica / Endoscopia terapéutica / Endoscopia programada / Endoscopia urgente

Entre las medidas a realizar tras la EDA nos encontramos con:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Informar sobre la ingesta de alimentos

B

Aparición de síntomas posteriores

C

Confirmar que los consentimientos estén bien cumplimentados

D

A y B son ciertas

Indica la afirmación verdadera con respecto a la endoscopia digestiva alta:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

La tendencia en los últimos años es la de utilizar endoscopios de doble canal

B

Los endoscopios de calibre fino son utilizados exclusivamente para las exploraciones en niños

C

Los endoscopios de calibre fino son útiles sobretudo en técnicas terapéuticas

D

Los endoscopios utilizados para la práctica de endoscopia digestiva alta son de visión frontal

Indica la afirmación falsa con respecto a las indicaciones de EDA diagnóstica:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Síndrome ulceroso

B

Hemorragia digestiva

C

Control esófago de Barrett

D

Polipectomía

La Endoscopia Digestiva Alta se denomina también:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Panendoscopia oral

B

CPRE

C

PEG

D

Ecoendoscopia

Indica la afirmación incorrecta con respecto al esófago:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Es un conducto musculomembranoso

B

Su límite superior se encuentra a nivel de la 6ª-7ª vértebra cervical

C

La mucosa esofágica normal está cubierta por células planas llamadas escamosas

D

La porción más larga del esófago es el esófago cervical

El esófago presenta 3 zonas fisiológicas de disminución de su calibre, éstas son:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

El esfínter esofágico superior, el anillo de Schatzki y el esfínter esofágico inferior

B

El esfínter esofágico superior, la impronta del cayado aórtico y el esfínter esofágico inferior

C

El esfínter esofágico superior, la línea Z y el esfínter esofágico inferior

D

El esfínter esofágico superior, el divertículo de Zenker y el esfínter esofágico inferior

El bulbo duodenal corresponde a la:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Primera porción duodenal

B

Segunda porción duodenal

C

Tercer porción duodenal

D

Cuarta porción duodenal

El campo óptico del endoscopio cuando entra éste en el estómago se dirige hacia:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Antro

B

Zona prepilórica

C

Curvatura mayor gástrica

D

Ángulo de Treitz

Cual de estas afirmaciones es verdadera:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

La insuflación se activa presionando la válvula correspondiente

B

La irrigación de agua para la limpieza de la lente se acciona taponando el orificio de la válvula correspondiente

C

La aspiración se activa taponando el orificio de la válvula correspondiente

D

La aspiración se activa presionando el orificio de la válvula correspondiente

Pertenecen al subsistema de angulación del endoscopio el (Indica la falsa):

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Mando de arriba-abajo y mando de izquierda-derecha

B

Frenos

C

Canal de aspiración

D

Guías de angulación

Entre el equipamiento accesorio de material no fungible nos encontramos con:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Bomba de inyección de agua

B

Unidad electroquirúrgica

C

Fórceps de biopsia

D

La A y la B son correctas

La porción duodenal donde con más frecuencia se objetiva patología es:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Bulbo duodenal

B

Segunda porción duodenal

C

Tercera porción duodenal

D

Cuarta porción duodenal

La CPRE es el estudio directo vía biliar desde el interior del tubo digestivo, mediante la inyección de contraste radiopaco y control fluoroscópico.

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

VERDADERO

B

FALSE