

Comenzado el	lunes, 21 de octubre de 2019, 19:24
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 21 de octubre de 2019, 19:54
Tiempo empleado	29 minutos 43 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de un máximo de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una alcalosis implica:

Seleccione una:



a. Descenso del Ph.



b. Aumento del Ph. ✓



c. Intoxicación por pilar alcalina AAA.



d. Descenso del la PIC.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Medida a tomar de forma prioritaria ante un paciente inconsciente (en coma):

Seleccione una:



a. Hacer glucemia capilar.



b. Administrar Naloxona.



c. Valorar ABCD. ✓



d. Aplicar escala de coma de glasgow.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La clasificación de Killip ordena:

Seleccione una:



a. La única clasificación de Killip es la que junto a Kimbal, clasifica la relación de Insuficiencia Cardíaca con Síndrome Coronario Agudo de mayor a menor, de tal forma que "I" es Shock Cardíaco y "IV" infarto NO complicado



b. El origen de la Insuficiencia Cardíaca.



c. El grado y tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca. ✓



d. Los bloqueos aurículo-ventriculares de 2º grado

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La FiO₂ máxima que obtendremos con una mascarilla venturi a 15 lpm será de:

Seleccione una:



a. 1.



b. 0,8.



c. 50%-60%. ✓



d. 27%-31%.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una acidosis implica:

Seleccione una:



a. Descenso del Ph. ✓



b. Hipotensión - Bradicardia - Bradipsiquia.



c. Aumento del Ph.



d. Triplicar la PCO2.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que podemos no vigilar en un episodio de cetoacidosis diabética:

Seleccione una:



a. El Ph.



b. K+.



c. Edema cerebral.



d. Recientes episodios de caries en la cavidad oral. ✓

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El omeprazol es:

Seleccione una:



a. Un inhibidor de la bomba de protones. ✓



b. Un inhibidor de la bomba de electrones.



c. Un antiemético.



d. Un emetizante.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual de las siguientes medicaciones antihipertensivas no se recomienda se administre en perfusión continua:

Seleccione una:



a. Labetalol.



b. Urapidilo.



c. Nitroglicerina.



d. Hidralacina. ✓

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que es el estado postcritico de un paciente:

Seleccione una:



a. Periodo limitado de desorientación, badripsiquia y otros deficit neurologicos, tras un crisis convulsiva. ✓



b. Momento tras la resolución de una reclamación de un paciente.



c. Momento exacto en el que el paciente deja de estar critico.



d. Denominación del síndrome de estancia en unidad de cuidados intensivos.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El patrón de Cheyne-Stokes es:

Seleccione una:



a. Un patrón Electrocardiografico.



b. Respiratorio. ✓



c. Diabético.



d. Urinario.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que medicación, aún no siendo analgésico puro, alivia el dolor tipo cólico en un cuadro intestinal o urinario:

Seleccione una:



a. Paracetamol.



b. Ancha fibrin.



c. Buscapina. ✓



d. Nolotil.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es un objetivo al colocar una Sonda Nasogástrica (SNG) en el contexto de una posible hemorragia digestiva:

Seleccione una:



a. Cuantificar pérdidas de volemia.



b. Confirmar sangrado/diagnostico.



c. Garantizar alimentación y toma de medicación. ✓



d. Proteger vía aérea.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el shock hipovolémico la Noradrenalina se administró en una dosis de:

Seleccione una:



a. 6 mg + 44 ml de SG/Dx 5% a 4 ml/h de inicio. ✓



b. 6 mg en bolo sin disolver.



c. 6 mg + 50 ml de Sg/Dx 5% o SSF 0,9 a 8 ml/h.



d. 12 mg + 88 ml de SG/Dx 5% a 16 ml/min inicialmente.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De los siguientes, cual no es por si sólo, un criterio de exclusión del código ICTUS:

Seleccione una:



a. Convulsiones.



b. GCS de 8.



c. Ranking de 4.



d. 87 años de edad. ✓

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el shock hipovolémico la dopamina se administración en una dosis de:

Seleccione una:



a. 200mg + 245 ml SG/Dx5% o SSF 0,9 a ritmo mayor o igual que $10\mu\text{gr/kg/min} = 21\text{ ml/h}$.



b. 200ml + 245 ml SG/Dx5% o SSF 0,9 a ritmo mayor o igual que $10\mu\text{gr/kg/min} = 21\text{ ml/h}$. ✓



c. 70 gr.



d. 100mg+100 ml de SSF 0.9%.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La dosis inicial de insulina en bolo IV ante una cetoacidosis diabetica será de:

Seleccione una:



a. 15 U.I.



b. 10 U.I. de insulina regular/rápida. ✓



c. 10 U.I de insulina NPH.



d. 12 U.I de insulina rápida/regular.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la escala de NIHSS, que puntuación se le asigna a un paciente con sospecha de ICTUS, si es capaz de decirnos en que mes estamos o su edad:

Seleccione una:



a. 1. ✓



b. 0.



c. 3.



d. 2.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De los siguientes, cual es un síntoma diferenciador del vértigo:

Seleccione una:



a. Nauseas.



b. Cefalea.



c. Malestar general.



d. Mareo con giro de objetos. ✓

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual de estas soluciones cristaloides isotonicas, es ligeramente hipotonica:

Seleccione una:



a. Salino 0,9%.



b. Glucosa 5%. ✓



c. Ringer.



d. Ringer Lactato.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Ante un Electro Cardiograma con elevación del ST en las derivaciones V1 y V2, sospecharemos:

Seleccione una:



a. Infarto inferior.



b. Angina estable.



c. Angina inestable.



d. Infarto septal. ✓

[Finalizar revisión](#)

Comenzado el	lunes, 21 de octubre de 2019, 19:56
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 21 de octubre de 2019, 20:01
Tiempo empleado	4 minutos 48 segundos
Calificación	10,00 de un máximo de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto
Información	

Marcar pregunta

Texto informativo

Hombre de 70 años con EPOC, llega a urgencias con mal estado general, disnea, palidez, sudoración, ...

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Valorar primero

Seleccione una:



a. A-B-C-D. ✓



b. Pulsioximetria.



c. Frecuencia respiratoria.



d. Tiraje.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si no esta consciente:

Seleccione una:



a. Valorar hipercapnia.



b. VMNI.



c. Algoritmo SVA. ✓



d. VMI.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si está consciente, es criterio de gravedad:

Seleccione una:



a. La cianosis intensa. ✓



b. Tolera el decubito supino.



c. Mantiene una conversación fluida.



d. Deambula sin esfuerzo.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No nebulizar:

Seleccione una:



a. Salbutamol.



b. Bromuro de ipatropio.



c. Budesonida.



d. Adrenalina. ✓

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No administrar de inicio:

Seleccione una:



a. Antitérmico si fiebre.



b. Protectores gástricos.



c. Antibióticos ✓



d. Corticoides.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La dosis del salbutamol será:

Seleccione una:



a. De 2,5 a 5 mg según FC. ✓



b. de 10mg.



c. 1 ampolla.



d. 7,5 mg.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La dosis de bromuro de ipatropio será:

Seleccione una:



a. 100 microgr



b. 250 microgr.



c. 500 microgr. ✓



d. 600 microgr.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La dosis de budesonida será:

Seleccione una:



a. 0,5 mg.



b. 1 mg. ✓



c. 2 mg.



d. 5 mg.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La dosis de hidrocortisona será:

Seleccione una:



a. 2 mg /kg. ✓



b. 1 mg/kg.



c. 100 mg.



d. 500 mg.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Tras el primer tratamiento y atención, reevaluar a los

Seleccione una:



a. 5 minutos.



b. 10-15 minutos. ✓



c. 30 minutos.



d. 60 minutos.

[Finalizar revisión](#)