

Cuidados críticos en enfermería intensiva

Comenzado el viernes, 25 de octubre de 2019, 21:19

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 25 de octubre de 2019, 21:20

Tiempo empleado 45 segundos

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es una causa común de la ICA?

Seleccione una:

- ☐ a. Miocardiopatía
- ☐ b. Síndrome coronario agudo
- ☐ c. Descompensación de la ICC
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente que presenta dolor torácico en un ECG de 12 derivaciones muestra elevación del ST en las derivaciones II, III y aVf, es recomendable la realización de:

Seleccione una:

- ☐ a. ECG de derivaciones posteriores
- ☐ b. ECG de derivaciones derechas
- ☐ c. Ninguna de las anteriores
- ☒ d. a y b son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son ciertas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ingresa en nuestra UCI un paciente con dolor torácico, disnea, ligera hipoxia y evidencia en el ECG de SCACEST. Porta vía intravenosa en MSI. Dentro de los cuidados iniciales realizaremos:

Seleccione una:

- ☐ a. Monitorización del paciente
- ☐ b. Administración de oxígeno



c. Administración de analgésicos



d. Todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál no es un síntoma o signo característico de la ICA?

Seleccione una:



a. Disnea



b. Edemas



c. Agitación



d. Nistagmo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nistagmo

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La complicación potencial más importante de la fibrinólisis es:

Seleccione una:

- ☐ a. Reacción alérgica
- ☐ b. Dolor torácico
- ☒ c. Hemorragia intracraneal
- ☐ d. Hematuria

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hemorragia intracraneal

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el manejo inmediato de la ICA por parte de enfermería no es necesario

Seleccione una:

- ☐ a. Valoración integral
- ☐ b. Vigilancia hemodinámica
- ☐ c. Control de diuresis
- ☒ d. Colocación de sonda nasogástrica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocación de sonda nasogástrica

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El levosimendán está dentro del grupo de fármacos

Seleccione una:

- ☐ a. Vasopresores
- ☐ b. Beta bloqueantes
- ☒ c. Agentes inotrópicos
- ☐ d. Diuréticos de asa

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Agentes inotrópicos

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ingresa en nuestra UCI un paciente procedente de urgencias con TA 60/32 mmHg, FC 150 lpm, disnea y sat O2 89%. En el ecocardiograma que le realiza se evidencia un taponamiento cardíaco. El paciente porta VVP nº18 en MSD ¿qué es lo prioritario en este paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Administrar oxígeno por medio de gafas nasales
- ☐ b. Canalización de más VVP para administración de cristaloides IV
- ☒ c. Realización de una pericardiocentesis



d. Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realización de una pericardiocentesis

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes recomendaciones no está indicado en los cuidados post ICP por vía femoral:

Seleccione una:



a. Flexionar el miembro inferior sobre el que se realizó la punción



b. Vigilancia de la zona de punción



c. Valoración frecuente del pulso pedio y poplíteo



d. Compresión manual en caso de sangrado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Flexionar el miembro inferior sobre el que se realizó la punción

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La pericardiocentesis se realiza por medio de técnica:

Seleccione una:

- ☐ a. Aséptica
- ☒ b. Estéril
- ☐ c. Todas las anteriores
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estéril