
Puntos 20,00/20,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los tipos de rotura uterina son

Seleccione una:

- a. Completa y parcial o incompleta ✓
- b. Total y No total
- c. Primaria y Secundaria
- d. Alta y Baja

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Limite de edad que marca la diferencia en los item de respuesta motora y aperura ocular, en al escala de glasgow modificada para pacientes pediatricos

Seleccione una:

- a. 5 años
- b. 10 años
- c. 1 año ✓
- d. 3 años

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual es genalmente la más optima posición de una gestante ante cualquier tipo de urgencia

Seleccione una:

- a. Decubito lateral derecho
- b. Decubito prono
- c. Decubito lateral izquierdo ✓
- d. Bipedestación

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La fase del parto del alumbramiento es

Seleccione una:

- a. Cuando sale el feto
- b. Cuando se realizan las maniobras de Leopold
- c. Cuando se hace la episiotomia
- d. Cuando sale la placenta ✓

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si aplicamos la tabla de "altura uterina en gestación", a que altura estará el borde superior del utero a las 36 semanas

Seleccione una:

- a. Sinfisis del pubis
- b. A la altura del ombligo
- c. Reborde costal ✓
- d. A 1/3 por debajo del ombligo, pero a la mitad de la distancia de ese tercio hasta la sinfisis del pubis

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La dosis pediátrica para nebulización de adrenalina es

Seleccione una:

- a. 1mg/kg
- b. 1,5 mg/kg
- c. 0,5 mg/kg ✓
- d. 0,75 mg/kg

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No es un grado de preeclampsia

Seleccione una:

- a. Eclampsia
- b. Leve
- c. Grave
- d. Subclampsia ✓

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los antecedentes, signos y síntomas de un parto normal, no encontramos

Seleccione una:

- a. Gestación a término
- b. Bebe llora
- c. Bebe buen tono muscular
- d. Frecuencia cardiaca del bebe por debajo de 100 lpm ✓

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El utero es normal, sólo ante una

Seleccione una:

- a. Vasa previa ✓
- b. Rotura Uterina
- c. Desprendimiento de placenta
- d. Placenta previa

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Son exclusivas para uso en intubación pediátrica

Seleccione una:

- a. Las palas curvas nº 4 y 5
- b. Palas rectas nº 0 y nº 1 ✓
- c. Las palas curvas de cualquier medida
- d. Pala recta del nº 4

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La escala de gravedad de Downes Wood se usa general y principalmente para valorar

Seleccione una:

- a. Las epiglotitis
- b. Los CRUP
- c. La gravedad de Asma y Bronquiolitis ✓
- d. Faringitis

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sospecharemos de una preclamsia en una mujer embarazada, cuando entre otras cosas presente

Seleccione una:

- a. TAS de 120 mmHg y TAD de 80 mmHg
- b. TAS mayor que 160 mmHg y TAD mayor que 110 mmHg en dos tomas separadas ✓
- c. Hipotensión mantenida
- d. TAS mayor que 150 mmHg y TAD mayor que 100 mmHg

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una DPPNI es

Seleccione una:

- a. Un tipo de aborto
- b. Igual que una vasa previa
- c. Despegamiento de la placenta antes de la salida del feto ✓
- d. Sólo se produce en el periodo de alumbramiento del parto

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las soluciones quirúrgicas a la atonía uterina postparto, son todas menos una de las siguientes, señala cual

Seleccione una:

- a. Abdominoplastia ✓
- b. Legrado
- c. Ligadura de vasos
- d. Embolización de vasos uterinos

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No es una medida para liberar presión sobre el cordón umbilical, en caso de prolapso

Seleccione una:

- a. Posición de trendelenburg
- b. Lateralización opuesta a la posición del cordón
- c. Empujar el cordón ✓
- d. Deplazar la presentación en sentido cefalico

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En urgencias gineo-obstetricas, el acronimo DPPNI significan

Seleccione una:

- a. Diabetes Prevention Program Natural Incubation
- b. Diagnostico Potencial de Parada No Irreversible
- c. Desprendimiento Prematuro de Placenta NormoInserta ✓

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La relación de compresiones:ventilaciones toracicas para una RCP básica realizada por personal sanitario de un paciente peditatrico será

Seleccione una:

- a. .30:2
- b. 100-120 min
- c. 15:2 ✓
- d. .15:15

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El test de APGAR valora

Seleccione una:

- a. Color (apariencia) - Respuesta a estímulos - Tono muscular - Respiración ✓
- b. Apariencia - Respiración - Circulación
- c. Apertura de ojos - Respuesta verbal (llanto) - Respuesta motora
- d. Nivel de bilirrubina

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El único ítem que no se modifica en la escala de glasgow pediátrica es

Seleccione una:

- a. Respuesta motora
- b. Respuesta verbal
- c. Apertura de ojos ✓
- d. La GCS puede ser de "0" (cero)

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Es una afección de vías bajas en niños

Seleccione una:

- a. Asma ✓
- b. Laringitis
- c. Epiglotitis
- d. Congestión nasal