

# Cuidados de enfermería en urgencias - Edición 2

<b>Comenzado el</b>	martes, 17 de diciembre de 2019, 19:55
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	martes, 17 de diciembre de 2019, 20:07
<b>Tiempo empleado</b>	12 minutos 10 segundos
<b>Puntos</b>	18,00/20,00
<b>Calificación</b>	<b>9,00</b> de 10,00 ( <b>90%</b> )
<b>Comentario -</b>	Apto

## Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

El babeo en el niño enfermo no está presente por norma general

Seleccione una:

- ☒ a. Laringitis viral ✓
- ☐ b. Epiglotitis aguda
- ☐ c. Traqueitis bacteriana
- ☐ d. Absceso retrofaringeo

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

La dosis pediátrica para nebulización de adrenalina es

Seleccione una:

- ☐ a. 1mg/kg
- ☐ b. 1,5 mg/kg
- ☒ c. 0,5 mg/kg ✓
- ☐ d. 0,75 mg/kg

## Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

La relación de compresiones:ventilaciones torácicas para una RCP básica realizada por personal sanitario de un paciente pediátrico será

Seleccione una:

- ☐ a. .30:2
- ☐ b. 100-120 min
- ☒ c. 15:2 ✓
- ☐ d. .15:15

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

La puntuación de menor gravedad en la escala de downes-wood

Seleccione una:

- ☒ a. De 1 a 3 puntos ✓
- ☐ b. De 4 a 7 puntos
- ☐ c. De 8 a 14 puntos
- ☐ d. Más de 14 puntos

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Son exclusivas para uso en intubación pediátrica

Seleccione una:

- ☐ a. Las palas curvas nº 4 y 5
- ☒ b. Palas rectas nº 0 y nº 1 ✓
- ☐ c. Las palas curvas de cualquier medida
- ☐ d. Pala recta del nº 4

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

No es un grado de preeclampsia

Seleccione una:

- ☐ a. Eclampsia
- ☐ b. Leve
- ☐ c. Grave
- ☒ d. Subclampsia ✓

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

En la escala de trauma pediátrica, que peso aumenta la puntuación en un punto (+1)

Seleccione una:

- ☐ a. mayor que 20 Kg
- ☒ b. Entre 10 a 20 Kg ✓
- ☐ c. menor que 10 Kg
- ☐ d. menor que 5 Kg

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Por debajo de que frecuencia cardiaca necesita un recién nacido compresiones torácicas de reanimación

Seleccione una:

- ☐ a. 100 lpm
- ☒ b. 60 lpm ✓
- ☐ c. 110 lpm
- ☐ d. 120 lpm

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Una DPPNI es

Seleccione una:

- ☐ a. Un tipo de aborto
- ☐ b. Igual que una vasa previa
- ☒ c. Despegamiento de la placenta antes de la salida del feto ✓
- ☐ d. Sólo se produce en el periodo de alumbramiento del parto

**Pregunta 10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre  
1,00

El único ítem que no se modifica en la escala de Glasgow pediátrica es

Seleccione una:

- ☐ a. Respuesta motora
- ☐ b. Respuesta verbal
- ☐ c. Apertura de ojos
- ☒ d. La GCS puede ser de "0" (cero) ✗

**Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Cual es generalmente la más óptima posición de una gestante ante cualquier tipo de urgencia

Seleccione una:

- ☐ a. Decubito lateral derecho
- ☐ b. Decubito prono
- ☒ c. Decubito lateral izquierdo ✓
- ☐ d. Bipedestación

**Pregunta 12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

La clasificación de Taussig se aplica para valorar la gravedad de

Seleccione una:

- ☒ a. Procesos respiratorios ✓
- ☐ b. Insuficiencia cardiaca
- ☐ c. Alergia cutanea
- ☐ d. Dermatitis

**Pregunta 13**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre  
1,00

Dentro de las medidas fisicas para reducir la fiebre de un niño, los baños templados deberan estar a

Seleccione una:

- ☐ a. 1°C por debajo de la temperatura del niño
- ☐ b. 2° por debajo
- ☐ c. A la misma temperatura que el niño
- ☒ d. 1° por encima para conseguir la transferencia transversa de temperatura inversa ✗

**Pregunta 14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

La referencia para el ajuste de medicación pediátrica se hace por

Seleccione una:

- ☐ a. Peso
- ☐ b. Edad
- ☒ c. Edad y peso ✓
- ☐ d. Altura en cm

**Pregunta 15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

No es un tipo deplacenta previa

Seleccione una:

- ☐ a. Lateral o baja (Tipo I)
- ☐ b. Marginal (Tipo II)
- ☒ c. Absoluta (Tipo V) ✓
- ☐ d. Oclusiva total (tipo IV)

**Pregunta 16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Sospecharemos de una preeclampsia en una mujer embarazada, cuando entre otras cosas presente

Seleccione una:

- ☐ a. TAS de 120 mmHg y TAD de 80 mmHg
- ☒ b. TAS mayor que 160 mmHg y TAD mayor que 110 mmHg en dos tomas separadas ✓
- ☐ c. Hipotensión mantenida
- ☐ d. TAS mayor que 150 mmHg y TAD mayor que 100 mmHg

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Puede una preeclampsia hacer necesaria una extracción fetal

Seleccione una:

- ☐ a. No, nunca
- ☐ b. Si, sólo en preeclampsias leves
- ☒ c. Si, con signos de severidad ✓
- ☐ d. No, mientras la TAS mayor que 100 y TAD mayor que 80 en 2 tomas separadas 24h

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

En urgencias gineco-obstetricas, el acronimo DPPNI significan

Seleccione una:

- ☐ a. Diabetes Prevention Program Natural Incubation
- ☐ b. Diagnostico Potencial de Parada No Irreversible
- ☒ c. Desprendimiento Prematuro de Placenta Normal Inserta ✓

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

En la intubación pediátrica, los múltiples intentos y el consiguiente aumento de edema, nos llevarán

Seleccione una:

- ☐ a. Aumentar el diametro del tubo necesario
- ☐ b. Cesar los intentos
- ☐ c. Buscar alternativas
- ☒ d. Disminuir el diametro del tubo elegido ✓

**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

La escala de gravedad de Downes Wood se usa general y principalmente para valorar

Seleccione una:

- ☐ a. Las epiglotitis
- ☐ b. Los CRUP
- ☒ c. La gravedad de Asma y Bronquiolitis ✓
- ☐ d. Faringitis

Volver a: Módulo 4: Actua... ➡