

GENERALIDADES EN URGENCIAS PEDIATRICAS PARA TCAE

PRETEST:

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la finalidad última del triaje?

Seleccione una:

- a. Diagnosticar la enfermedad del niño.
- b. Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.
- c. Tomar los datos del niño para su identificación.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál no es una razón para realizar un traslado intrahospitalario de un niño?

Seleccione una:

- a. Para llevarlo a quirófano.
- b. Para su ingreso en planta o en la UCI.
- c. Para aumentar la comodidad del niño.
- d. Para la realización de técnicas diagnósticas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para aumentar la comodidad del niño.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué velocidad debemos realizar las compresiones torácicas en el niño?

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones son correctas.
- b. 90 - 100 lpm.
- c. 70 - 90 lpm.
- d. 100 - 120 lpm.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 100 - 120 lpm.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al encontrarnos un niño en un restaurante que comienza a toser repentinamente, ¿qué debemos realizar?

Seleccione una:

- a. Dar 5 golpes interescapulares si la tos es ineficaz.
- b. Ninguna de las opciones son correctas.
- c. Dar 5 golpes interescapulares si la tos es eficaz.
- d. Animar a seguir tosiendo si la tos es ineficaz.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dar 5 golpes interescapulares si la tos es ineficaz.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de lo normal se denomina:

Seleccione una:

- a. Taquipnea
- b. Polipnea
- c. Bradipnea
- d. Todas las opciones son incorrectas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bradipnea

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un paciente pediátrico con un traumatismo genitourinario, la actuación de enfermería es correcta:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones son correctas.
- b. Realizar una valoración y recogida de muestras de orina y descartar hematuria micro y macroscópica, vigilar si realiza micción espontánea o se le realiza un sondaje vesical en caso de retención o control de la diuresis del niño.
- c. Dejar el niño en la sala de espera hasta que tengamos una muestra de orina.
- d. Si se considera oportuna canalizar una vía venosa de calibre normal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizar una valoración y recogida de muestras de orina y descartar hematuria micro y macroscópica, vigilar si realiza micción espontánea o se le realiza un sondaje vesical en caso de retención o control de la diuresis del niño.

Pregunta 7

Correcta

Puntuá 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué concentración administraremos el oxígeno si sospechamos de una intoxicación por monóxido de carbón?

Seleccione una:

- a. Al 50%.
- b. Al 100%.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Al 21%, oxígeno ambiental.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Al 100%.

Pregunta 8

Correcta

Puntuá 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo definimos el casi - ahogamiento?

Seleccione una:

- a. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 6h.
- b. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 12h.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 24h.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 24h.

Pregunta 9

Correcta

Puntuá 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Con qué tipo de mascarilla podemos llegar a una FiO<sub>2</sub> del 100% usando un flujo de entre 6-15 l/min?

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Mascarilla con reservorio.
- c. Mascarilla Venturi.
- d. Mascarilla simple.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mascarilla con reservorio.

Pregunta 10

Correcta

Puntuá 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la administración de enemas, indique el correcto:

Seleccione una:

- a. Opción 2: Presionar e introducir lentamente la solución. En caso de sensación de plenitud, calambres, dolor o reacción vagal, disminuir o suspender la infusión.
- b. Opción 1: La profundidad es variable dependiendo de la edad del paciente: 2.5-3.5cm en lactantes y 5-7.5cm en niños.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Las opciones 1 y 2 son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

# Curso online. Generalidades en urgencias pediátricas para TCAE

1. Área personal
2. Mis cursos
3. AS-AU-GUP
4. Módulo 1: Organización y estructura de la urgencia pediátrica
5. Examen Módulo 1

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | lunes, 20 de enero de 2020, 20:36     |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                            |
| <b>Finalizado en</b>   | lunes, 20 de enero de 2020, 20:44     |
| <b>Tiempo empleado</b> | 7 minutos 30 segundos                 |
| <b>Puntos</b>          | 20,00/20,00                           |
| <b>Calificación</b>    | <b>10,00</b> de 10,00 ( <b>100%</b> ) |
| <b>Comentario -</b>    | Buen trabajo - Continúe con el curso  |

Pregunta 1

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el objetivo del triaje pediátrico?

Seleccione una:

- ☐ a. Tomar los datos del niño para su identificación.
- ☐ b. Diagnosticar la enfermedad del niño.
- ☒ c. Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.
- ☐ d. Ninguna de las opciones son correctas.

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.

Pregunta 2

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Las razones para realizar un traslado intrahospitalario pueden ser todas excepto:

Seleccione una:

- ☐ a. Para la realización de técnicas diagnósticas o terapéuticas que no se encuentran dentro de la unidad de urgencias, (RNM, Rx, TAC...).
- ☒ b. Para su ingreso en otro hospital de referencia de nivel superior
- ☐ c. Para llevarlo a quirófano para la realización de una intervención urgente.
- ☐ d. Para su ingreso en una planta de hospitalización

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para su ingreso en otro hospital de referencia de nivel superior

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En la etapa de destino debemos comprobar:

Seleccione una:

- ☐ a. La identificación del paciente.
- ☒ b. Todas las opciones son correctas.
- ☐ c. Colocar los aparatos en un lugar visible y conectarlo si es posible a tomas de pared.
- ☐ d. El procedimiento a realizar.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En la etapa de preparación previa para el transporte, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ a. Informar a admisión de su traslado.
- ☐ b. Asegurarnos de que el trayecto hasta el destino es practicable.
- ☐ c. Verificar la colocación de la pulsera identificativa.



d. Acompañar con el paciente la documentación necesaria.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Informar a admisión de su traslado.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Es un factor fundamental para evitar las complicaciones durante el traslado:

Seleccione una:



a. Comunicación y coordinación previa.



b. El personal adecuado para el acompañamiento.



c. Todas las opciones son correctas.



d. El material adecuado para el traslado.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

No es un modelo de triaje:

Seleccione una:



a. PETAS.



b. CTAS.



c. ESI.



d. MAT.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: PETAS.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

No es un objetivo del triaje:

Seleccione una:

- ☐ a. Diferenciar los casos urgentes.
- ☐ b. Asignar el área más adecuada para la atención del paciente.
- ☒ c. Evitar atenciones innecesarias en el servicio de urgencias.
- ☐ d. Mejorar la calidad de atención del servicio.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitar atenciones innecesarias en el servicio de urgencias.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué acción debemos realizar en la etapa de regreso?

Seleccione una:

- ☐ a. No revisar el estado del paciente.
- ☒ b. Comunicar por el sistema de notificación del centro cualquier evento adverso.
- ☐ c. No conectarlo a la red.
- ☐ d. No apuntar las constantes a la llegada.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comunicar por el sistema de notificación del centro cualquier evento adverso.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué acciones no debemos llevar a cabo en la urgencia pediátrica para asegurar la seguridad de paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Prevención de accidentes.
- ☐ b. Prevención de la infección.
- ☐ c. Identificación del paciente.
- ☒ d. Vigilancia de las úlceras por presión.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vigilancia de las úlceras por presión.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué consideración hay que tener en cuenta con las balas de oxígeno antes de realizar el traslado?

Seleccione una:

- ☐ a. Su tamaño.
- ☐ b. Su peso.
- ☐ c. Su capacidad.
- ☒ d. Su autonomía.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Su autonomía.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué consideraciones hay que tener con los monitores antes del traslado de un paciente?

Seleccione una:

- ☒ a. Verificar que tiene batería suficiente.

- ☐ b. Conocer el nivel de monitorización que requiera el paciente.
- ☐ c. Verificar su correcto funcionamiento.
- ☒ d. Todas las opciones son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué debemos considerar a la hora de realizar un transporte interhospitalario según el medio de transporte?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ b. La distancia a recorrer.
- ☐ c. La dotación del hospital.
- ☐ d. La comodidad del paciente.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La distancia a recorrer.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué dotación de enfermería debe tener el servicio de urgencias pediátricas?

Seleccione una:

- ☐ a. La relación enfermera-auxiliar deberá ser 2/1.
- ☒ b. Todas las anteriores son correctas.
- ☐ c. Un enfermero por cada 30-40 visitas diarias y un enfermero de triaje.
- ☐ d. Un auxiliar por cada 40-50 visitas diarias y uno en observación por cada seis pacientes.

### Retroalimentación



La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué es más importante en la priorización del riesgo en el paciente pediátrico?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. El diagnóstico.
- ☒ c. El riesgo vital.
- ☐ d. El tratamiento.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: El riesgo vital.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué no se debe tener en cuenta en el diseño de las áreas del servicio de urgencias pediátricas?

Seleccione una:

- ☐ a. La iluminación natural.
- ☒ b. El tamaño del hospital.
- ☐ c. Puertas con materiales transparentes.
- ☐ d. El nivel acústico adecuado.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: El tamaño del hospital.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué se evalúa en el triángulo de evaluación pediátrica?

Seleccione una:

- ☐ a. La circulación.
- ☐ b. La apariencia.
- ☐ c. La respiración.
- ☒ d. Todas las opciones son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **17**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué tiempo se considera recomendable de experiencia para trabajar en las urgencias pediátricas?

Seleccione una:

- ☐ a. 3 años para enfermería y 2 para médicos.
- ☐ b. Al menos 3 años tanto para médicos como para enfermería.
- ☒ c. 2 años para enfermería y 3 para médicos.
- ☐ d. No es necesaria una experiencia previa.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2 años para enfermería y 3 para médicos.

Pregunta **18**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de check list debíamos de realizar previo al traslado de un paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Acciones a realizar antes del traslado.
- ☒ b. Todas las opciones son correctas.
- ☐ c. Las cosas a verificar a la recepción del paciente de nuevo en las urgencias.
- ☐ d. Comprobaciones a realizar previas al mismo.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Según la escala canadiense, el paciente en situación no urgente que generalmente no requiere ninguna exploración diagnóstica y/o terapéutica, corresponde al nivel:

Seleccione una:

- ☒ a. V.
- ☐ b. III.
- ☐ c. I.
- ☐ d. IV

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: V.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Según la situación vital del paciente para el traslado interhospitalario, el transporte puede ser (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- ☐ a. Transporte demorable.
- ☒ b. Transporte normal.
- ☐ c. Transporte de emergencia.
- ☐ d. Transporte urgente.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Transporte normal.

## Curso online. Generalidades en urgencias pediátricas para TCAE


1. [Área personal](#)
2. [Mis cursos](#)
3. [AS-AU-GUP](#)
4. [Módulo 2: Reanimación cardiopulmonar pediátrica](#)
5. [Examen Módulo 2](#)

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | lunes, 20 de enero de 2020, 20:50    |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                           |
| <b>Finalizado en</b>   | lunes, 20 de enero de 2020, 20:55    |
| <b>Tiempo empleado</b> | 5 minutos 1 segundos                 |
| <b>Puntos</b>          | 20,00/20,00                          |
| <b>Calificación</b>    | 10,00 de 10,00 (100%)                |
| <b>Comentario -</b>    | Buen trabajo - Continúe con el curso |

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la velocidad de las compresiones torácicas en un niño?

Seleccione una:

- ☒ a. 100-120 lpm.
- ☐ b. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ c. 70 - 90 lpm.



d. 90 - 100 lpm.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 100-120 lpm.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Si un niños está inconsciente, ¿qué es lo primero que debemos verificar?:

Seleccione una:



a. La ausencia de respiración.



b. La permeabilidad de la vía aérea.



c. La presencia de pulso.



d. Ninguna de las opciones es correcta.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La permeabilidad de la vía aérea.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cómo no se debe dar la información a los padres ante el fallecimiento de su hijo?

Seleccione una:



a. Elegir un lugar adecuado, para facilitar la intimidad y a solas en una habitación.



b. Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.



c. La actitud debe ser profesional, explicando de forma sencilla y clara lo hechos, pero también compasiva, comprendiendo las actitudes y reacciones de los padres.



d. Explicar inmediatamente y utilizando palabras claras que el niño ha fallecido.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el acceso vascular de elección en una RCP avanzada?

Seleccione una:

- ☐ a. Vía intraósea.
- ☒ b. Vía intravenosa canalizada antes de un minuto.
- ☐ c. Vía venosa central.
- ☐ d. Ninguna de las opciones son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía intravenosa canalizada antes de un minuto.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la diferencia fundamental entre la RCP pediátrica y la RCP de adultos?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Son completamente distintas.
- ☐ c. No hay diferencias fundamentales entre ambas.
- ☒ d. En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la energía utilizada para un choque eléctrico en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- ☐ a. 9 J/Kg.
- ☒ b. 4 J/kg.
- ☐ c. 5 J/Kg.
- ☐ d. Ninguna de las opciones son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4 J/kg.

Pregunta **7**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la primera acción a realizar?

Seleccione una:

- ☐ a. Comprobar si late el corazón.
- ☒ b. Asegurar la seguridad del niño.
- ☐ c. Verificar el estado de consciencia.
- ☐ d. Comprobar si respira.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Asegurar la seguridad del niño.

Pregunta **8**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la técnica más segura para aislar la vía aérea en la RCP avanzada?

Seleccione una:

- ☐ a. Cánula orofaríngea.
- ☒ b. Intubación traqueal.
- ☐ c. Mascarilla laríngea.
- ☐ d. Ninguna de las opciones son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intubación traqueal.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los principios básicos de la ética? Señale la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Autonomía.
- ☐ b. No maleficencia.
- ☐ c. Beneficencia.
- ☒ d. Independencia.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Independencia.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuándo no finalizaremos maniobras de RCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando el reanimador esté exhausto o en grave peligro.



- ☐ b. Cuando haya por escrito una orden de no reanimar y se compruebe su existencia.
- ☐ c. Cuando haya signos evidentes de muerte biológica.
- ☒ d. Cuando la duración de la RCP sea mayor a 15 minutos.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando la duración de la RCP sea mayor a 15 minutos.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuándo mejora los resultados de la RCP?

Seleccione una:

- ☒ a. Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada y se inicia un RCP avanzada antes de los 8 minutos.
- ☐ b. Cuando se inicia la RCP básica en menos de 8 minutos.
- ☐ c. Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada y se inicia un RCP avanzada antes de los 8 minutos.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿En qué lugar debemos realizar las compresiones torácicas en el paciente pediátrico?

Seleccione una:

- ☐ a. En la zona abdominal superior.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ c. Un través de dedo por encima del apéndice xifoides.
- ☐ d. En la base de las costillas.

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un través de dedo por encima del apéndice xifoides.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué características no debe tener el carro de parada de una urgencia pediátrica?

Seleccione una:

- ☐ a. El material debe estar fácilmente visible y ordenado.
- ☐ b. El personal sanitario está obligado a revisarlo periódicamente.
- ☒ c. Sólo el personal de enfermería debe conocer el contenido del carro ya que es quien proporciona el material en caso de utilización.
- ☐ d. El carro se debe mover fácilmente, debe tener cajones y carteles bien visibles y de fácil utilización.

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sólo el personal de enfermería debe conocer el contenido del carro ya que es quien proporciona el material en caso de utilización.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué es la reanimación cardiopulmonary?

Seleccione una:

- ☐ a. Es un consenso internacional.
- ☐ b. Ninguna de las anteriores no es correcta.
- ☒ c. Un conjunto de técnicas y maniobras.
- ☐ d. Es un procedimiento médico de trabajo.

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un conjunto de técnicas y maniobras.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué hacemos si después de estimular al niño este responde llorando durante la valoración?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Lo colocaremos en posición de seguridad.
- ☐ c. Lo llevaremos a un sitio fresco y sin sol directo.
- ☒ d. No lo moveremos salvo que no esté en un lugar seguro.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: No lo moveremos salvo que no esté en un lugar seguro.

Pregunta **16**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué medicación de las siguientes es obligatoria en un carro de parada?

Seleccione una:

- ☒ a. Adrenalina.
- ☐ b. Paracetamol.
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ d. Nolotil.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adrenalina.

Pregunta **17**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué requisitos debe reunir la orden de no reanimar?

Seleccione una:

- ☐ a. Los médicos responsables son los que tomarán la decisión.
- ☐ b. No es necesario que la orden esté por escrito.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ d. Debe ser revisable.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe ser revisable.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué tenemos que hacer si tras estimular el niño no responde?

Seleccione una:

- ☐ a. Mover al niño con cuidado y colocarlo en decúbito supino.
- ☐ b. Abrir la vía aérea del niño extendiendo su cabeza y elevando su mandíbula.
- ☒ c. Todas las opciones son correctas.
- ☐ d. Gritar pidiendo ayuda.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Si no podemos abrir la vía aérea con la maniobra frente mentón, ¿qué maniobra realizaremos?

Seleccione una:

- ☐ a. No intentaremos abrir la vía aérea.

- ☐ b. Realizaremos la tracción mandibular.
- ☐ c. Repetiremos la misma maniobra.
- ☒ d. Ninguna de las opciones son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizaremos la tracción mandibular.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Si sospechamos de obstrucción en la vía aérea para conseguir una ventilación eficaz deberemos:

Seleccione una:

- ☐ a. Hacer un barrido a ciegas con el dedo.
- ☐ b. Seguir con las ventilaciones más intensamente.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ d. Abrir la boca y extraer cualquier causa de obstrucción.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Abrir la boca y extraer cualquier causa de obstrucción.

## Curso online. Generalidades en urgencias pediátricas para TCAE

1. [Área personal](#)
2. Mis cursos
3. [AS-AU-GUP](#)
4. [Módulo 3: Motivos de consulta más frecuente](#)
5. [Examen Módulo 3](#)

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>  | lunes, 20 de enero de 2020, 21:03 |
| <b>Estado</b>        | Finalizado                        |
| <b>Finalizado en</b> | lunes, 20 de enero de 2020, 21:06 |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tiempo empleado</b> | 2 minutos 47 segundos                 |
| <b>Puntos</b>          | 20,00/20,00                           |
| <b>Calificación</b>    | <b>10,00</b> de 10,00 ( <b>100%</b> ) |
| <b>Comentario -</b>    | Buen trabajo - Continúe con el curso  |

Pregunta **1**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de lo normal se denomina:

Seleccione una:

- ☒ a. Bradipnea.
- ☐ b. Taquipnea.
- ☐ c. Polipnea.
- ☐ d. Todas las opciones son incorrectas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bradipnea.

Pregunta **2**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Un niño no respira cuando:

Seleccione una:

- ☐ a. Su tórax se expande con regularidad.
- ☐ b. Sintamos su respiración al acercar la mejilla a su cara.
- ☒ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Oigamos su respiración.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna de las opciones es correcta.

Pregunta **3**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Ante una otalgia, ¿cuál es la principal patología a descartar?

Seleccione una:

- ☐ a. Faringoamigdalitis.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ c. Mastoiditis.
- ☐ d. Otitis media aguda.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mastoiditis.

Pregunta **4**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cómo realizaríamos la tolerancia oral en un niño de 2 años que llega a urgencias y es diagnosticado de gastroenteritis aguda?

Seleccione una:

- ☐ a. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente grandes cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 30 minutos de una solución oral electrolítica.
- ☒ d. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.

Pregunta **5**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Con un niño con sospecha de neumonía, dentro de la sala de observación. ¿Cuál de estos cuidados no debemos realizar?

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar lavados nasales o aspiración de secreciones en caso de ser necesario para favorecer la expectoración de secreciones y mantener las vías aéreas libres, y siempre antes de las tomas.
- ☐ b. Es importante mantener la temperatura en valores normales, ya que por cada grado que se aumenta la misma, se incrementa la FR en 4-6rpm.
- ☐ c. Todas las opciones son correctas.
- ☒ d. Colocaremos al niño en posición decúbito supino.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocaremos al niño en posición decúbito supino.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el principal criterio de riesgo cuando acude un niño a urgencias con disuria o hematuria?

Seleccione una:

- ☐ a. Deshidratación.
- ☐ b. Picor intenso.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ d. Edad del paciente.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Edad del paciente.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el rango de edad en el que hay mayor incidencia de convulsión febril?

Seleccione una:

- ☐ a. Entre 5 - 6 meses.
- ☐ b. Entre 0 - 6 meses.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ d. Entre 18 - 24 meses.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 18 - 24 meses.

Pregunta 8  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la causa más frecuente de cojera en la infancia?

Seleccione una:

- ☒ a. Traumática.
- ☐ b. Infecciosa.
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ d. Inflamatoria.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Traumática.

Pregunta 9  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la causa más frecuente de convulsión en la infancia?

Seleccione una:

- ☒ a. Fiebre.
- ☐ b. Epilepsia.
- ☐ c. Tumor cerebral.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fiebre.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la causa más frecuente de dysuria?

Seleccione una:

- ☒ a. ITU.
- ☐ b. Síndrome nefrítico.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Síndrome nefrótico.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: ITU.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La lipotimia, ¿dentro de qué categoría de síncope la podemos englobar?

Seleccione una:

- ☐ a. Síncope no cardiogénico.

- ☐ b. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☒ c. Síncope neurocardiogénico.
- ☐ d. Síncope cardiogénico.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síncope neurocardiogénico.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Los cuidados de enfermería en una bronquiolitis van encaminados fundamentalmente a:

Seleccione una:

- ☐ a. Aumentar la fluidez de las secreciones.
- ☐ b. Todas las opciones son correctas.
- ☒ c. Conseguir una disminución de la demanda de oxígeno.
- ☐ d. Que curemos la causa de la patología.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Conseguir una disminución de la demanda de oxígeno.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Los fármacos más utilizados en pediatría para la fiebre son:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ b. Paracetamol e ibuprofeno.
- ☐ c. Salbutamol.
- ☐ d. Metamizol.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Paracetamol e ibuprofeno.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué signos no nos indicarían gravedad al valorar a un niño en triaje que acude a urgencias por cefalea?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Vómitos en escopeta.
- ☐ c. Somnolencia.
- ☒ d. Puntuación de 4 en la escala de valoración del dolor.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Puntuación de 4 en la escala de valoración del dolor.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de laringitis tiene su inicio de forma brusca y de predominio nocturno?

Seleccione una:

- ☒ a. Laringitis espasmódica o estridulosa aguda.
- ☐ b. Epiglotitis aguda.
- ☐ c. Laringitis aguda viral.
- ☐ d. Ninguna de las opciones son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Laringitis espasmódica o estridulosa aguda.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Si un niño llega a urgencias con diarrea, ¿qué signo de riesgo debemos tener en cuenta durante la valoración en triaje?

Seleccione una:

- ☐ a. Alteraciones neurológicas.
- ☒ b. Deshidratación.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Compromiso de la vía respiratoria.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Deshidratación.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Un lactante llega a urgencia con un TCE tras una caída del cambiador, presenta una puntuación de 15 en la escala de Glasgow, ¿cuál sería nuestra actuación?, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Observación durante 6 - 12 horas.
- ☐ b. Control de las constantes vitales.
- ☐ c. Comenzar tolerancia oral.
- ☒ d. Ingreso en la unidad de hospitalización porque es un lactante.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ingreso en la unidad de hospitalización porque es un lactante.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Un niño de 5 años acude a urgencias con otalgia, ¿qué signos debemos valorar?, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Fiebre.
- ☒ b. Cefalea.
- ☐ c. Vértigos.
- ☐ d. Otorrea.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cefalea.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Un niño de 5 años llega a urgencias con un dolor abdominal intenso, ¿qué actuaciones realizaríamos?

Seleccione una:

- ☐ a. Control de la coloración de la piel.
- ☒ b. Control hemodinámico y valoración del dolor.
- ☐ c. Valorar la frecuencia respiratoria.
- ☐ d. Iniciar tolerancia oral de forma progresiva.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Control hemodinámico y valoración del dolor.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Un paciente de 2 años acude a urgencias y sus padres nos cuentan que ha convulsionado en casa durante un minuto, ¿cuál de las siguientes actuaciones no es prioritaria?

Seleccione una:

- ☐ a. Valoración de la vía aérea.

- ☒ b. Colaborar en la realización de una punción lumbar.
- ☐ c. Valoración del nivel de conciencia.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colaborar en la realización de una punción lumbar.

## Curso online. Generalidades en urgencias pediátricas para TCAE

1. [Área personal](#)
2. [Mis cursos](#)
3. [AS-AU-GUP](#)
4. [Módulo 4: Accidentes en la edad pediátrica](#)
5. [Examen Módulo 4](#)

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | lunes, 20 de enero de 2020, 21:09     |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                            |
| <b>Finalizado en</b>   | lunes, 20 de enero de 2020, 21:13     |
| <b>Tiempo empleado</b> | 3 minutos 33 segundos                 |
| <b>Puntos</b>          | 20,00/20,00                           |
| <b>Calificación</b>    | <b>10,00</b> de 10,00 ( <b>100%</b> ) |
| <b>Comentario -</b>    | Buen trabajo - Continúe con el curso  |

Pregunta 1  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Para elegir el adecuado tamaño de la cánula orofaríngea mediremos:

Seleccione una:

- ☐ a. No hace falta medir nada.
- ☐ b. Desde la comisura del labio al parte posterior de la oreja.
- ☐ c. El calibre va en función de la edad.
- ☒ d. Desde los incisivos centrales superiores y el ángulo de la mandíbula.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde los incisivos centrales superiores y el ángulo de la mandíbula.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué se utiliza para abrir la vía aérea?

Seleccione una:

- ☐ a. Siempre subluxación de mandíbula.
- ☐ b. Siempre tracción mandibular.
- ☒ c. Una maniobra u otra en función de la sospecha del origen de la inconsciencia.
- ☐ d. Siempre la maniobra frente-mentón.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una maniobra u otra en función de la sospecha del origen de la inconsciencia.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Intoxicación por AAS.
- ☐ c. Intoxicación por anticonvulsivos.
- ☒ d. Intoxicación por antitérmicos.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicación por antitérmicos.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

De estos síntomas, ¿cuáles no aparecen en una intoxicación etílica?

Seleccione una:

- ☐ a. Depresión del SNC.
- ☐ b. Hipotermia.
- ☒ c. Hiperglucemia.
- ☐ d. Gastritis aguda.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperglucemia.

Pregunta 5  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

De las siguientes, ¿cuáles no forman parte de las principales causas de muerte en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- ☐ a. Ahogamiento.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ c. Heridas.
- ☐ d. Accidentes de tráfico.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Heridas.

Pregunta 6  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

De las siguientes, ¿cuáles son escalas de valoración de la extensión de la superficie corporal quemada?

Seleccione una:

- ☒ a. Lund y Browder.
- ☐ b. PIPP.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Glasgow.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lund y Browder.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿De qué grado sería una quemadura con flictena y base blanquecina?

Seleccione una:

- ☒ a. Segundo grado profunda.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Tercer grado.
- ☐ d. Primer grado.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Segundo grado profunda.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En la etapa de 1 a 3 años:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.

- ☐ b. Los niños tienen conciencia de los peligros.
- ☒ c. Tienden a llevarse todo a la boca.
- ☐ d. Tienen poca autonomía, no les gusta explorar.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tienden a llevarse todo a la boca.

Pregunta **9**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿En qué etapa de la edad infantil es más frecuente el síndrome de muerte súbita?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ b. De 0 a 6 meses.
- ☐ c. De 6 a 12 meses.
- ☐ d. De 1 a 3 años.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 0 a 6 meses.

Pregunta **10**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Para qué colocaremos una sonda nasogástrica si un niño ha sufrido un casi - ahogamiento?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Para aislar la vía aérea.
- ☐ c. Para administrar alimento.
- ☒ d. Para descompresión y evacuación gástrica.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para descompresión y evacuación gástrica.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué analgésico administraríamos a un neonato de 15 días antes de canalizarle una vía venosa?

Seleccione una:

- ☒ a. Sacarosa.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Paracetamol.
- ☐ d. No precisa ninguna analgesia.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sacarosa.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué antídoto usamos si un niño acude a la urgencia por una intoxicación con paracetamol?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Naloxona.
- ☒ c. N - acetilcisteína.
- ☐ d. Flumacenilo.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: N - acetilcisteína.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué características de las siguientes son propias de los adolescentes?

Seleccione una:

- ☐ a. Tienen una gran estabilidad emocional.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ c. Adquieren mayor protagonismo los amigos.
- ☐ d. Adquieren mayor protagonismo los familiares.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adquieren mayor protagonismo los amigos.

Pregunta **14**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué no debemos evaluar en las vías respiratorias cuando un niño llega a urgencias víctima de un incendio en su domicilio?

Seleccione una:

- ☐ a. Carbonización de vellos nasales.
- ☐ b. Mucosa oral y nasal.
- ☐ c. Estridor.
- ☒ d. Frecuencia cardíaca.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Frecuencia cardíaca.

Pregunta **15**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué debemos hacer antes de realizar un lavado gástrico si el niño tiene bajo nivel de conciencia?

Seleccione una:

- ☒ a. Aislar la vía aérea.
- ☐ b. Administrar oxígeno.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Colocar al paciente en decúbito lateral derecho.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislar la vía aérea.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué producto elegimos para realizar una descontaminación del tubo digestivo?

Seleccione una:

- ☒ a. Suero fisiológico.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Agua destilada.
- ☐ d. Carbón activado.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Carbón activado.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué solución anestésica aplicaríamos en la piel del niño antes de realizar una anestesia local para hacer la sutura de una ceja?

Seleccione una:

- ☒ a. Lidocaína.

- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ c. GEL - LAT.
- ☐ d. EMLA.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: GEL - LAT.

Pregunta **18**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Según el grado de contaminación, ¿qué tipo de herida sería la ocasionada tras una apendicetomía?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Limpia.
- ☐ c. Contaminada.
- ☒ d. Limpia - contaminada.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Limpia - contaminada.

Pregunta **19**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Si llega al triaje un niño de 5 años con una cefalea intensa, ¿qué escala de dolor utilizaremos para valorarlo?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. La escala numérica.
- ☐ c. La escala CRIES.
- ☒ d. La escala de Wong Baker.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La escala de Wong Baker.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Si un niño de tres años llega a la urgencia con contusiones y hematomas en diferentes estadios, con alopecia en diferentes zonas de su cabeza y que se muestra antisocial, debemos sospechar de:

Seleccione una:

- ☐ a. Maltrato por negligencia.
- ☒ b. Maltrato físico.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Abuso sexual.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Maltrato físico.

## Curso online. Generalidades en urgencias pediátricas para TCAE

1. [Área personal](#)
2. [Mis cursos](#)
3. [AS-AU-GUP](#)
4. [Módulo 5. Técnicas y procedimientos en urgencias de pediatría](#)
5. [Examen Módulo 5](#)

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | martes, 21 de enero de 2020, 13:05 |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                         |
| <b>Finalizado en</b>   | martes, 21 de enero de 2020, 13:08 |
| <b>Tiempo empleado</b> | 3 minutos 45 segundos              |
| <b>Puntos</b>          | 19,00/20,00                        |
| <b>Calificación</b>    | 9,50 de 10,00 (95%)                |




## Comentario -

Buen trabajo - Continúe con el curso

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica?

Seleccione una:



a. Intoxicaciones por antitérmicos.



b. Ninguna de las opciones es correcta.



c. Intoxicaciones por productos del hogar.



d. Intoxicaciones por monóxido de carbono.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicaciones por antitérmicos.

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cada cuánto tiempo comprobaremos la eficacia de las maniobras en una RCP?

Seleccione una:



a. No hace falta comprobar nada.



b. Cada 5 minutos.



c. Cada minuto.



d. Cada 10 minutos.


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cada minuto.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la frecuencia respiratoria, indique la correcta:

Seleccione una:



a. Si durante la toma el paciente tose, habla o experimenta algún cambio que pueda alterar el parámetro, se anota y no se repite la medición.



b. Ninguna de las opciones es correcta.



c. Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.



d. Se debe realizar sin que el paciente ejerza ningún tipo de acción sobre su respiración, haciendo que sea lo más natural posible. Comprobar que no haya realizado ningún ejercicio físico ni emocional antes, si es así, esperar 30 - 40 min para realizar la técnica.


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la saturación de oxígeno, indique la correcta:

Seleccione una:


- ☐ a. Hay que tener en cuenta que si vamos a mantener puesto el pulsioxímetro durante días hay que cambiar la localización del sensor una vez al día, para evitar lesiones en la piel.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ c. Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.
- ☐ d. En condiciones normales debe estar por encima del 90%.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.

Pregunta 5  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones a tener en cuenta con el niño a la hora de la realización de una técnica, indique la correcta:

Seleccione una:


- ☐ a. Opción 2: Tener en cuenta que cada niño reacciona de manera diferente ante una misma situación, que su reacción no es mejor ni peor, no se debe comparar. Si el niño presenta una rabieta debemos obviarla, manteniendo una actitud firme y positiva.
- ☐ b. Opción 1: Siempre hay que decir la verdad al niño, ya que la mentira hace perder la confianza del niño hacia los profesionales.
- ☒ c. Las opciones 1 y 2 son correctas.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta 6  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones que tenemos que tener en cuenta con la familia del paciente a la hora de realizar una técnica, indique la correcta:

Seleccione una:



a. Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.



b. Es adecuado pedir ayuda a los familiares para inmovilizar al niño, ya que suponen un apoyo en procedimientos desagradables.



c. Ninguna de las opciones es correcta.




d. La presencia de los padres durante la realización del procedimiento debe ser obligatoria en todos los procedimientos; en muchas ocasiones la familia va a ser el mejor apoyo que el niño puede tener durante la realización de la técnica.

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.

Pregunta 7  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Con respecto a las recomendaciones comunes para la preparación del niño antes de la realización de cualquier procedimiento, durante y después del mismo, indique la correcta:

Seleccione una:



a. Limitar el número de personas extrañas durante el procedimiento. Centrarse primero en el procedimiento y luego en el niño.



b. Comprobar la correcta identificación del paciente.



c. Ninguna de las opciones es correcta.




d. No avisar al niño del inicio del procedimiento, no pedir su colaboración ni ir explicándole en todo momento paso a paso todo lo que le vamos haciendo para no crearle más ansiedad.

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar la correcta identificación del paciente.

Pregunta **8**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la técnica de elección para recoger una muestra de orina cuando los niños no controlan la micción?

Seleccione una:



a. Ninguna de las opciones es correcta.



b. Por micción espontánea.



c. Con bolsa adhesiva perineal.




d. Sondaje vesical.

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Con bolsa adhesiva perineal.

Pregunta **9**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

En la colocación de una férula, indique lo incorrecto:

Seleccione una:

- ☒ a. Opción 1: Se retirarán pulseras, anillos y otros enseres que puedan entorpecer la realización de la técnica y para prevenir la posible aparición de edema del miembro que se va a inmovilizar.
- ☐ b. Opción 2: Se procede a proteger la piel: Vendaje tubular: se realiza para evitar que el vello del miembro se quede pegado al yeso, facilitando la transpiración, elimina las asperezas de los extremos del yeso y facilita la retirada del mismo. La venda tubular se dobla sobre el yeso una vez colocado éste.
- ☐ c. Opción 3: Se procede a la realización de la férula. Para ello se mide la longitud necesaria de la zona donde se vaya a colocar la férula. A continuación, se realizan dobleces de la venda de escayola utilizando entre 10-12 capas.
- ☐ d. Las opciones 1 y 2 son correctas.


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opción 3: Se procede a la realización de la férula. Para ello se mide la longitud necesaria de la zona donde se vaya a colocar la férula. A continuación, se realizan dobleces de la venda de escayola utilizando entre 10-12 capas.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

En la técnica de aspiración de secreciones, indique lo correcto:

Seleccione una:


- ☒ a. Esta técnica se realiza para la toma de muestras de un esputo inducido o de muestras de secreciones faríngeas.
- ☐ b. Es una técnica no estéril.
- ☐ c. Se puede realizar tras las comidas.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esta técnica se realiza para la toma de muestras de un esputo inducido o de muestras de secreciones faríngeas.

Pregunta **11**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En la ventilación con bolsa autohinchable, indique la respuesta incorrecta:

Seleccione una:



a. Se retira el cabecero de la cama en el caso que el paciente esté en una cama y se separa de la pared.



b. Se conecta la bolsa autohinchable a la toma de oxígeno para realizar una hiperoxigenación con una FiO<sub>2</sub> del 50% según indicaciones. Colocar la mascarilla en la cara del paciente cubriendo nariz y boca con la mano dominante abarcando la mascarilla y el mentón del paciente.



c. Hay que comprobar el correcto funcionamiento de la toma de oxígeno.




d. Colocar al paciente en posición olfateo. Coger la bolsa autohinchable del tamaño adecuado al niño y colocarle la mascarilla apropiada.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se conecta la bolsa autohinchable a la toma de oxígeno para realizar una hiperoxigenación con una FiO<sub>2</sub> del 50% según indicaciones. Colocar la mascarilla en la cara del paciente cubriendo nariz y boca con la mano dominante abarcando la mascarilla y el mentón del paciente.

Pregunta **12**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿En qué etapa del desarrollo del niño, la comunicación con su entorno se produce principalmente por el tacto y el contacto?

Seleccione una:



a. Lactante.



b. Ninguna de las opciones es correcta.



c. Neonato.



d. Niño pequeño.


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Neonato.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Indique cuál de los siguientes no es un objetivo para colocar una sonda nasogástrica:

Seleccione una:



a. Realizar lavado gástrico en caso de intoxicaciones.



b. Aspiración o drenaje del contenido gástrico con fines diagnósticos o terapéuticos.



c. Ninguna de las opciones es correcta.



d. Administración de alimentación oral.


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Administración de alimentación oral.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Indique la afirmación correcta de la administración de carbón activado:



Seleccione una:


- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Si se administra por vía oral, se puede dar solo o mezclar con agua, zumo, lácteos o bebidas carbonatadas.
- ☒ c. Está contraindicado en la ingestión de cáusticos.
- ☐ d. No se puede repetir la dosis si lo vomitan.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está contraindicado en la ingestión de cáusticos.

Pregunta **15**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Indique qué tenemos que tener en cuenta cuando retiramos un catéter periférico:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. No es necesario observar el punto de inserción del catéter ya que lo estamos retirando.
- ☒ c. Observar que el catéter está íntegro, si no lo estuviera hay que notificarlo al personal responsable inmediatamente.
- ☐ d. Mantener la presión durante 5-7 minutos. Si el paciente tiene algún problema de coagulación mantenerla durante 15 minutos.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Observar que el catéter está íntegro, si no lo estuviera hay que notificarlo al personal responsable inmediatamente.

Pregunta **16**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La temperatura central se toma en:

Seleccione una:

- ☐ a. La axila.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. La cavidad oral.
- ☒ d. El recto.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: El recto.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Para la administración de fármacos por vía respiratoria a través de aerosoles/inhaladores con cámara expansora, indique lo incorrecto:

Seleccione una:

- ☐ a. Sin separar la mascarilla de la cara del paciente de administra un puff del fármaco mientras contamos hasta 10 a un ritmo normal mientras que el paciente va respirando, cuando hemos terminado podemos o retirar la mascarilla o volver a administrar.
- ☐ b. Se colocará al paciente en Fowler o Semi-fowler.
- ☒ c. Acoplar en el lado contrario la mascarilla del tamaño del paciente y se le coloca en la cara abarcando sólo la nariz.



d. Acoplar el inhalador a la cámara en posición vertical haciendo forma de L.


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Acoplar en el lado contrario la mascarilla del tamaño del paciente y se le coloca en la cara abarcando sólo la nariz.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

¿Qué férula es la que va desde las cabezas de los metatarsianos hasta el extremo superior de la pantorrilla, en un punto situado 3-4 cm por debajo del tubérculo de la tibia?

Seleccione una:



a. Férula isquiomaleolar.



b. Férula posterior de tobillo o suropédica.



c. Férula isquiopédica.



d. Ninguna de las opciones es correcta.


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Férula posterior de tobillo o suropédica.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

¿Qué material es necesario para colocar una férula de Zimmer?

Seleccione una:


- ☒ a. Las opciones 1 y 2 son correctas.
- ☐ b. Opción 2: Venda de algodón y venda elástica.
- ☐ c. Opción 1: Tiras de esparadrapo y férula de aluminio.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta **20**  
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Si tomamos la frecuencia cardíaca a través de un monitor. ¿Dónde se coloca el electrodo amarillo previa limpieza de la piel del paciente?

Seleccione una:

- ☒ a. Debajo de la clavícula, cerca del hombro derecho.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. En el lado inferior izquierdo debajo del abdomen, o debajo del apéndice xifoides.
- ☐ d. Debajo de la clavícula, cerca del hombro izquierdo.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debajo de la clavícula, cerca del hombro izquierdo.

---


# Curso online. Generalidades en urgencias pediátricas para TCAE

1. [Área personal](#)
2. [Mis cursos](#)
3. [AS-AU-GUP](#)
4. [Prueba Final del Curso](#)
5. [Examen final del curso](#)

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | martes, 21 de enero de 2020, 13:18    |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                            |
| <b>Finalizado en</b>   | martes, 21 de enero de 2020, 13:24    |
| <b>Tiempo empleado</b> | 6 minutos 15 segundos                 |
| <b>Puntos</b>          | 30,00/30,00                           |
| <b>Calificación</b>    | <b>10,00</b> de 10,00 ( <b>100%</b> ) |
| <b>Comentario -</b>    | Buen trabajo - Continúe con el curso  |

Pregunta **1**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el objetivo del triaje pediátrico?

Seleccione una:



a. Ninguna de las opciones son correctas.



b. Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.



c. Tomar los datos del niño para su identificación.




d. Diagnosticar la enfermedad del niño.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.

Pregunta **2**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Las razones para realizar un traslado intrahospitalario pueden ser todas excepto:

Seleccione una:



a. Para la realización de técnicas diagnósticas o terapéuticas que no se encuentras dentro de la unidad de urgencias, (RNM, Rx, TAC...).



b. Para llevarlo a quirófano para la realización de una intervención urgente.



c. Para su ingreso en una planta de hospitalización




d. Para su ingreso en otro hospital de referencia de nivel superior

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para su ingreso en otro hospital de referencia de nivel superior

Pregunta 3  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En la etapa de destino debemos comprobar:

Seleccione una:



a. El procedimiento a realizar.



b. Todas las opciones son correctas.



c. La identificación del paciente.




d. Colocar los aparatos en un lugar visible y conectarlo si es posible a tomas de pared.

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **4**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

En la etapa de preparación previa para el transporte, señale la incorrecta:

Seleccione una:


- ☐ a. Asegurarnos de que el trayecto hasta el destino es practicable.
- ☐ b. Verificar la colocación de la pulsera identificativa.
- ☒ c. Informar a admisión de su traslado.
- ☐ d. Acompañar con el paciente la documentación necesaria.

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Informar a admisión de su traslado.

Pregunta **5**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Es un factor fundamental para evitar las complicaciones durante el traslado:

Seleccione una:

- ☐ a. El material adecuado para el traslado.
- ☐ b. Comunicación y coordinación previa.



c. Todas las opciones son correctas.




d. El personal adecuado para el acompañamiento.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **6**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

No es un modelo de triaje:

Seleccione una:



a. MAT.



b. CTAS.



c. PETAS.




d. ESI.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: PETAS.

Pregunta **7**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la velocidad de las compresiones torácicas en un niño?

Seleccione una:





a. 90 - 100 lpm.



b. 100-120 lpm.



c. Ninguna de las opciones son correctas.



d. 70 - 90 lpm.


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: 100-120 lpm.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Si un niño está inconsciente, ¿qué es lo primero que debemos verificar?:

Seleccione una:



a. Ninguna de las opciones es correcta.



b. La presencia de pulso.



c. La permeabilidad de la vía aérea.



d. La ausencia de respiración.


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: La permeabilidad de la vía aérea.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

¿Cómo no se debe dar la información a los padres ante el fallecimiento de su hijo?

Seleccione una:


- ☐ a. La actitud debe ser profesional, explicando de forma sencilla y clara lo hechos, pero también compasiva, comprendiendo las actitudes y reacciones de los padres.
- ☒ b. Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.
- ☐ c. Elegir un lugar adecuado, para facilitar la intimidad y a solas en una habitación.
- ☐ d. Explicar inmediatamente y utilizando palabras claras que el niño ha fallecido.

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.

Pregunta **10**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el acceso vascular de elección en una RCP avanzada?

Seleccione una:


- ☐ a. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☒ b. Vía intravenosa canalizada antes de un minuto.
- ☐ c. Vía venosa central.
- ☐ d. Vía intraósea.

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía intravenosa canalizada antes de un minuto.

Pregunta **11**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la diferencia fundamental entre la RCP pediátrica y la RCP de adultos?

Seleccione una:



a. No hay diferencias fundamentales entre ambas.



b. En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.



c. Son completamente distintas.



d. Ninguna de las opciones es correcta.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la energía utilizada para un choque eléctrico en la edad pediátrica?

Seleccione una:



a. 5 J/Kg.



b. Ninguna de las opciones son correctas.



c. 9 J/Kg.




d. 4 J/kg.

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4 J/kg.

Pregunta **13**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

La disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de lo normal se denomina:

Seleccione una:


- ☐ a. Polipnea.
- ☐ b. Taquipnea.
- ☒ c. Bradipnea.
- ☐ d. Todas las opciones son incorrectas.

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bradipnea.

Pregunta **14**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Un niño no respira cuando:

Seleccione una:

- ☒ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Sintamos su respiración al acercar la mejilla a su cara.



c. Su tórax se expande con regularidad.




d. Oigamos su respiración.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna de las opciones es correcta.

Pregunta **15**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Ante una otalgia, ¿cuál es la principal patología a descartar?

Seleccione una:



a. Faringoamigdalitis.



b. Ninguna de las opciones es correcta.



c. Otitis media aguda.




d. Mastoiditis.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mastoiditis.

Pregunta **16**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cómo realizaríamos la tolerancia oral en un niño de 2 años que llega a urgencias y es diagnosticado de gastroenteritis aguda?

Seleccione una:


- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ b. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.
- ☐ c. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente grandes cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.
- ☐ d. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 30 minutos de una solución oral electrolítica.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.

Pregunta **17**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Con un niño con sospecha de neumonía, dentro de la sala de observación. ¿Cuál de estos cuidados no debemos realizar?

Seleccione una:


- ☐ a. Realizar lavados nasales o aspiración de secreciones en caso de ser necesario para favorecer la expectoración de secreciones y mantener las vías aéreas libres, y siempre antes de las tomas.
- ☒ b. Colocaremos al niño en posición decúbito supino.
- ☐ c. Es importante mantener la temperatura en valores normales, ya que por cada grado que se aumenta la misma, se incrementa la FR en 4-6rpm.
- ☐ d. Todas las opciones son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocaremos al niño en posición decúbito supino.

Pregunta **18**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el principal criterio de riesgo cuando acude un niño a urgencias con disuria o hematuria?

Seleccione una:


- ☒ a. Edad del paciente.
- ☐ b. Deshidratación.
- ☐ c. Picor intenso.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Edad del paciente.

Pregunta **19**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Para elegir el adecuado tamaño de la cánula orofaríngea mediremos:

Seleccione una:

- ☒ a. Desde la comisura del labio al parte posterior de la oreja.
- ☐ b. El calibre va en función de la edad.
- ☐ c. No hace falta medir nada.
- ☐ d. Desde los incisivos centrales superiores y el ángulo de la mandíbula.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde los incisivos centrales superiores y el ángulo de la mandíbula.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué se utiliza para abrir la vía aérea?

Seleccione una:



a. Siempre subluxación de mandíbula.



b. Una maniobra u otra en función de la sospecha del origen de la inconsciencia.



c. Siempre la maniobra frente-mentón.



d. Siempre tracción mandibular.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una maniobra u otra en función de la sospecha del origen de la inconsciencia.

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica?

Seleccione una:



a. Intoxicación por antitérmicos.



b. Intoxicación por AAS.



c. Ninguna de las opciones es correcta.





d. Intoxicación por anticonvulsivos.


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicación por antitérmicos.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

De estos síntomas, ¿cuáles no aparecen en una intoxicación etílica?

Seleccione una:



a. Hipotermia.



b. Depresión del SNC.



c. Hiperglucemia.



d. Gastritis aguda.


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperglucemia.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

De las siguientes, ¿cuáles no forman parte de las principales causas de muerte en la edad pediátrica?

Seleccione una:



a. Ahogamiento.



b. Ninguna de las opciones es correcta.



c. Accidentes de tráfico.



d. Heridas.


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Heridas.

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

De las siguientes, ¿cuáles son escalas de valoración de la extensión de la superficie corporal quemada?

Seleccione una:



a. Glasgow.



b. Ninguna de las opciones es correcta.



c. Lund y Browder.



d. PIPP.


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lund y Browder.

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica?

Seleccione una:


- ☐ a. Intoxicaciones por monóxido de carbono.
- ☐ b. Intoxicaciones por productos del hogar.
- ☒ c. Intoxicaciones por antitérmicos.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicaciones por antitérmicos.

Pregunta **26**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cada cuánto tiempo comprobaremos la eficacia de las maniobras en una RCP?

Seleccione una:

- ☐ a. No hace falta comprobar nada.
- ☐ b. Cada 5 minutos.
- ☐ c. Cada 10 minutos.
- ☒ d. Cada minuto.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cada minuto.

Pregunta **27**  
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la frecuencia respiratoria, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Si durante la toma el paciente tose, habla o experimenta algún cambio que pueda alterar el parámetro, se anota y no se repite la medición.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ c. Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.
- ☐ d. Se debe realizar sin que el paciente ejerza ningún tipo de acción sobre su respiración, haciendo que sea lo más natural posible. Comprobar que no haya realizado ningún ejercicio físico ni emocional antes, si es así, esperar 30 - 40 min para realizar la técnica.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la saturación de oxígeno, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. En condiciones normales debe estar por encima del 90%.
- ☒ b. Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.



d. Hay que tener en cuenta que si vamos a mantener puesto el pulsioxímetro durante días hay que cambiar la localización del sensor una vez al día, para evitar lesiones en la piel.


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones a tener en cuenta con el niño a la hora de la realización de una técnica, indique la correcta:

Seleccione una:



a. Ninguna de las opciones es correcta.



b. Las opciones 1 y 2 son correctas.



c. Opción 2: Tener en cuenta que cada niño reacciona de manera diferente ante una misma situación, que su reacción no es mejor ni peor, no se debe comparar. Si el niño presenta una rabieta debemos obviarla, manteniendo una actitud firme y positiva.



d. Opción 1: Siempre hay que decir la verdad al niño, ya que la mentira hace perder la confianza del niño hacia los profesionales.


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones que tenemos que tener en cuenta con la familia del paciente a la hora de realizar una técnica, indique la correcta:

Seleccione una:



a. La presencia de los padres durante la realización del procedimiento debe ser obligatoria en todos los procedimientos; en muchas ocasiones la familia va a ser el mejor apoyo que el niño puede tener durante la realización de la técnica.



b. Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.



c. Ninguna de las opciones es correcta.



d. Es adecuado pedir ayuda a los familiares para inmovilizar al niño, ya que suponen un apoyo en procedimientos desagradables.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.

### Ejercicio fin de curso

Está trabajando como TCAE en una urgencia pediátrica. En el Box 2 se encuentra un niño de 6 años que ha entrado por su pie y que ha acudido a urgencias por cuadro catarral y fiebre. Al acceder al box el niño está inconsciente. Enumere las tres primeras acciones que llevaría a cabo. Indíquelas por orden de realización, y argumente de forma breve el por qué de cada una de ellas.

1. Primero pediría ayuda en voz alta si voy sola al box para alertar al resto de compañeros de la unidad

2. Muevo al niño con cuidado y lo pongo en decúbito supino

3. Compruebo si el niño respira o no. Si respira lo coloco en posición de seguridad y en caso negativo trato de abrir la vía aérea realizando la maniobra frente-mentón o la maniobra de tracción mandibular, a continuación compruebo que ningún cuerpo extraño obstruya la vía y en caso negativo comenzaría con 15 compresiones torácicas intercaladas con 5 respiraciones, mientras llega la ayuda de los facultativos y los compañeros .