

TEST 3

Pregunta 1

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

124.- La onda P es negativa en las siguientes derivaciones:

Seleccione una:

- a. DI.
- b. aVL.
- c. aVR.
- d. Todas son falsas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

131.- Si la víctima de un atragantamiento quedase inconsciente, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. La llevaremos con cuidado hasta el suelo.
- b. Activaremos inmediatamente el servicio de emergencia médica.
- c. Le daremos agua para que se le baje el cuerpo extraño.
¡Bien, correcto!
- d. Comenzaremos RCP.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

123.- Para frecuencias bajas y los ritmos irregulares usaremos el método de:

Seleccione una:

- a. Contar los complejos QRS que hay en 6 segundos y multiplicar por diez.
¡Bien, correcto!
- b. Contar los complejos QRS que hay en 6 segundos y multiplicar por seis.
- c. Contar los complejos QRS que hay en 10 segundos y multiplicar por diez.
- d. Contar los complejos QRS que hay en 10 segundos y multiplicar por seis.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

136.- Cuando no hay personal experto en la intubación traqueal, las alternativas aceptables son:

Seleccione una:

- a. El combitubo.
- b. La mascarilla laríngea.
- c. El tubo laríngeo.
- d. Todas son correctas.
¡Bien, correcto!

Pregunta 5

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

142.- En el tratamiento de la fibrilación auricular:

Seleccione una:

- a. Se administrará un primer choque de 150 –200 J bifásicos o 360 J monofásicos.
Mal, debes repasar un poco
- b. No se hará cardioversión en fibrilaciones auriculares de más de 24 horas hasta que el paciente no sea tratado con anticoagulantes durante 3-4 semanas.
- c. El tercer choque será de 150- 360 J bifásicos o 360 J monofásicos.
- d. A y c son verdaderas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

141.- Son signos adversos que nos pueden indicar inestabilidad de un paciente en la valoración de una bradicardia, todos excepto:

Seleccione una:

- a. Presión sanguínea sistólica > 90 mmHg.
¡Bien, correcto!
- b. Frecuencia cardíaca < 40 lat/min.
- c. Arritmias ventriculares que necesitan ser suprimidas.
- d. Fallo cardíaco.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

134.- Si se confirma que la víctima está en FV o TV, el primer choque que aplicaremos será:

Seleccione una:

- a. 150-360 J bifásicos.
- b. 150-360 J bifásicos.



c. 150-200 J bifásicos.

¡Bien, correcto!



d. 150-200 J monofásicos.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

143.- Son taquicardias regulares de complejo estrecho:

Seleccione una:



a. Taquicardia sinusal.



b. TRNAV y TRAV.



c. Flutter auricular con conducción AV regular.



d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

121.- En un electrocardiograma normal la onda P tiene una duración de:

Seleccione una:



a. 0,15 segundos.



b. 0,11 segundos.

¡Bien, correcto!



c. 0,10 segundos.



d. 0,09 segundos.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

138.- La adrenalina se administrará durante la RCP:

Seleccione una:

- a. Si la FV/TV persiste tras dos choques (según la base de un consenso de expertos).
- b. Se repetirá su administración cada 3-5 minutos.
- c. No se debe interrumpir la RCP para administrar esta droga.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!