

TEST 4

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

152.- El primer acceso venoso en un politraumatizado es el anterocubital, si fuera posible su calibre debe de ser:

Seleccione una:



a. El más grande posible.

¡Bien, correcto!



b. Abocath 16.



c. Abocath 18.



d. Abocath 20.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

161.- En la técnica de actuación de la camilla de cuchara:

Seleccione una:



a. Se sitúa la camilla paralela a uno de los lados del paciente.



b. Regulamos su longitud a través de los anclajes laterales.



c. Una vez que el paciente esté en la camilla lo sujetaremos con las cinchas para evitar su caída.



d. Todas las anteriores son actuaciones correctas en el manejo de la camilla de

cuchara.

¡Bien, correcto!

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

146.- En el paciente politraumatizado las funciones deben de ser evaluadas de manera:

Seleccione una:

- ☐ a. Rápida.
- ☐ b. Tranquilamente.
- ☐ c. Eficientemente.
- ☒ d. A y c son verdaderas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

156.- El principal problema que se genera en la utilización de férulas neumáticas de vacío:

Seleccione una:

- ☐ a. Son muy incómodas.
- ☐ b. No inmovilizan bien.
- ☐ c. En traslados aéreos pierden consistencia.
- ☒ d. Todas son falsas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

151.- La principal causa que produce en un politraumatizado una PCR es:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipovolemia.
- ☐ b. Dolor.
- ☒ c. Obstrucción de vía aérea.
Mal, debes repasar un poco
- ☐ d. Hipoxia.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

144.- El segundo pico de muerte se le llama:

Seleccione una:

- ☐ a. Minuto de oro.
- ☐ b. Pico crítico.
- ☐ c. Pico decisivo.
- ☒ d. Hora de oro.

¡Bien, correcto!

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

160.- Para el traslado de una paciente embarazada debe optar una posición que es:

Seleccione una:

- ☐ a. Anti-Trendelemburg.
- ☐ b. Trendelemburg.
- ☐ c. Supino.
- ☒ d. Decúbito lateral izquierdo.

¡Bien, correcto!

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

155.- Para la inmovilización de la columna vertebral se utiliza un corsé llamado Kendrick y el mínimo para colocarlo es de:

Seleccione una:

- ☐ a. 3 personas.
- ☒ b. 2 personas.
- ☐ c. 1 persona.
- ☐ d. 4 personas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

158.- En el periodo de monitorización del politraumatizado se utilizará la pulxiosimetría cuyos valores óptimos de saturación de oxígeno deben ser:

Seleccione una:

- ☐ a. 90 %.
- ☒ b. > 95%.
- ☐ c. 85%.
- ☐ d. > 85%.

¡Bien, correcto!

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

157.- A la hora de evaluar la columna cervical y cuello hay que observar la tráquea y estamos ante una patología cuando ésta se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. Desviada a la izquierda.
- ☐ b. Medial.
- ☐ c. Desviada a la derecha.

☒ d. A y c son verdaderas.

¡Bien, correcto!