

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cómo se puede administrar el Remifentanilo?

Seleccione una:

- ☐ a. Bolo directo.
- ☐ b. Inyección directa.
- ☒ c. Perfusión.
- ☐ d. Inyección lenta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Perfusión.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué acción llevaría a cabo inicialmente ante un paciente que se encuentra con la vía aérea aislada, monitorizado y conectado a ventilación mecánica en el que detectamos PCR?

Seleccione una:

- ☐ a. Iniciar compresiones torácicas y desfibrilar en cuanto esté disponible el desfibrilador.
- ☒ b. Observar el monitor del paciente para saber que lado del algoritmo debemos seguir para guiarnos.
- ☐ c. Administrar Adrenalina y Amiodarona en cuanto la tengamos preparada.
- ☐ d. Realiza desfibrilación precoz a 200J con desfibrilador bifásico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Observar el monitor del paciente para saber que lado del algoritmo debemos seguir para guiarnos.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los volúmenes pulmonares estáticos encontramos:

Seleccione una:

- ☐ a. Capacidad vital forzada
- ☐ b. Volumen espiratorio forzado
- ☐ c. Índice VEMS
- ☒ d. Volumen corriente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Volumen corriente

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un valor 0 en el Índice Biespectral, nos indica:

Seleccione una:

- ☐ a. paciente despierto.
- ☐ b. sedación profunda.
- ☐ c. supresión de ondas.
- ☒ d. ausencia de actividad cerebral.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: ausencia de actividad cerebral.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La aspiración continua de secreciones subglóticas y la descontaminación selectiva del tubo digestivo son:

Seleccione una:

- ☐ a. Medidas básicas de obligado cumplimiento para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica.
- ☒ b. Medidas optativas específicas altamente recomendables para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica.
- ☐ c. a y b son correctas.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Medidas optativas específicas altamente recomendables para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué lugar se posiciona el electrodo rojo para la monitorización?

Seleccione una:

- ☒ a. Debajo de la clavícula y cerca del hombro derecho.
- ☐ b. debajo de la clavícula y cerca del hombro izquierdo.
- ☐ c. Parte inferior izquierda del abdomen.
- ☐ d. Parte inferior derecha del abdomen.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debajo de la clavícula y cerca del hombro derecho.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la OMS, ¿Qué fármaco se encuentra en el primer escalón terapéutico para el dolor?

Seleccione una:

- ☒ a. Metamizol.
- ☐ b. Tradadol.
- ☐ c. Fentanilo.
- ☐ d. Morfina.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Metamizol.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los cuidados a tener en cuenta en la monitorización hemodinámica incluyen todos los

Seleccione una:

- ☐ a. Colocar el transductor en el eje flebostático
- ☐ b. Mantener la bolsa de suero de lavado bajo presión continua de 300 mmHg
- ☐ c. Poner a cero y calibrar los aparatos al menos una vez por turno
- ☒ d. Utilizar para el lavado del catéter suero glucosado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar para el lavado del catéter suero glucosado

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto tiempo debemos esperar para iniciar las maniobras de intubación orotraqueal después del BNM?

Seleccione una:

- ☒ a. 60 – 90 segundos

- ☐ b. El tiempo no es importante. La relajación es automática.
- ☐ c. menor que 30 segundos
- ☐ d. El tiempo es importante. La relajación es automática.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 60 – 90 segundos

Pregunta **10**


Incorrecta

Puntúa -0,25 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La fase D-E (fase IV) de la capnografía corresponde a:



Seleccione una:

- ☐ a. Ventilación del espacio muerto.
- ☐ b. ventilación alveolar.
- ☐ c. Ventilación del espacio muerto junto con el alveolar.
- ☒ d. inicio de la inspiración

Retroalimentación

La respuesta correcta es: inicio de la inspiración

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no corresponden a los Criterios de Berlin?

Seleccione una:

- ☐ a. Temporalidad
- ☒ b. Ecografía
- ☐ c. Radiografía
- ☐ d. Oxigenación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ecografía

Pregunta **12**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la onda de pulso anácroto ¿qué le puede estar sucediendo al paciente?

Seleccione una:

- ☒ a. Estenosis aórtica pronunciada.
- ☐ b. Insuficiencia cardíaca avanzada.
- ☐ c. Doble lesión aórtica.
- ☐ d. taponamiento cardíaco

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estenosis aórtica pronunciada.

Pregunta **13**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Antes de comenzar con la maniobra de PRONO deberemos. Señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Valorar la necesidad de analgesia.
- ☐ b. Seguir una sistemática y quitar todo aquello que no sea imprescindible para la maniobra.
- ☒ c. Mantener toda la monitorización del paciente, incluida la invasiva.
- ☐ d. Comprobar el estado de la VA (presión del neumotaponamiento, señal de posición, etc.)

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mantener toda la monitorización del paciente, incluida la invasiva.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Escala de Ramsay se utiliza para:

Seleccione una:

- ☐ a. Valorar el dolor.
- ☐ b. valorar la relajación muscular.
- ☒ c. Evaluación de la sedación
- ☐ d. ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evaluación de la sedación

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La probabilidad de que suceda algún evento adverso durante la asistencia sanitaria y tenga un impacto negativo sobre el paciente se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Daño asociado a la atención sanitaria.
- ☐ b. Incidente en seguridad del paciente.
- ☒ c. Riesgo asistencial.
- ☐ d. Circunstancia notificable.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Riesgo asistencial.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes no es una recomendación ante un paciente infectado por SARS-COV2?

Seleccione una:

- ☐ a. Evitar procedimientos que puedan generar aerosoles.
- ☐ b. Anticiparnos al realizar una técnica que pueda generar aerosoles para tomar medidas.
- ☒ c. Se recomienda la ventilación manual en todos los pacientes que necesiten soporte ventilatorio.
- ☐ d. El personal expuesto debe ser el mínimo indispensable.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se recomienda la ventilación manual en todos los pacientes que necesiten soporte ventilatorio.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante la reanimación cardiopulmonar de un paciente en Asistolia, ¿cuál de las siguientes acciones es correcta?

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar desfibrilación a 200J tan pronto como sea posible.
- ☒ b. Administrar 1mg de Adrenalina en cuanto se disponga de acceso vascular.
- ☐ c. Administrar 300mg de Amiodarona después de la tercera descarga.
- ☐ d. Realizar compresiones torácicas a una frecuencia de 100 compresiones por minuto como máximo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Administrar 1mg de Adrenalina en cuanto se disponga de acceso vascular.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las ventajas y los inconvenientes de la ventilación mecánica no invasiva se encuentran:

Seleccione una:

- ☐ a. Heridas por presión en la zona de la máscara
- ☐ b. Disminución del riesgo de infección
- ☐ c. Distensión gástrica
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La seguridad clínica es:

Seleccione una:

- ☒ a. La reducción del riesgo innecesario del daño asociado a la asistencia sanitaria a un mínimo aceptable.
- ☐ b. Daño asociado a la atención sanitaria.
- ☐ c. Un incidente adverso.
- ☐ d. Disminución de la progresión de la enfermedad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La reducción del riesgo innecesario del daño asociado a la asistencia sanitaria a un mínimo aceptable.

Pregunta **20**

Incorrecta

Puntúa -0,25 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son procedimientos de ALTO riesgo, excepto:

Seleccione una:

- ☐ a. Aerosolterapia, nebulización.
- ☒ b. Inserción de vía venosa o arterial.
- ☐ c. Gafas nasales de alto flujo.
- ☐ d. Aspiración de secreciones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inserción de vía venosa o arterial.

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes afirmaciones, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Las GNAF no se recomiendan en casos de hipercapnia, inestabilidad hemodinámica o fallo multiorgánico.

- ☐ b. Las VMNI no se recomienda por no ser efectivo en los pacientes con COVID-19.
- ☒ c. Las GNAF son un método de oxigenoterapia en estos pacientes y puede evitar la ventilación mecánica invasiva.
- ☐ d. Las GNAF y la VMNI se usa en casos muy concretos y seleccionados.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las GNAF son un método de oxigenoterapia en estos pacientes y puede evitar la ventilación mecánica invasiva.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un paciente intubado en el que se observa en el monitor una taquicardia de complejo ancho (taquicardia ventricular) ¿cuál sería nuestra primera intervención?

Seleccione una:

- ☐ a. Desfibrilación en cuanto esté cargado el desfibrilador.
- ☒ b. Valorar presencia de pulso.
- ☐ c. Iniciar compresiones.
- ☐ d. Administrar Adrenalina IV.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valorar presencia de pulso.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al incidente que produce daño a un paciente se le conoce como:

Seleccione una:

- ☒ a. Evento adverso.
- ☐ b. Suceso centinela o crítico.



c. Error.



d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evento adverso.

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y otras instituciones nacionales, ¿cuál de los siguientes parámetros se pautan para la VM invasiva?

Seleccione una:



a. $V_c = 4 - 6 \text{ ml/kg}$



b. Driving pressure menor que 15 cmH₂O



c. menor que 30 cmH₂O



d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El equipo necesario ante un procedimiento que pueda generar aerosoles en un paciente con SARS-COV2 es:

Seleccione una:



a. Mascarilla, bata de manga larga, protección ocular y guantes.



b. Mascarilla, bata y guantes.



c. Mascarilla, protección ocular y guantes.



d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mascarilla, bata de manga larga, protección ocular y guantes.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son medidas de prevención de bacteriemia relacionada con el catéter todas excepto:

Seleccione una:



a. Higiene de manos adecuada.



b. Desinfección de la piel con solución hidroalcohólica.



c. Preferencia de localización subclavia.



d. Medidas de barrera total durante la inserción.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desinfección de la piel con solución hidroalcohólica.

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál de las siguientes NO se debe realizar:

Seleccione una:



a. Utilizar antisépticos y antibióticos en la higiene diaria.



b. Usar antimicrobianos profilácticos en la inserción, mantenimiento o retirada de la sonda uretral.



c. Cambiar de forma rutinaria y periódica la sonda uretral.



d. No se debe realiza ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No se debe realiza ninguna de las anteriores.

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son acciones prioritarias durante la reanimación del paciente con COVID_19 todas, EXCEPTO:

Seleccione una:

- ☐ a. Oxigenación y ventilación.
- ☐ b. Detener las compresiones si es necesario para realizar la intubación endotraqueal.
- ☐ c. Conectar al paciente a un ventilador con filtro en cuanto sea posible.
- ☒ d. Canalizar vía venosa central en cuanto sea posible.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Canalizar vía venosa central en cuanto sea posible.

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son medidas básicas de obligado cumplimiento para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, excepto:

Seleccione una:

- ☐ a. Higiene estricta de manos antes de manipular la vía aérea.
- ☒ b. Control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento (por debajo de 10 cmH₂O)
- ☐ c. Evitar, siempre que sea posible, la posición de decúbito supino a 0°.
- ☐ d. Favorecer los procedimientos que permitan disminuir de forma segura la intubación y/o su duración.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento (por debajo de 10 cmH₂O)

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta sobre la higiene bucal en el paciente intubado:

Seleccione una:



a. La higiene bucal debe realizarse utilizando clorhexidina (0,12%-0,2%)



b. Se protocoliza cada 8 horas. Higiene bucal por turno.



c. Previamente debe comprobarse que la presión del neumotaponamiento está por encima de 20 cmH₂O.



d. Todas son correctas.