



ÁREA DEL ALUMNO

MÓDULOS

BIBLIOTECA

RESULTADO DEL EXAMEN

1 **Módulo**
Temas
PDF
Módulo

¡Enhorabuena! Ha aprobado el cuestionario y también nos complace comunicarle que usted ha aprobado el curso online "SALUD BUCODENTAL. Manejo conjunto de la caries y de las enfermedades periodontales."

A partir del 11 de agosto de 2020, le haremos llegar su diploma acreditativo a través de su email de contacto.

2 **Módulo**
Temas
PDF
Módulo

1. Como actuaría ante una mancha blanca, opaca, y rugosa situada en una superficie libre de un diente:

- a) Monitorización
- b) Monitorización y aplicación de fluoruros
- c) Monitorización y restauración
- d) Restauración
- e) No habría nada

3 **Módulo**
Temas
PDF
Módulo

2. La aplicación de un sellador de fosas y fisuras, de acuerdo a los criterios ICCMs podría aplicarse:

4 **Módulo**
Temas
PDF
Módulo

- a) Sobre fosas y fisuras libres de caries en pacientes de riesgo
- b) Sobre fosas y fisuras con cavitación en el esmalte
- c) Sobre fosas y fisuras cavitadas más allá del tercio externo de la dentina

5 **Módulo**
Temas

- d) Solo 1 y 2 con ciertas

- a) Solo 1 y 2 son ciertas
- e) Son ciertas 1, 2 y 3

3. Ante un paciente adulto, sano, con lesiones de caries incipientes inactivas mantenidas estables durante 3 años, la actitud será:

- a) Indicar al paciente que está sano y no necesita revisiones
- b) Restauración con criterios de mínima intervención
- c) Revisiones cada dos años y cuidados básicos
- d) Aplicaciones profesionales de fluoruros semestralmente
- e) Aplicación de selladores de fosas y fisuras

4. Las medidas básicas ante lesiones iniciales o moderadas activas de caries comprenden:

- a) Siempre eliminación de la biopelícula y remineralización
- b) Siempre hay que realizar procedimientos restauradores
- c) Solo aplicación de selladores a base de ionómero de vidrio
- d) Solo aplicación de selladores a base de resina
- e) Nunca se realizarán procedimientos restauradores

5. El fluoruro diamínico de plata posee acción:

- a) Remineralizante
- b) Bactericida
- c) Bioinductor
- d) Tensioactivo
- e) 1 y 2 son correctas

6. La ruta metabólica de la arginina-deiminasa, metaboliza la arginina dando como resultado final

- a) Bicarbonato
- b) Lactato

- / ○
- c) ○ Ácido acético
- d) Urea
- e) ○ Agua

7. En una lesión profunda de caries, en ausencia de signos y síntomas de afectación pulpar. En el fondo de la cavidad el límite de eliminación de dentina se debe de situar en:

- a) Dentina blanda
- b) ○ Dentina firme
- c) ○ Dentina cuerosa
- d) ○ Dentina dura
- e) ○ Dentina esclerótica

8. En personas con necesidades especiales es aconsejable:

- a) ○ Que la persona aprenda a realizar sus cuidados básicos orales de forma autónoma
- b) ○ Que se le realicen revisiones periódicas frecuentes y se apliquen medidas específicas profesionales
- c) ○ Que se realicen procedimientos complementarios de control químico de la placa
- d) ○ Que se adapten los instrumentos de higiene oral básica a sus habilidades
- e) Todas las anteriores son ciertas

9. Las bebidas carbonatadas:

- a) Tienen un efecto erosivo sobre el esmalte
- b) ○ No tiene un efecto erosivo sobre la dentina
- c) ○ Su potencial cariogénico es bajo
- d) ○ Solo tienen efecto erosivo en dientes con raíces expuestas
- e) ○ Su acción deletérea depende solamente de su bajo pH

10. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista motivacional en el ámbito del

¿Cuál es el objetivo de la entrevista motivacional en el ámbito del tratamiento periodontal?

- a) Explicar al paciente la etiopatogenia de la periodontitis de forma clara y concisa
- b) Conocer los antecedentes médicos y odontológicos del paciente
- c) Establecer una relación de confianza entre profesional y paciente
- d) Lograr cambios en el comportamiento del paciente orientados a mejorar su salud oral
- e) Explicar al paciente las diferentes fases de la terapia periodontal y peri-implantaria

11. Ante un paciente que padece Diabetes mellitus, y cuyo control glicémico no es el adecuado, ¿en qué fase del tratamiento periodontal debemos ponernos en contacto con su médico para realizar una interconsulta al respecto?

- a) Tras el tratamiento no quirúrgico de raspado y alisado radicular, siempre que éste no haya sido capaz de controlar las bolsas y en la reevaluación sondajes profundos residuales
- b) En la fase de terapia con implantes, para reducir el riesgo de fracaso de la osteointegración
- c) En la fase de control sistémico, antes de llevar a cabo el desbridamiento periodontal
- d) Antes de comenzar la fase de mantenimiento periodontal y peri-implantario
- e) En la fase de tratamientos coadyuvantes, antes de prescribir el empleo de antimicrobianos sistémicos

12. ¿Cuál de las siguientes herramientas para el desbridamiento subgingival de las bolsas periodontales nos aporta la mejor sensibilidad táctil?

- a) Curetas
- b) Aeropulidores
- c) Ultrasonidos magnetostrictivos
- d) Ultrasonidos piezoeléctricos

- e) Láser de Er-YAG

13. ¿Cuál de los siguientes polvos de pulido puede emplearse a nivel subgingival?

- a) Bicarbonato
- b) Glicina
- c) Eritritol
- d) Las respuestas 1 y 2 son correctas
- e) Las respuestas 2 y 3 son correctas

14. ¿En qué consiste la profilaxis supragingival?

- a) Eliminación de factores retentivos de placa, de forma previa al raspado y alisado radicular
- b) Eliminación de placa, cálculo y tinciones a nivel supragingival
- c) Eliminación de placa, cálculo y tinciones a nivel supragingival y hasta 2-3mm subgingivales
- d) Ajuste oclusal selectivo para eliminar prematuridades e interferencias
- e) Instrucciones de higiene oral adaptadas a las necesidades y habilidades del paciente

15. ¿En qué situaciones está indicado llevar a cabo una ferulización por motivos periodontales?

- a) Cuando la movilidad dentaria sea de tal magnitud que dificulte la vida y la función del paciente
- b) Cuando el diente presente movilidad grado 3
- c) Cuando el diente se haya extruido coronalmente más allá del plano oclusal de los dientes adyacentes
- d) En todas las anteriores
- e) En ninguna de las anteriores

16. Señale la afirmación correcta entre las siguientes:

- a) Los cráteres interproximales son defectos susceptibles de ser tratados mediante tratamiento

susceptibles de ser tratados mediante tratamiento periodontal regenerativo

- b) Es interesante llevar a cabo tratamiento periodontal regenerativo en todo tipo de defecto vertical, independientemente del componente intraóseo o del número de paredes
- c) Se prefiere el uso de amelogeninas al de membranas de barrera en regeneración periodontal porque dan lugar a mayores ganancias de inserción
- d) Se pueden utilizar sustitutos óseos en combinación tanto de membranas de colágeno como con proteínas derivadas de la matriz del esmalte
- e) Se prefiere el uso de membranas de barrera al de proteínas derivadas de la matriz del esmalte en regeneración periodontal porque dan lugar a mayores ganancias de inserción

17. Señale la afirmación correcta al respecto de la regeneración periodontal:

- a) El diseño del colgajo no tiene ninguna relevancia en estos procedimientos
- b) El hecho de que los dientes presenten movilidad no tiene ninguna relevancia en estos procedimientos
- c) La morfología del defecto no influye en los biomateriales a emplear en cada caso
- d) Es crítico el control de placa del paciente tanto de manera pre-operatoria como en el post-operatorio
- e) Todas las afirmaciones son falsas

18. Respecto a la indicación de cuando llevar a cabo un injerto para aumentar la encía insertada:

- a) Es necesario contar al menos con 2 mm de encía insertada, en caso contrario habrá que realizar un injerto de tejido conectivo
- b) La indicación de hacer un injerto o no estará determinada por la capacidad del paciente de mantener la zona libre de inflamación

c) Los requisitos de esteticismo pueden ocasionar el

- c) Los movimientos de ortodoncia pueden ocasionar el desarrollo de recesiones gingivales localizadas
- d) Es interesante contar con un adecuado grosor de los tejidos blandos cuando se plantea llevar a cabo restauraciones con márgenes subgingivales
- e) 2, 3 y 4 son ciertas

19. Respecto a los procedimientos de cobertura radicular en recesiones gingivales localizadas:

- a) Es importante controlar los factores que han condicionado el desarrollo de las mismas para que no se produzca una recidiva tras el tratamiento
- b) Las principales indicaciones son la estética, la hipersensibilidad dentinaria, o la presencia de recesiones "progresivas"
- c) Uno de los factores desencadenantes de recesiones más relevantes es el cepillado traumático
- d) La probabilidad de obtener un cubrimiento radicular completo depende fundamentalmente de los niveles de inserción interproximal
- e) Todas las afirmaciones son ciertas

20. Señale la afirmación correcta respecto de la Terapia Periodontal de Mantenimiento (TPM):

- a) Es parte integral y obligada del tratamiento periodontal si se quieren mantener los resultados del mismo
- b) Consisten en hacer una profilaxis a intervalos regulares
- c) Debe de realizarse cada 3 meses en todos los pacientes con periodontitis ya tratados
- d) Lo más importante para determinar el intervalo de las visitas es el índice de placa del paciente
- e) En todo caso, no es capaz de mantener los niveles de inserción a largo plazo

Este curso no tendrá validez para quien no cumpla los requisitos solicitados.

www.colgateprofesional.es

www.colgate.es

[Legal/ Confidencialidad](#)