

Recibidos (353) - rocio.g... SEPAR Contenidos - SEP... Principios generales del... Plataforma Formación Co... Curso: EL TÉCNICOS EN... Contribuciones | VII Con...

No es seguro | separcontenidos.es/docencia/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&id_session=0&gidReq=0&action=vie...

Página de inicio del curso

00:13:35

1. ¿Cuál de los siguientes parámetros analíticos no es frecuente encontrar en el inicio del diagnóstico de infección por SARS-CoV-2?

- ☐ Linfopenia.
- ☒ Aumento de PCT (procalcitonina).
- ☐ Incremento de la ferritina.
- ☐ Incremento del Dímero D.
- ☐ Incremento IL6.

Siguiente pregunta

3.10 Pruebas microbiológicas ✓
3.11 Pruebas microbiológicas ✓
3.11 Pruebas microbiológicas ✓
3.12 Pruebas microbiológicas ✓
3.12 Pruebas microbiológicas ✓
4. Pruebas radiológicas ✓
4.1 Pruebas radiológicas ✓
4.2 Pruebas radiológicas ✓
4.2 Pruebas radiológicas ✓
4.3 Pruebas radiológicas ✓
5. Bibliografía ✓

Test Módulo 5: Protocolo diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2

MODULO1.pdf Opioides_Esteve.pdf

Mostrar todo

18:53 27/07/2020

Recibidos (353) - rocio.g... SEPAR Contenidos - SEP... Principios generales del... Plataforma Formación Co... Curso: EL TÉCNICOS EN... Contribuciones | VII Con...

No es seguro | separcontenidos.es/docencia/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&id_session=0&gidReq=0&action=vie...

Página de inicio del curso

00:13:07

2. De las siguientes afirmaciones sobre las pruebas microbiológicas, señale la que no es correcta.

- ☐ La PCR-RT es la prueba microbiológica con mayor sensibilidad y especificidad.
- ☐ La prueba rápida antigénica no es útil en los pacientes asintomáticos.
- ☐ La PCR-RT negativa, dentro de un contexto clínico apropiado, no excluye la infección.
- ☒ La prueba rápida sanguínea de detección de anticuerpos es más útil en los siete primeros días de la infección.
- ☐ La prueba rápida sanguínea de detección de anticuerpos es útil desde el punto de vista epidemiológico porque permite conocer el grado de inmunidad de la población.

Pregunta anterior **Siguiente pregunta**

3.10 Pruebas microbiológicas ✓
3.11 Pruebas microbiológicas ✓
3.11 Pruebas microbiológicas ✓
3.12 Pruebas microbiológicas ✓
3.12 Pruebas microbiológicas ✓
4. Pruebas radiológicas ✓
4.1 Pruebas radiológicas ✓
4.2 Pruebas radiológicas ✓
4.2 Pruebas radiológicas ✓
4.3 Pruebas radiológicas ✓
5. Bibliografía ✓

Test Módulo 5: Protocolo diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2

MODULO1.pdf Opioides_Esteve.pdf

Mostrar todo

18:53 27/07/2020

Recibidos (353) - rocio.g... SEPAR Contenidos - SEP... Principios generales del... Plataforma Formación Co... Curso: EL TÉCNICOS EN... Contribuciones | VII Con...

No es seguro separcontenidos.es/docencia/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&id_session=0&gidReq=0&action=vie...

Página de inicio del curso

00:12:00

3. ¿Cuál de los signos radiológicos es menos frecuente en la neumonía por SARS-CoV-2?

- ☐ Patrón intersticial bilateral.
- ☐ Áreas en vidrio deslustrado subpleural.
- ☒ Condensación alveolar lobar con derrame.
- ☐ Consolidaciones alveolares bilaterales.
- ☐ Engrosamiento septal y bronquial.

Pregunta anterior **Siguiente pregunta**

MODULO1.pdf Opioides_Esteve.pdf

Mostrar todo

18:54 27/07/2020

Recibidos (353) - rocio.g... SEPAR Contenidos - SEP... Principios generales del... Plataforma Formación Co... Curso: EL TÉCNICOS EN... Contribuciones | VII Con...

No es seguro separcontenidos.es/docencia/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&id_session=0&gidReq=0&action=vie...

Página de inicio del curso

00:11:31

4. Señale la respuesta incorrecta en relación al equipo de protección individual que debe llevar para realizar un hisopado nasofaríngeo.

- ☐ Mascarilla FFP3 o FFP2.
- ☐ Bata impermeable.
- ☒ Dos mascarillas quirúrgicas.
- ☐ Gafas de montura integral estancas.
- ☐ Guantes de nitrilo.

Pregunta anterior **Siguiente pregunta**

MODULO1.pdf Opioides_Esteve.pdf

Mostrar todo

18:55 27/07/2020

Recibidos (353) - rocio.g... SEPAR Contenidos - SEP... Principios generales del... Plataforma Formación Co... Curso: EL TÉCNICOS EN... Contribuciones | VII Con...

No es seguro separcontenidos.es/docencia/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&id_session=0&gidReq=0&action=vie...

Página de inicio del curso

00:10:42

5. Una de las siguientes afirmaciones en relación a la técnica de hisopado nasofaríngeo es correcta. Señale cuál.

- ☐ El material del hisopo puede ser de alginato de calcio, dacrón, nailon o poliéster.
- ☐ El palillo puede ser de madera, ya que no necesitamos que sea flexible para llegar a la nasofaringe.
- ☐ No es necesario hacer ningún movimiento cuando notemos tope, el extremo del hisopo recoge exudado por capilaridad.
- ☒ Al depositar el hisopo en el contenedor, es necesario remover para disgregar el exudado.
- ☐ Si no llegamos a la nasofaringe, la carga viral en fosa nasal es suficiente para hacer un diagnóstico por PCR.

Pregunta anterior Terminar ejercicio

MODULO1.pdf Opioides_Esteve.pdf

18:55 27/07/2020

Recibidos (353) - rocio.g... SEPAR Contenidos - SEP... Principios generales del... Plataforma Formación Co... Curso: EL TÉCNICOS EN... Contribuciones | VII Con...

No es seguro separcontenidos.es/docencia/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&action=view&lp_id=78&lp_item_id=28...

Test Módulo 5: Protocolo diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2

Intentos 1 / 3

Iniciar la prueba

Intento	Fecha de inicio	Puntuación
1	27 de Julio 2020 a las 06:51 PM	80% (4 / 5)

MODULO1.pdf Opioides_Esteve.pdf

18:56 27/07/2020