

https://www.aulaencol... Aspectos clínicos del cán... Recibidos (352) - rociog... Curso: Aspectos clínicos... Manejo de la infección p... SEPAR Contenidos - SEP... No es seguro separcontenidos.es/docencia/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&id_session=0&gidReq=0&action=vie...

Página de inicio del curso

00:12:54

94%

4.1 CASO 1: evolución y tratamiento en planta ✓
4.2 CASO 1: evolución y tratamiento en planta ✓
Neumonía por SARS-CoV-2 en paciente con enfermedad cardíaca ✓
5. CASO CLÍNICO 2: antecedentes personales ✓
6. CASO CLÍNICO 2: enfermedad actual ✓
7.1 CASO CLÍNICO 2: pruebas ✓
7.2 CASO CLÍNICO 2: pruebas ✓
8.1 CASO CLÍNICO 2: evolución y tratamiento en planta ✓
8.1 CASO CLÍNICO 2: evolución y tratamiento en planta ✓
9. Bibliografía más relevante ✓
Test Módulo 11: Casos clínicos pacientes en hospitalización en planta convencional

1. En relación al CASO CLÍNICO 1: ¿Cuáles serían sus recomendaciones respecto al siguiente paso a seguir con esta paciente?

- ☐ Solicito Rx de tórax antes de tomar una decisión terapéutica (previo consentimiento de la paciente), con respecto a tratamiento antiviral.
- ☐ No sería necesaria la realización de Rx de tórax. Ingreso a la paciente en planta de hospitalización en aislamiento en observación, sin oxigenoterapia ni tratamiento médico, ya que está estable.
- ☐ Ingreso a la paciente en planta de hospitalización en aislamiento, con O₂ suplementario en gafas nasales para mantener saturación O₂ entre 93-95%. Reevaluaré en 24 horas la necesidad de Rx de tórax.
- ☐ Inicio tratamiento antibiótico con ceftriaxona y azitromicina, a pesar de no tener Rx de tórax.
- ☒ Las respuestas 1 y 4 son correctas.

Siguiente pregunta

oxigenotrepia_INF...pdf

Mostrar todo

8:45 29/07/2020

https://www.aulaencol... Aspectos clínicos del cán... Recibidos (352) - rociog... Curso: Aspectos clínicos... Manejo de la infección p... SEPAR Contenidos - SEP... No es seguro separcontenidos.es/docencia/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&id_session=0&gidReq=0&action=vie...

Página de inicio del curso

00:11:59

94%

4.1 CASO 1: evolución y tratamiento en planta ✓
4.2 CASO 1: evolución y tratamiento en planta ✓
Neumonía por SARS-CoV-2 en paciente con enfermedad cardíaca ✓
5. CASO CLÍNICO 2: antecedentes personales ✓
6. CASO CLÍNICO 2: enfermedad actual ✓
7.1 CASO CLÍNICO 2: pruebas ✓
7.2 CASO CLÍNICO 2: pruebas ✓
8.1 CASO CLÍNICO 2: evolución y tratamiento en planta ✓
8.1 CASO CLÍNICO 2: evolución y tratamiento en planta ✓
9. Bibliografía más relevante ✓
Test Módulo 11: Casos clínicos pacientes en hospitalización en planta convencional

2. En relación al CASO CLÍNICO 1, ¿Cuáles serían sus recomendaciones respecto al tratamiento?

- ☐ Sigo con el tratamiento iniciado en Urgencias (ceftriaxona y azitromicina), además de oxigenoterapia. No están recomendados antivirales en el embarazo por toxicidad fetal.
- ☐ Valoro de forma conjunta con Ginecología, Cuidados Intensivos y Neumología, la posibilidad de adelantar el parto para poder iniciar un tratamiento farmacológico lo más adecuado posible.
- ☒ Inicio tratamiento con ritonavir/lopinavir, puesto que es seguro en gestantes, dado que la paciente presenta neumonía y empeoramiento clínico asociado.
- ☐ Las respuestas 2 y 3 son correctas.
- ☐ Todas las respuestas son correctas.

Pregunta anterior **Siguiente pregunta**

oxigenotrepia_INF...pdf

Mostrar todo

8:46 29/07/2020

https://www.aulaencol... Aspectos clínicos del cán... Recibidos (352) - rocio.g... Curso: Aspectos clínicos... Manejo de la infección p... SEPAR Contenidos - SEP... No es seguro separcontenidos.es/docencia/main/newscom/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&id_session=0&gidReq=0&action=vie...

Página de inicio del curso

00:10:51

3. En relación al CASO CLÍNICO 2: Cuáles serían sus recomendaciones respecto al tratamiento a iniciar en este paciente?

- ☐ Inicio tratamiento empírico con monoterapia basada en lopinavir/ritonavir.
- ☐ Inicio tratamiento empírico basado en la combinación de azitromicina con hidroxiquina.
- ☒ Inicio tratamiento empírico basado en la combinación lopinavir/ritonavir con hidroxiquina.
- ☐ Añadido ceftriaxona al tratamiento para cubrir una posible sobreinfección bacteriana.
- ☐ Todas las opciones son correctas.

Pregunta anterior **Siguiente pregunta**

oxigenoterapia_INF...pdf

Mostrar todo

8:47 29/07/2020

https://www.aulaencol... Aspectos clínicos del cán... Recibidos (352) - rocio.g... Curso: Aspectos clínicos... Manejo de la infección p... SEPAR Contenidos - SEP... No es seguro separcontenidos.es/docencia/main/newscom/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&id_session=0&gidReq=0&action=vie...

Página de inicio del curso

00:10:17

4. En relación al CASO CLÍNICO 2 ¿Qué sería indicado hacer en este caso?

- ☐ Mantengo tratamiento con misma pauta.
- ☐ Dejo a la paciente en monoterapia con lopinavir/ritonavir o con hidroxiquina y realizo interconsulta a Cardiología.
- ☒ Al encontrarse estable con QTc inferior a 500 mseg, mantengo el mismo tratamiento, se realiza interconsulta a Cardiología con seguimiento con ECG cada 24 horas.
- ☐ Suspendo pauta completa de tratamiento actual incluido betabloqueante. Repito ECG a las 24 horas y valoro iniciar otra pauta diferente según guías de mi centro.
- ☐ La respuestas 3 y 4 son correctas

Pregunta anterior **Siguiente pregunta**

oxigenoterapia_INF...pdf

Mostrar todo

8:48 29/07/2020

https://www.aulaencol... Aspectos clínicos del cán... Recibidos (352) - rociog... Curso: Aspectos clínicos... Manejo de la infección p... SEPAR Contenidos - SEP... No es seguro separcontenidos.es/docencia/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&id_session=0&gidReq=0&action=vie...

Página de inicio del curso

00:09:27

5. En relación al CASO CLÍNICO 2: Con respecto al alta, ¿cuál le parece la opción más acertada?

- ☐ Siempre que persista infiltrado radiológico habrá que mantener a la paciente ingresada, a pesar de PCR negativa.
- ☐ A pesar de mantener infiltrado radiológico, con estabilidad clínica y PCR negativa, valoro alta domiciliar según protocolo de mi centro, sin atención médica de control.
- ☒ Al mantener infiltrado radiológico, a pesar de estabilidad clínica y PCR negativa, valoro alta con seguimiento por hospitalización a domicilio, si dispongo de esta posibilidad, o, en su defecto, control por Atención Primaria.
- ☐ Las respuestas 2 y 3 son correctas.
- ☐ Todas las respuestas son correctas.

Pregunta anterior Terminar ejercicio

oxygenotrofia_INF...pdf

Mostrar todo

8:49 29/07/2020

https://www.aulaencol... Aspectos clínicos del cán... Recibidos (352) - rociog... Curso: Aspectos clínicos... Manejo de la infección p... SEPAR Contenidos - SEP... No es seguro separcontenidos.es/docencia/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&action=view&lp_id=13&lp_item_id=3... Mostrar todo

Página de inicio del curso

100%

Test Módulo 11: Casos clínicos pacientes en hospitalización en planta convencional

Intentos 1 / 3

Iniciar la prueba

Intento	Fecha de inicio	Puntuación
1	29 de Julio 2020 a las 08:43 AM	60% (3 / 5)

oxygenotrofia_INF...pdf

Mostrar todo

8:49 29/07/2020