

Comenzado el	martes, 10 de noviembre de 2020, 01:02
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 10 de noviembre de 2020, 01:40
Tiempo empleado	38 minutos 17 segundos
Puntos	18,00/20,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto a las lesiones pre-malignas del área de cabeza y cuello

Seleccione una:

- ☒ a. Las de la orofaringe asociadas al VPH son totalmente desconocidas
- ☐ b. Se conocen las lesiones pre-neoplásicas de la orofaringe asociadas al VPH
- ☐ c. Se desconocen las lesiones pre-malignas de la cavidad oral
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Alguna de las **lagunas** de conocimiento en la historia natural de la infección oral por VPH y sus lesiones asociadas es

Seleccione una:

- ☐ a. Establecer la relación causal entre el VPH y algunos carcinomas de cabeza y cuello
- ☒ b. Entender cómo y en qué países está aumentando la enfermedad de cabeza y cuello asociada al VPH
- ☐ c. Tener una idea de la prevalencia de gente sana con una infección oral por VPH
- ☐ d. No existen lagunas de conocimiento

Respuesta correcta

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Hay un porcentaje de pacientes de COF asociado al VPH que tienen mal pronóstico

Seleccione una:

- ☐ a. Falso, todos tienen buen pronóstico
- ☐ b. Verdadero, alrededor de un 27% y están muy bien caracterizados
- ☐ c. Verdadero, alrededor de un 40% y aún no están bien caracterizados
- ☒ d. Verdadero, alrededor de un 27% y aún no están bien caracterizados

Respuesta correcta

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los COFs causados por el VPH

Seleccione una:

- ☒ a. Tienen mejor supervivencia global y libre de enfermedad que los causados por el tabaco y el alcohol.
- ☐ b. Tienen peor supervivencia global que los causados por el tabaco y el alcohol.
- ☐ c. Tienen peor supervivencia libre de enfermedad que los causados por el tabaco y el alcohol.
- ☐ d. Tienen supervivencia libre de enfermedad similar a los causados por tabaco y alcohol.

Respuesta correcta

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Los factores que se asocian a la infección oral por VPH son

Seleccione una:

- ☐ a. Tabaco
- ☐ b. Edad
- ☒ c. Comportamiento sexual
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué posición ocupa el cáncer cabeza y cuello en cuanto a incidencia de nuevos casos de cáncer a nivel mundial?

Seleccione una:

- ☐ a. La segunda
- ☐ b. La cuarta
- ☐ c. La décima
- ☒ d. La sexta

Respuesta correcta

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Que se debe tener en cuenta para plantear un programa de detección precoz de un cáncer

Seleccione una:

- ☐ a. La incidencia de la enfermedad.
- ☐ b. Disponer de biomarcadores con sensibilidad y especificidad adecuada
- ☐ c. Que el programa reduzca la mortalidad y/o morbilidad
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas

Respuesta correcta

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de las afirmaciones es correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Se recomienda la detección de anticuerpos L1 o E6 frente al VPH16 para la detección precoz de carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH
- ☐ b. Se recomienda la detección de anticuerpos E6 frente al VPH16 para la monitorización de pacientes diagnosticados de carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH
- ☐ c. Se está utilizando la detección de VPH-ADN en enjuague-gárgaras orales para la detección precoz del carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH
- ☒ d. No existe en la actualidad ningún biomarcador viral (VPH) para el que se recomiende su uso como prevención secundaria y/o terciaria del carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH

Respuesta correcta

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se puede alguien contagiar por VPH a nivel oral?

Seleccione una:

- ☐ a. Practicando sexo oral
- ☐ b. Besando en la mejilla o compartiendo bebidas con una persona infectada
- ☒ c. Practicando sexo oral y también es posible que el virus pueda llegar a la boca por otras vías como un beso profundo
- ☐ d. Compartiendo jeringuillas

Respuesta correcta

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los COFs asociados al VPH o al consumo de tabaco y alcohol...

Seleccione una:

- ☐ a. Representan tumores distintos a nivel clínico y molecular pero no epidemiológico
- ☐ b. Son tumores que se comportan de manera equivalente
- ☒ c. Representan tumores distintos a nivel epidemiológico, clínico y molecular
- ☐ d. Representan tumores distintos a nivel epidemiológico pero no clínico y molecular

Respuesta correcta

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿La PRR está causada por?

Seleccione una:

- ☒ a. Por infección por VPHs 6 o 11
- ☐ b. Por infección por VPH, tabaco o alcohol
- ☐ c. Por infección por VPH de tipo de alto riesgo oncogénico como el VPH16 o 18
- ☐ d. Por exposición a tabaco y alcohol

Respuesta correcta

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos casos nuevos de carcinoma de cabeza y cuello debidos al VPH se estima que cada año se producen en el mundo?

Seleccione una:

- ☐ a. Cerca de 5000
- ☐ b. Cerca de 500000
- ☐ c. Cerca de 20000
- ☒ d. Cerca de 50000

Respuesta correcta

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los cánceres de cabeza y cuello, los que están más fuertemente asociados al VPH son los de:

Seleccione una:

- ☒ a. Orofaringe, con fracciones atribuibles estimadas a nivel global alrededor del 30%
- ☐ b. Las respuestas A y B son correctas
- ☐ c. Orofaringe, con fracciones atribuibles estimadas a nivel global alrededor del 80%
- ☐ d. Cavidad oral

Respuesta correcta

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El tipo de VPH que se haya con mayor frecuencia en la infección oral por VPH es

Seleccione una:

- ☐ a. VPH 6
- ☐ b. VPHs 6 o 11
- ☒ c. VPH16
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las principales lesiones potencialmente malignas de la mucosa oral macroscópicamente reconocibles?

Seleccione una:

- ☒ a. Las leucoplaquias orales y los liquen planos orales
- ☐ b. Las leucoplaquias orales
- ☐ c. Los liquen planos orales
- ☐ d. Las displasias orales epiteliales

Respuesta correcta

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuales son biomarcadores virales en estudio para la prevención secundaria y terciaria del carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH

Seleccione una:

- ☐ a. Sólo detección de VPH-ADN en sangre
- ☐ b. Detección de VPH-ADN en enjuagues-gárgaras orales, y detección de anticuerpos E6 anti-VPH16 en sangre
- ☒ c. Sólo detección de anticuerpos E6 anti-VPH16 en sangre
- ☐ d. Sólo detección de VPH-ADN en enjuagues-gárgaras orales

Respuesta incorrecta.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Se puede saber con certeza el momento exacto de la infección inicial por VPH oral?

Seleccione una:

- ☐ a. Sí, unos dos años antes del desarrollo del cáncer de orofaringe causado por el VPH
- ☐ b. Sí, unos diez años antes del desarrollo del cáncer de orofaringe causado por el VPH
- ☐ c. En algunos casos sí, en otros no
- ☒ d. No

Respuesta correcta

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los COFs asociados al VPH son más frecuentes en países

Seleccione una:

- ☐ a. Del Sur de Europa como España
- ☒ b. Del Norte de Europa y Estados Unidos
- ☐ c. Las respuestas A y B son correctas
- ☐ d. De renta baja

Respuesta correcta

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La evidencia de la eficacia y efectividad de la vacuna contra el VPH para prevenir la infección oral por VPH

Seleccione una:

- ☐ a. Es limitada, con solo un estudio publicado que mostró una eficacia del 93,3%
- ☒ b. Es limitada, con un estudio publicado que mostró una eficacia del 93,3% y otros tres estudios evaluando efectividad que mostraron una reducción de la infección oral en los individuos vacunados versus no vacunados
- ☐ c. Es robusta, con un estudio publicado que mostró una eficacia del 93,3% y otros tres estudios evaluando efectividad que mostraron una reducción de la infección oral en los individuos vacunados versus no vacunados
- ☐ d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Respuesta correcta

¿Qué porcentaje de la población general está infectada por VPH a nivel oral y qué porcentaje aclara/elimina la infección?

Seleccione una:

- ☐ a. Alrededor de un 5% de la población adulta tiene una infección oral por VPH. Aproximadamente la mitad de las infecciones por VPH orales se eliminan en uno o dos años sin presentar síntomas ni lesiones
- ☒ b. Alrededor de un 5% de la población adulta tiene una infección oral por VPH. La gran mayoría de infecciones por VPH orales se eliminan en uno o dos años sin presentar síntomas ni lesiones
- ☐ c. Alrededor de un 10% de la población adulta tiene una infección oral por VPH. Aproximadamente la mitad de las infecciones por VPH orales se eliminan en uno o dos años sin presentar síntomas ni lesiones
- ☐ d. Alrededor de un 10% de la población adulta tiene una infección oral por VPH. La gran mayoría de infecciones por VPH orales se eliminan en uno o dos años sin presentar síntomas ni lesiones

Respuesta correcta