

CURSO PRINCIPIOS BASICOS EN EL MANEJO DEL PACIENTE COVID19 IAVANTE

CUESTIONARIO 2.1

Puntos 5,00/5,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Ante cuál de los siguientes microorganismos pueden realizarse solamente las precauciones estándar?

Seleccione una:

a. P. aeruginosa multirresistente carbapenemasa.

b. Staphylococcus aureus resistente a meticilina.

c. Klebsiella pneumoniae BLEE.

d. Staphylococcus aureus meticilina sensible. Correcta

Retroalimentación

Respuesta correcta. El resto de microorganismos mencionados requieren de precauciones ampliadas para evitar la transmisión de contacto.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes medidas no entran dentro de las medidas estándar?

Seleccione una:

a. Higiene de manos al realizar una tarea limpia o aséptica.

b. Bata adicional al uniforme para proteger la piel y prevenir el manchado.

c. Uso de guantes para dar de comer al residente. Correcta

d. Todas las anteriores entran dentro de medidas estándar.

Retroalimentación

Respuesta correcta. No es necesario el uso de guantes para tareas como dar de comer al residente. El resto son precauciones estándar para evitar la transmisión de microorganismos.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es necesario que el centro disponga de un protocolo para la higiene del residente?

Seleccione una:

a. Si, debe existir un protocolo escrito, conocido.

b. No, cada empleado puede hacerlo de la forma que desee.

c. Depende de si el residente está colonizado o no por un microorganismo multirresistente.

d. Si, debe existir un protocolo escrito, conocido y efectivo.

Correcta

Retroalimentación

Respuesta correcta. Debe existir un protocolo escrito, conocido y efectivo de higiene para los residentes en el centro.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las precauciones estándar se aplican en todos los supuestos, excepto en uno:

Seleccione una:

a. Membranas mucosas.

b. Sangre y cualquier fluido contaminado con sangre.

c. Piel no intacta.

d. Sudor corporal. Correcta

Retroalimentación

Respuesta correcta. Se aplican en presencia de fluidos corporales, secreciones y excreciones, excepto el sudor, independientemente de si contienen o no sangre visible.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes momentos no forma parte de los 5 momentos de higiene de manos que recomienda la OMS?

Seleccione una:

a. Después del riesgo de exposición a fluidos corporales.

b. Después del contacto con el entorno del residente.

c. Antes del contacto con el residente.

d. Antes del contacto con el entorno del residente. Correcta

Retroalimentación

Respuesta correcta. El momento antes del contacto con el entorno del residente, no pertenece a los 5.

Finalizar revisión

Salta Navegación por el cuestionario

Navegación por el cuestionario

Pregunta1Esta páginaPregunta2Esta páginaPregunta3Esta páginaPregunta4Esta páginaPregunta5Esta página

Finalizar revisión

Feedback de la Actividad 2.1. Caso práctico

Comenzado elsábado, 14 de noviembre de 2020, 12:48

Estado Finalizado

Puntos5,00/5,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sólo una de las siguientes afirmaciones es correcta, señálela:

Seleccione una:

a. La Higiene de Manos (HM) con preparados de base alcohólica no requiere que las manos estén limpias.

b. La presencia de materia orgánica disminuye la eficacia de los preparados de base alcohólica. Correcta

c. La mejor opción para la higiene de manos es siempre el agua y jabón.

d. La mejor opción para la higiene de manos es siempre la fricción con preparados de base alcohólica.

Retroalimentación

Respuesta correcta. El uso de alcoholes no es apropiado cuando las manos están visiblemente sucias o contaminadas con materiales proteicos ya que la eficacia del alcohol es inhibida por la presencia de materia orgánica.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique en cuál de las siguientes actividades existe riesgo de exposición a fluidos o secreciones corporales y por lo tanto estaría indicado hacer higiene de manos después del procedimiento:

Seleccione una:

a. Retirar un tubo endotraqueal.

b. Realizar una higiene bucal.

c. Abrir o manipular un sistema de drenaje.

d. Son correctas todas las respuestas anteriores. Correcta

Retroalimentación

Respuesta correcta. Son correctas todas las respuestas anteriores. Realizar higiene de manos después del riesgo de exposición a líquidos corporales es uno de los “5 momentos” siguiendo las recomendaciones de la OMS.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Debe hacerse higiene de manos después del contacto con el entorno del paciente, cuando:

Seleccione una:

- a. Se regula o ajusta el ritmo de la perfusión venosa.
- b. Se manipula el monitor del residente para desconectar una alarma.
- c. Se recoloca la barandilla de la cama o la inclinación del respaldo.

d. En todas y cada una de las situaciones anteriores está indicada la higiene de manos antes de salir de la zona del residente. Correcta

Retroalimentación

Respuesta correcta. En todas las situaciones anteriores se consideraría indicada la higiene de manos, ya que todos esos objetos forman parte del entorno del residente y pueden estar contaminados por microorganismos patógenos.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique en cuál de las siguientes situaciones el uso de guantes no es necesario:

Seleccione una:

a. Para comprobar el flujo urinario.

b. Para tomar la tensión a un residente. Correcta

c. Para realizar una exploración oral.

d. Para realizar una extracción de sangre.

Retroalimentación

Respuesta correcta. Para tomar la tensión a un residente. No existe riesgo de exposición a sangre o a fluidos corporales, o a un entorno contaminado.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El objetivo de la realización de higiene de manos antes del contacto con el residente es:

Seleccione una:

a. Mejorar la capa lipídica de las manos, para una mejor atención al residente.

b. Evitar la transmisión al paciente de los microorganismos que residen y colonizan las manos.

Correcta

c. La higiene de manos no evita la transmisión de microorganismos.

d. Evitar la transmisión de microorganismos desde el residente hacia el personal que lo atiende.

Retroalimentación

Respuesta correcta. Antes del contacto con el residentes es importante realizar higiene de manos, para evitar la transmisión de los micoorganismos que llevamos en las manos, ya sean residentes o transitorios.

Finalizar revisión

Feedback de la Actividad 3.2. Caso práctico

La higiene de manos es una medida que se debe incorporar para evitar la transmisión de gérmenes y es el núcleo de las precauciones estándar.

Los profesionales que van a visitar al residente deben tener en cuenta los “5 momentos para la higiene de manos”. En el caso del médico, si no va a realizar ninguna tarea limpia/ aséptica ni tiene contacto con fluidos corporales, deberá realizar la higiene de manos antes y después del contacto con el residente. En caso de tocar objetos del entorno del residente (sábana, cama, sillón) realizará también higiene de manos al salir del entorno del residente (habitación o zona común).

En el caso del personal auxiliar encargado de la higiene del residente realizará higiene de manos antes de ponerse los guantes (la utilización de guantes no exime de realizar higiene de manos) y al finalizar la tarea se quitará los guantes y volverá a realizar higiene de manos.

El profesional encargado de suministrar la medicación oral realizará higiene de manos antes y después de entrar en contacto con el entorno del paciente.

En cuanto a los familiares, se les explicaría la importancia de la higiene manos y cuáles son los momentos en los que se debería realizar. Básicamente al entrar en la habitación o zona común donde se encuentre el residente, y al abandonar el entorno del mismo.

Comenzado el sábado, 14 de noviembre de 2020, 16:24

Estado Finalizado

Finalizado en sábado, 14 de noviembre de 2020, 16:27

Comenzado el domingo, 29 de noviembre de 2020, 13:39

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 29 de noviembre de 2020, 13:40

Tiempo empleado 48 segundos

Puntos 5,00/5,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

CUESTIONARIO 3.1

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sólo una de las siguientes afirmaciones es correcta, señálela:

Seleccione una:

- a. La mejor opción para la higiene de manos es siempre el agua y jabón.
- b. La Higiene de Manos (HM) con preparados de base alcohólica no requiere que las manos estén limpias.
- c. La mejor opción para la higiene de manos es siempre la fricción con preparados de base alcohólica.

d. La presencia de materia orgánica disminuye la eficacia de los preparados de base alcohólica. Correcta

Retroalimentación

Respuesta correcta. El uso de alcoholes no es apropiado cuando las manos están visiblemente sucias o contaminadas con materiales proteicos ya que la eficacia del alcohol es inhibida por la presencia de materia orgánica.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique en cuál de las siguientes actividades existe riesgo de exposición a fluidos o secreciones corporales y por lo tanto estaría indicado hacer higiene de manos después del procedimiento:

Seleccione una:

- a. Retirar un tubo endotraqueal.
- b. Realizar una higiene bucal.

c. Abrir o manipular un sistema de drenaje.

d. Son correctas todas las respuestas anteriores.

Correcta

Retroalimentación

Respuesta correcta. Son correctas todas las respuestas anteriores. Realizar higiene de manos después del riesgo de exposición a líquidos corporales es uno de los “5 momentos” siguiendo las recomendaciones de la OMS.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Debe hacerse higiene de manos después del contacto con el entorno del paciente, cuando:

Seleccione una:

- a. Se regula o ajusta el ritmo de la perfusión venosa.
- b. Se manipula el monitor del residente para desconectar una alarma.
- c. Se recoloca la barandilla de la cama o la inclinación del respaldo.

d. En todas y cada una de las situaciones anteriores está indicada la higiene de manos antes de salir de la zona del residente. Correcta

Retroalimentación

Respuesta correcta. En todas las situaciones anteriores se consideraría indicada la higiene de manos, ya que todos esos objetos forman parte del entorno del residente y pueden estar contaminados por microorganismos patógenos.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique en cuál de las siguientes situaciones el uso de guantes no es necesario:

Seleccione una:

- a. Para realizar una extracción de sangre.
- b. Para comprobar el flujo urinario.

c. Para tomar la tensión a un residente. Correcta

- d. Para realizar una exploración oral.

Retroalimentación

Respuesta correcta. Para tomar la tensión a un residente. No existe riesgo de exposición a sangre o a fluidos corporales, o a un entorno contaminado.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El objetivo de la realización de higiene de manos antes del contacto con el residente es:

Seleccione una:

- a. Evitar la transmisión de microorganismos desde el residente hacia el personal que lo atiende.

b. Evitar la transmisión al paciente de los microorganismos que residen y colonizan las manos. Correcta

- c. La higiene de manos no evita la transmisión de microorganismos.
- d. Mejorar la capa lipídica de las manos, para una mejor atención al residente.

Retroalimentación

Respuesta correcta. Antes del contacto con el residentes es importante realizar higiene de manos, para evitar la transmisión de los micoorganismos que llevamos en las manos, ya sean residentes o transitorios.

Finalizar revisión

Salta Navegación por el cuestionario

Navegación por el cuestionario

[Pregunta1Esta página](#)[Pregunta2Esta página](#)[Pregunta3Esta página](#)[Pregunta4Esta página](#)[Pregunta5Esta página](#)

[Finalizar revisión](#)

CUESTIONARIO 5.1

Comenzado el domingo, 29 de noviembre de 2020, 12:25

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 29 de noviembre de 2020, 12:39

Tiempo empleado 13 minutos 24 segundos

Puntos 8,00/8,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Elige la respuesta correcta, sobre el uso de (hipoclorito sódico) lejía doméstica para limpieza de superficies.

Seleccione una:

a. Solución de hipoclorito sódico (lejía) que contenga 1500 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). Por tanto, 40 ml de lejía por cada litro de agua.

b. Solución de hipoclorito sódico (lejía) que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). Por tanto, 10 ml de lejía por cada litro de agua.

c. Solución de hipoclorito sódico (lejía) que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). Por tanto, 20 ml de lejía por cada litro de agua. Correcta

d. Solución de hipoclorito sódico (lejía) que contenga 2000 ppm de cloro activo (dilución 1:20 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). Por tanto, 60 ml de lejía por cada litro de agua.

Retroalimentación

Respuesta correcta: Solución de hipoclorito sódico (lejía) que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). Por tanto, 20 ml de lejía por cada litro de agua.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los residentes de centros sociosanitarios se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 por varios motivos ¿cuál de ellos es falso?

Seleccione una:

a. Suelen presentar edad avanzada.

b. Tienen contacto estrecho con otras personas (sus cuidadores) y otros convivientes.

c. Suelen pasar poco tiempo en entornos cerrados y son población no vulnerable. Correcta

d. Habitualmente presentan patología de base o comorbilidades.

Retroalimentación

Respuesta correcta: Los residentes suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y son población vulnerable.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al uso de los guantes en las precauciones estándar:

Seleccione una:

a. El uso incorrecto favorece la transmisión. Correcta

b. Sustituyen a la higiene de manos.

c. Son necesarios para cualquier tarea o cuidado que se realice en el centro.

d. Pueden reutilizarse con varios residentes si se realiza una tarea limpia.

Retroalimentación

Respuesta correcta: El uso incorrecto de los guantes puede generar una sensación de falsa protección y poner en mayor riesgo a quien los lleva, contribuyendo a la transmisión de microorganismos

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las precauciones estándar, ante un residente con síntomas respiratorios:

Seleccione una:

a. Colocarle mascarilla quirúrgica cuando vaya a ser atendido por el personal.

b. Realizar seguimiento de síntomas de manera frecuentes.

c. Avisar al responsable si presenta síntomas sospechosos.

d. Todas son correctas. Correcta

Retroalimentación

Respuesta correcta: Los pacientes con sintomatología respiratoria llevarán mascarilla quirúrgica cuando vayan a ser atendidos por un trabajador, además se debe realizar seguimiento estrecho de la aparición de síntomas compatibles con Covid-19, y en este caso es necesario avisar al responsable para que contacte con Enfermera Gestora de Casos y se establezcan las medidas oportunas.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el momento actual, las visitas de familiares a los centros residenciales:

Seleccione una:

a. Cualquier familiar puede visitar al residente sin ninguna restricción.

b. Se permiten visitas con protocolo estricto. Correcta

c. No se permite ninguna visita aún.

d. Un familiar con fiebre puede acudir al centro residencial.

Retroalimentación

Respuesta correcta: En el contexto actual, el BOJA extraordinario 31 de 28/05/2020, permite las visitas de familiares con un protocolo estricto elaborado por el CCRR: Solicitud previa, declaración de no enfermedad, ni síntomas relacionados con Covid-19, higiene de manos, duración máxima de una hora, uso de material de protección adecuado...

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para eliminar los desechos de un paciente Covid-19 positivo:

Seleccione una:

- a. Deben echarse en una bolsa roja y eliminarse como residuo peligroso.
- b. Sólo es necesario una bolsa de basura negra que se cierra y se elimina con la fracción resto.
- c. Son necesarias dos bolsas de basura negras: bolsa 1 con los desechos generados por el residente; bolsa 2 donde se deposita la bolsa 1 más los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador. La bolsa 2 se elimina como residuo peligroso.

d. Son necesarias tres bolsas de basura negras: bolsa 1 con los desechos generados por el residente; bolsa 2 donde se deposita la bolsa 1 más los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador; bolsa 3, donde se depositan los residuos domésticos y la bolsa 2. La bolsa 3 se elimina en el contenedor fracción resto. Correcta

Retroalimentación

Respuesta correcta: La bolsa de plástico con los residuos del residente (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la habitación. La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) con el resto de los residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las mascarillas FFP2:

Seleccione una:

a. Se deben usar en la atención a residentes sospechosos y confirmados, especialmente necesarias si se van a realizar alguna maniobra que genere aerosoles. Correcta

b. Son las recomendadas por las autoridades sanitarias para el uso habitual por la población.

c. Se recomienda su uso mientras se realiza cualquier atención o cuidado al residente.

d. No se recomienda su uso en ninguna situación.

Retroalimentación

Respuesta correcta: Las mascarillas FFP2 se recomienda el uso en la atención en pacientes sospechosos y confirmados, especialmente necesarias si se van a realizar alguna maniobra que genere aerosoles. Siempre asegurar las existencias suficientes para garantizar que estén disponibles cuando su uso está expresamente indicado.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes medidas posibilita la propagación del SARs-CoV-2?

Seleccione una:

a. No permitir visitas de familiares con síntomas.

b. Medidas de protección individual para profesionales, residentes y familiares.

c. Carteles informativos, infografías, y material visual en la residencia.

d. Usar la misma ropa y calzado al entrar en la residencia, que con la que se sale de casa. Correcta

Retroalimentación

Respuesta correcta: Se recomienda, que se use ropa diferente, incluyendo el calzado, para desempeñar el trabajo en el interior de la residencia.

Finalizar revisión

Feedback de la Actividad 5.2. Caso práctico

Un caso Sospechoso hay que tratarlo igual que si fuera un caso confirmado hasta que obtengamos los resultados de la prueba PCR, por lo que desde que tenemos la sospecha, activamos el protocolo de actuación con aislamiento por gotas y contacto.

Por ello, para cualquier atención al residente tenemos que proceder a actuar siguiendo las indicaciones de las Precauciones Ampliadas en tiempos covid. por lo que debemos colocarnos el equipo de protección individual (EPI).

La primera recomendación es no llevar anillos, relojes ni pulseras. Y antes de iniciar cualquier procedimiento lo primero es la higiene de manos, con agua/jabón o solución hidroalcohólica.

Secuencia colocación EPI:

Higiene de manos (HM), bata, mascarilla, gafas/ protección ocular y guantes.

Secuencia de Retirada EPI:

Bata-guantes(dando la vuelta sobre sí misma), higiene de manos, gafas/protección ocular, higiene de manos y por último retirar la mascarilla al abandonar la habitación y de nuevo higiene de manos.

Todo el material que se vaya a desechar se colocará en el contenedor (cubo) de residuos, lo que se pueda reutilizar se colocara en el recipiente destinado para ello, según el procedimiento del centro