

Cuidados críticos en enfermería intensiva

Comenzado el jueves, 17 de octubre de 2019, 11:30

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 17 de octubre de 2019, 11:34

Tiempo empleado 3 minutos 40 segundos

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Entre los efectos fisiológicos de decúbito prono están incluidos:

Seleccione una:

- ☒ a. Ventilación pulmonar. ❌
- ☐ b. Perfusión pulmonar.
- ☐ c. Todas son verdaderas.
- ☐ d. Compresión pulmonar posterior

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Para asegurarnos una desconexión de la VM favorable, el paciente deberá presentar:

Seleccione una:

- ☐ a. Un intercambio gaseoso adecuado y buen nivel de consciencia.
- ☐ b. Incapacidad para movilizar secreciones.
- ☒ c. a y d son correctas. ✔️
- ☐ d. Evolución favorable de la patología que provocó la conexión a VM.

La respuesta correcta es: a y d son correctas.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En la preparación para iniciar la maniobra de colocación en DP se incluyen:

Seleccione una:

- ☐ a. Detener de la administración de la nutrición enteral y colocar la SNG a bolsa.
- ☐ b. Realizar las curas oportunas.
- ☐ c. La SV y drenajes deben pinzarse y colocarse a los pies de la cama.
- ☒ d. Todas son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La principal diferencia entre la ECMO VV y la ECMO AV es:

Seleccione una:

- ☒ a. Proporciona soporte respiratorio. ✓
- ☐ b. Extrae la sangre de la cánula venosa y la devuelve una vez oxigenada por la cánula arterial.
- ☐ c. Proporciona soporte hemodinámico y respiratorio.
- ☐ d. b y c son ciertas.

La respuesta correcta es: Proporciona soporte respiratorio.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Las contraindicaciones para el uso del decúbito prono son:

Seleccione una:

- ☐ a. Situación hemodinámica estable.
- ☐ b. Fracturas vertebrales inestables con tracción esquelética.
- ☐ c. Presión intracraneal elevada.
- ☒ d. b y c son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: b y c son ciertas.

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

La complicación más frecuente del DP alcanzando un 98% de los casos:

Seleccione una:

- ☒ a. La extubación accidental. ❌
- ☐ b. Perdidas de accesos vasculares.
- ☐ c. Edemas faciales.
- ☐ d. Daños neuromusculares.

La respuesta correcta es: Edemas faciales.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La ECMO está indicada en:

Seleccione una:

- ☐ a. Pacientes con disfunción pulmonar o cardiaca no reversible en los que el tratamiento convencional fracasa.
- ☐ b. Pacientes con disfunción pulmonar o cardiaca en los que se utiliza como primera medida la ECMO.
- ☒ c. Pacientes con disfunción pulmonar o cardiaca potencialmente reversible en los que el tratamiento convencional ha fracasado. ✔️
- ☐ d. Pacientes con disfunción pulmonar o cardiaca no reversible.

La respuesta correcta es: Pacientes con disfunción pulmonar o cardiaca potencialmente reversible en los que el tratamiento convencional ha fracasado.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

Los métodos de desconexión de la VM más usados son:

Seleccione una:

- ☐ a. Ventilación mecánica no invasiva y PS.
- ☒ b. PS y SIMV. ❌
- ☐ c. TT, PS y SIMV.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: TT, PS y SIMV.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

En los cuidados de enfermería en el paciente en DP, están incluidos:

Seleccione una:

- ☐ a. Higiene ocular y de la boca según protocolo de la unidad.
- ☒ b. Todas son ciertas. ✓
- ☐ c. Vigilar y prevenir la formación de UPP.
- ☐ d. Controlar el nivel de sedación y relajación.

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

La complicación más común de la ECMO es:

Seleccione una:

- ☐ a. Complicaciones del sistema.
- ☐ b. Relacionadas con la implantación de las cánulas.
- ☒ c. Sangrado. ✓
- ☐ d. Infecciones.

La respuesta correcta es: Sangrado.

[Volver a: Módulo 1. Cuida... ➡](#)

Cuidados críticos en Enfermería Intensiva

Módulo 1. Cuidados de enfermería al paciente con patología respiratoria en UCI

Evaluación inicial Módulo 1: Test de conocimientos previos

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para asegurarnos una desconexión de la VM favorable, el paciente deberá presentar:

Seleccione una:

- a. Un intercambio gaseoso adecuado y buen nivel de consciencia.
- b. Incapacidad para movilizar secreciones.
- c. a y d son correctas.
- d. Evolución favorable de la patología que provocó la conexión a VM.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y d son correctas.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los cuidados de enfermería en el paciente en DP, están incluidos:

Seleccione una:

- a. Higiene ocular y de la boca según protocolo de la unidad.
- b. Todas son ciertas.
- c. Vigilar y prevenir la formación de UPP.
- d. Controlar el nivel de sedación y relajación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los efectos fisiológicos de decúbito prono están incluidos:

Seleccione una:

- a. Ventilación pulmonar.
- b. Perfusión pulmonar.
- c. Todas son verdaderas.
- d. Compresión pulmonar posterior

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La complicación más frecuente del DP alcanzando un 98% de los casos:

Seleccione una:

- a. La extubación accidental.
- b. Perdidas de accesos vasculares.
- c. Edemas faciales.
- d. Daños neuromusculares.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Edemas faciales.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los métodos de desconexión de la VM más usados son:

Seleccione una:

- a. Ventilación mecánica no invasiva y PS.
- b. PS y SIMV.
- c. TT, PS y SIMV.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: TT, PS y SIMV.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La complicación más común de la ECMO es:

Seleccione una:

- a. Complicaciones del sistema.
- b. Relacionadas con la implantación de las cánulas.
- c. Sangrado.
- d. Infecciones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sangrado.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La ECMO está indicada en:

Seleccione una:

- a. Pacientes con disfunción pulmonar o cardíaca no reversible en los que el tratamiento convencional fracasa.
- b. Pacientes con disfunción pulmonar o cardíaca en los que se utiliza como primera medida la ECMO.

- c. Pacientes con disfunción pulmonar o cardíaca potencialmente reversible en los que el tratamiento convencional ha fracasado.
- d. Pacientes con disfunción pulmonar o cardíaca no reversible.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pacientes con disfunción pulmonar o cardíaca potencialmente reversible en los que el tratamiento convencional ha fracasado.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las contraindicaciones para el uso del decúbito prono son:

Seleccione una:

- a. Situación hemodinámica estable.
- b. Fracturas vertebrales inestables con tracción esquelética.
- c. Presión intracraneal elevada.
- d. b y c son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son ciertas.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La principal diferencia entre la ECMO VV y la ECMO AV es:

Seleccione una:

- a. Proporciona soporte respiratorio.
- b. Extrae la sangre de la cánula venosa y la devuelve una vez oxigenada por la cánula arterial.
- c. Proporciona soporte hemodinámico y respiratorio.
- d. b y c son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Proporciona soporte respiratorio.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la preparación para iniciar la maniobra de colocación en DP se incluyen:

Seleccione una:

- a. Detener de la administración de la nutrición enteral y colocar la SNG a bolsa.
- b. Realizar las curas oportunas.
- c. La SV y drenajes deben pinzarse y colocarse a los pies de la cama.
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Evaluación final Módulo 1: autoevaluación asignatura 1

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La prueba de respiración espontánea se realizará cuando el paciente presente:

Seleccione una:

- a. Una evolución favorable de la patología que provocó la conexión a la VM.
- b. Todas son correctas.
- c. Deben mantener el reflejo de la tos y tener la capacidad para movilizar las secreciones.
- d. Nivel de consciencia adecuado que nos permita comunicarnos con él correctamente y explicarle todo el procedimiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La administración de ON se realiza durante:

Seleccione una:

- a. Previo al inicio de la fase inspiratoria.
- b. La fase inspiratoria.
- c. La fase espiratoria.
- d. Durante ambas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fase inspiratoria.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las indicaciones para el trasplante pulmonar son:

Seleccione una:

- a. EPOC.
- b. Enfermedad pulmonar intersticial difusa.
- c. Fibrosis quística.
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La definición de una sustancia ácida es:

Seleccione una:

- a. Toda sustancia capaz de aceptar hidrogeniones.
- b. Toda sustancia capaz de ceder hidrogeniones
- c. Aumento de la concentración de hidrogeniones.
- d. Disminución de la concentración de hidrogeniones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Toda sustancia capaz de ceder hidrogeniones

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La complicación más frecuente una vez realizado el trasplante pulmonar es:

Seleccione una:

- a. Rechazo crónico.
- b. Infección.
- c. Rechazo agudo.
- d. Fallo agudo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rechazo agudo.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Diremos que el paciente presenta un fallo en la desconexión de la VM cuando presente:

Seleccione una:

- a. Desaturación (SaTO2 menor de 90%).
- b. Disminución del nivel de conciencia.
- c. Falta de colaboración por parte del paciente, que puede adoptar una actitud pasiva o agitación.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las contraindicaciones absolutas para la realización del trasplante son:

Seleccione una:

- a. Diagnóstico de cáncer en los últimos 2 años, con excepción de tumores de piel basocelular o escamoso.
- b. Todas son correctas.
- c. Cardiopatía isquémica con mala función ventricular.
- d. Deterioro cardíaco, hepático y renal avanzado e irreversible.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente con ECMO en el soporte circulatorio la presión de perfusión sistémica va a depender de:

Seleccione una:

- a. De las resistencias vasculares sistémicas.
- b. Del flujo de sangre (flujo de la bomba más gasto cardiaco del paciente)
- c. Todas son falsas.
- d. a y b son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los estudios realizados con respecto al uso del DP han demostrado que:

Seleccione una:

- a. Mejora la mortalidad.
- b. Disminuye los días del uso de ventilación mecánica.
- c. Produce una mejoría significativa en la oxigenación.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Produce una mejoría significativa en la oxigenación.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

EL SIMV es un modo de ventilación definido como:

Seleccione una:

- a. El paciente respira espontáneamente a través del ventilador y éste proporciona una presión inspiratoria predeterminada
- b. Combina la ventilación controlada con ventilación asistida (iniciada por el paciente)
- c. Periodos de respiración espontánea con un suplemento de O₂
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Combina la ventilación controlada con ventilación asistida (iniciada por el paciente)

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existen tres tipos de pacientes donantes que son:

Seleccione una:

- a. Donantes tras parada cardiaca (asistolia)
- b. Donantes en muerte cerebral.
- c. Todas son correctas.
- d. Donantes vivos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las contraindicaciones relativas para el trasplante son:

Seleccione una:

- a. Edad superior a los 65 años.
- b. Que el donante esté en una situación de inestabilidad hemodinámica.
- c. Deterioro físico excesivo que impida la realización de rehabilitación ambulatoria
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los efectos adversos del ON combinado con otras moléculas son:

Seleccione una:

- a. Se convierte en un tóxico pulmonar directo por reacción de ON con O₂
- b. La formación de metahemoglobina al reaccionar con la hemoglobina en el capilar pulmonar.
- c. Todas son ciertas.

- d. En pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, esta puede agravarse por elevación de la presión capilar pulmonar al aumentar el flujo y la precarga del ventrículo izquierdo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante el uso con ECMO la anticoagulación se implantará:

Seleccione una:

- a. Desde el inicio de la implantación de las cánulas hasta la retirada total del

ECMO

- b. No se utiliza si el sistema es veno-veno.
c. Cuando se usa el sistema arterio-venoso se suspende la anticoagulación antes de la retirada del ECMO.
d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde el inicio de la implantación de las cánulas hasta la retirada total del ECMO

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El principal factor que limite el número de trasplantes de pulmón es:

Seleccione una:

- a. La elevada tasa de rechazos.
b. La escasez de donantes de pulmón.
c. La complicación de la cirugía.
d. La imposibilidad de encontrar receptores compatibles.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La escasez de donantes de pulmón.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El óxido nítrico es una molécula que actúa como vasodilatador del lecho vascular pulmonar cuando se administra por:

Seleccione una:

- a. Vía inhalatoria.
- b. Vía intravenosa.
- c. Vía intraosea.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía inhalatoria.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La acidosis está compensada si:

Seleccione una:

- a. El pH se mantiene mayor o igual a 7.38
- b. El pH se mantiene menor o igual a 7.31
- c. El pH es mayor de 7,35
- d. El pH es menor de 7,38.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El pH es mayor de 7,35

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las indicaciones para realizar una gasometría son:

Seleccione una:

- a. Monitorizar la gravedad y progresión de las enfermedades respiratorias.
- b. Sospecha de alteración del equilibrio ácido-base.
- c. Parada cardiorrespiratoria.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los criterios a reunir por los candidatos a un trasplante pulmonar son:

Seleccione una:

- a. Que tengan otra enfermedad significativa de otro órgano principal diferente al pulmón.
- b. Enfermedad pulmonar progresiva en situación avanzada.
- c. Edad superior a los 65 años.
- d. Que sean dependiente de un respirador.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedad pulmonar progresiva en situación avanzada.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se define PH como:

Seleccione una:

- a. Presión parcial de dióxido de carbono
- b. Presión parcial de extracción del oxígeno de la sangre arterial
- c. Parámetro indicador de la acidez o alcalinidad de una muestra de sangre
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Parámetro indicador de la acidez o alcalinidad de una muestra de sangre

Cuidados críticos en enfermería intensiva

Comenzado el jueves, 24 de octubre de 2019, 23:00

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 24 de octubre de 2019, 23:12

Tiempo empleado 11 minutos 24 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Que presión se utiliza en la VM para evitar el Colapso Alveolar

Seleccione una:

- ☐ a. Ppico
- ☒ b. PEEP ✓
- ☐ c. Pmeseta
- ☐ d. Todas se utilizan para evitar el colapso alveolar

La respuesta correcta es: PEEP

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál es la definición de Flujo

Seleccione una:

- ☐ a. Es la cantidad de aire que entra en los pulmones
- ☐ b. Es la presión que se ejerce para evitar un colapso alveolar
- ☒ c. Es la velocidad en la que se entrega el aire y está directamente relacionado con el tiempo inspiratorio ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Es la velocidad en la que se entrega el aire y está directamente relacionado con el tiempo inspiratorio

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Los objetivos de la VM irán encaminados a... (señale la Incorrecta)

Seleccione una:

- ☐ a. Reducir el trabajo respiratorio
- ☐ b. Mejorar intercambio gaseoso
- ☐ c. Valorar mantener la VM todo el tiempo que sea posible a pesar de la mejoría del paciente
- ☒ d. A y B son correctas ✗

La respuesta correcta es: Valorar mantener la VM todo el tiempo que sea posible a pesar de la mejoría del paciente

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales son los valores máximos que se administra en la Presión Pico

Seleccione una:

- ☐ a. 30-50 cm H₂O
- ☐ b. 30-40 cm H₂O
- ☒ c. 35-40 cm H₂O ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: 35-40 cm H₂O

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de las siguientes contraindicaciones está relacionado con la VMNI:

Seleccione una:

- ☐ a. Traumatismo craneal
- ☐ b. Vómitos
- ☐ c. Abundantes secreciones respiratorias
- ☒ d. b y c son correctas ✓

La respuesta correcta es: b y c son correctas

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Que curvas típicas podemos ver en el ventilador:

Seleccione una:

- ☐ a. Presión
- ☐ b. Volumen y temperatura
- ☐ c. Flujo espiratorio
- ☒ d. Presión, volumen y flujo ✓

La respuesta correcta es: Presión, volumen y flujo

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El volumen minuto de un paciente en SIMV dependerá de:

Seleccione una:

- ☐ a. Frecuencia respiratoria
- ☐ b. Volumen tidal fijado para las respiraciones controladas
- ☐ c. Volumen de las ventilaciones asistidas
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Criterios clínicos para iniciar una VM

Seleccione una:

- ☐ a. FR mayor de 35 rpm
- ☐ b. Hipercapnia
- ☐ c. Hipoxemia
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los parámetros ventilatorios nos permiten adaptar la ventilación a las necesidades del paciente. Como se llama el parámetro que fija cuando se va a iniciar la inspiración del nuevo ciclo del paciente

Seleccione una:

- ☐ a. Relación I: E
- ☐ b. Volumen tidal
- ☐ c. PEEP
- ☒ d. Trigger ✓

La respuesta correcta es: Trigger

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

A la fase del ciclo ventilatorio en la que la ventilación pasa de la espiración a una nueva embolada se denomina

Seleccione una:

- ☐ a. Ciclado
- ☐ b. Tiempo espiratorio
- ☐ c. Espiración
- ☒ d. Disparo ✓

La respuesta correcta es: Disparo

Cuidados críticos en enfermería intensiva

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Comenzado el | jueves, 24 de octubre de 2019, 23:25 |
| Estado | Finalizado |
| Finalizado en | viernes, 25 de octubre de 2019, 00:32 |
| Tiempo empleado | 1 hora 6 minutos |
| Puntos | 19,00/20,00 |
| Calificación | 9,50 de 10,00 (95%) |
| Comentario - | Apto |

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando en un paciente sometido a ventilación mecánica se activa la alarma de volumen minuto bajo, puede ser debido a:

Seleccione una:

- ☐ a. Presencia de broncoespasmo
- ☐ b. Acodamiento del tubo
- ☐ c. Aumento de las secreciones.
- ☒ d. Desconexión del paciente ✓

La respuesta correcta es: Desconexión del paciente

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La diferencia de la V. Mecánica y V. espontanea

Seleccione una:

- ☐ a. La entrada de aire la produce el propio ventilador supliendo la musculatura respiratoria
- ☐ b. El aire que entra produce una presión neutra
- ☐ c. La espiración en la VM al igual que en la ventilación espontánea es un proceso pasivo
- ☒ d. A y C son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Como se define la Ventilación Mecánica

Seleccione una:

- ☒ a. La utilización de un dispositivo para sustituir parcial o totalmente, la entrada y salida de aire al aparato respiratorio de forma temporal ✓
- ☐ b. La utilización de un dispositivo para sustituir parcialmente la entrada y salida de aire al aparato respiratorio de forma permanente
- ☐ c. Es una terapia paliativa de manejo domiciliario
- ☐ d. Su uso es exclusivo de terapias en unidades de Hospitalización

La respuesta correcta es: La utilización de un dispositivo para sustituir parcial o totalmente, la entrada y salida de aire al aparato respiratorio de forma temporal

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

cual de las siguientes siglas corresponden a una Modalidad Mixta de ventilación

Seleccione una:

- ☐ a. BIIPAP
- ☒ b. BIPAP y SIMV ✓
- ☐ c. BIPP
- ☐ d. SIM

La respuesta correcta es: BIPAP y SIMV

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes cuidados de Enfermería está relacionado con el control de neumonías asociadas a VM

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar higiene de manos antes y después del contacto con el paciente y su entorno
- ☐ b. Realizar y mantener la correcta higiene de los equipos usados en la terapia respiratoria
- ☐ c. Realizar una correcta higiene oral, al menos tres veces al día o cuando sea necesario, para evitar que las secreciones se acumulen en la orofaringe y se produzca microaspiraciones
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tienes un paciente con VM que le suena en el respirador una alerta que nos indica que tiene Presión Pico elevada. Que comprobaciones harías para resolver la alerta.

Seleccione una:

- ☐ a. Vigilar acodamiento de las tubuladuras y del TET
- ☐ b. Que el paciente esté mordiendo el tubo
- ☐ c. Que tengamos que aspirar secreciones
- ☒ d. Todos son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todos son correctas

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Existe un tipo de dispositivo que aplica una presión positiva gracias al denominado “efecto jet” que es capaz de generar un alto flujo continuo mientras el paciente respira de forma espontánea.

Seleccione una:

- ☒ a. Mascarilla tipo Boussignac ✓
- ☐ b. Mascarilla tipo reservorio
- ☐ c. VMNI
- ☐ d. Gafas nasales de Alto Flujo

La respuesta correcta es: Mascarilla tipo Boussignac

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

A nivel respiratorio cuales son los principales efectos de la VM

Seleccione una:

- ☐ a. Reduce el shunt pulmonar
- ☐ b. Aumento espacio muerto
- ☒ c. a y b son correctas ✓
- ☐ d. a y b son incorrectas

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Uno de los inconvenientes de la VMNI

Seleccione una:

- ☐ a. Inicio y retirada VM de forma flexible
- ☐ b. Puede hablar e ingerir alimentos sin problemas
- ☒ c. Distensión gástrica y aspiración ✓
- ☐ d. Menor riesgo de infección respiratoria

La respuesta correcta es: Distensión gástrica y aspiración

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué niveles de presión se emplea en el modo BIPAP (VMNI)

Seleccione una:

- ☐ a. EPOPP
- ☐ b. IPAPP
- ☒ c. IPAP y EPAP ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: IPAP y EPAP

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de las afirmaciones no es una ventaja de la VMNI

Seleccione una:

- ☐ a. Menor riesgo de infección
- ☐ b. Disminuye el tiempo de VM y de UCI
- ☒ c. Mayor sedación ✓
- ☐ d. Puede hablar e ingerir

La respuesta correcta es: Mayor sedación

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes afirmaciones relacionadas con el aspecto del apoyo psicológico, ¿qué es lo más adecuado? (señale la incorrecta)

Seleccione una:

- ☒ a. Tratar al paciente usando un lenguaje técnico porque no le hace falta que entienda su proceso médico ✓
- ☐ b. Facilitar y fomentar la comunicación del paciente con la familia
- ☐ c. Fomentar el contacto físico entre la familia y el personal sanitario con el paciente (no usar guante siempre que se pueda)
- ☐ d. Tratar al paciente con amabilidad y comprensión, usando lenguaje verbal y no verbal.

La respuesta correcta es: Tratar al paciente usando un lenguaje técnico porque no le hace falta que entienda su proceso médico

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

A nivel endocrino que efectos tiene la utilización de la VM

Seleccione una:

- ☐ a. Disminución de la hormona Antidiurética
- ☐ b. Aumento de la hormona GH
- ☒ c. Aumento de la hormona antidiurética ✓
- ☐ d. Disminución de la Oxitocina

La respuesta correcta es: Aumento de la hormona antidiurética

Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En un respirador controlado por Presión que Parámetros deberás ajustar

Seleccione una:

- ☐ a. Volumen tidal o corriente
- ☒ b. Presión inspiratoria ✗
- ☐ c. Frecuencia respiratoria
- ☐ d. B y C son correctas

La respuesta correcta es: B y C son correctas

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En los cuidados de la higiene bucal en un paciente con TOT cada cuanto se cambia la fijación del dispositivo.

Seleccione una:

- ☐ a. En ningún caso se cambia hasta que lo precise
- ☐ b. Dos veces al día
- ☒ c. Una vez por turno o cuando sea necesario ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Una vez por turno o cuando sea necesario

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de las siguientes contraindicaciones de la VMNI es cierta

Seleccione una:

- ☐ a. Bajo nivel de conciencia
- ☐ b. Inestabilidad hemodinámica
- ☐ c. Traumatismo facial
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Es responsabilidad de la Enfermera el control, vigilancia y atención a las alarmas del respirador. Cuando hay que revisar los límites de las alarmas de un paciente con VM

Seleccione una:

- ☐ a. Al inicio del turno de trabajo
- ☐ b. Si la situación del paciente cambia
- ☐ c. Tras la conexión del paciente
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un respirador controlado por Volumen ¿qué inconveniente nos podemos encontrar?

Seleccione una:

- ☐ a. Barotrauma
- ☐ b. Necesidad de sedación
- ☐ c. Atrofia de musculatura respiratoria
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el tubo orotraqueal, que presión debe de tener el neumotaponamiento

Seleccione una:

- ☐ a. 20-50 mm Hg
- ☐ b. 10-20 mm Hg
- ☒ c. 20-30 mm Hg ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: 20-30 mm Hg

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando el objetivo es que el paciente participe en la ventilación y emplee su musculatura inspiratoria, se emplean modos asistidos. De las siguientes afirmaciones, cual puede ser un inconveniente en el uso de este sistema. Señale la incorrecta.

Seleccione una:

- ☒ a. No requiere de esfuerzo activo por parte del paciente ✓
- ☐ b. Requiere de esfuerzo activo por parte del paciente
- ☐ c. No garantiza un volumen minuto constante ya que no se controla ni el volumen inspiratorio ni la frecuencia respiratoria
- ☐ d. B y C son correctas

La respuesta correcta es: No requiere de esfuerzo activo por parte del paciente

Cuidados críticos en enfermería intensiva

Comenzado el viernes, 25 de octubre de 2019, 21:19

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 25 de octubre de 2019, 21:20

Tiempo empleado 45 segundos

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es una causa común de la ICA?

Seleccione una:

- ☐ a. Miocardiopatía
- ☐ b. Síndrome coronario agudo
- ☐ c. Descompensación de la ICC
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente que presenta dolor torácico en un ECG de 12 derivaciones muestra elevación del ST en las derivaciones II, III y aVf, es recomendable la realización de:

Seleccione una:

- ☐ a. ECG de derivaciones posteriores
- ☐ b. ECG de derivaciones derechas
- ☐ c. Ninguna de las anteriores
- ☒ d. a y b son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son ciertas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ingresa en nuestra UCI un paciente con dolor torácico, disnea, ligera hipoxia y evidencia en el ECG de SCACEST. Porta vía intravenosa en MSI. Dentro de los cuidados iniciales realizaremos:

Seleccione una:

- ☐ a. Monitorización del paciente
- ☐ b. Administración de oxígeno



c. Administración de analgésicos



d. Todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál no es un síntoma o signo característico de la ICA?

Seleccione una:



a. Disnea



b. Edemas



c. Agitación



d. Nistagmo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nistagmo

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La complicación potencial más importante de la fibrinólisis es:

Seleccione una:

- ☐ a. Reacción alérgica
- ☐ b. Dolor torácico
- ☒ c. Hemorragia intracraneal
- ☐ d. Hematuria

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hemorragia intracraneal

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el manejo inmediato de la ICA por parte de enfermería no es necesario

Seleccione una:

- ☐ a. Valoración integral
- ☐ b. Vigilancia hemodinámica
- ☐ c. Control de diuresis
- ☒ d. Colocación de sonda nasogástrica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocación de sonda nasogástrica

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El levosimendán está dentro del grupo de fármacos

Seleccione una:

- ☐ a. Vasopresores
- ☐ b. Beta bloqueantes
- ☒ c. Agentes inotrópicos
- ☐ d. Diuréticos de asa

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Agentes inotrópicos

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ingresa en nuestra UCI un paciente procedente de urgencias con TA 60/32 mmHg, FC 150 lpm, disnea y sat O2 89%. En el ecocardiograma que le realiza se evidencia un taponamiento cardíaco. El paciente porta VVP nº18 en MSD ¿qué es lo prioritario en este paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Administrar oxígeno por medio de gafas nasales
- ☐ b. Canalización de más VVP para administración de cristaloides IV
- ☒ c. Realización de una pericardiocentesis



d. Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realización de una pericardiocentesis

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes recomendaciones no está indicado en los cuidados post ICP por vía femoral:

Seleccione una:



a. Flexionar el miembro inferior sobre el que se realizó la punción



b. Vigilancia de la zona de punción



c. Valoración frecuente del pulso pedio y poplíteo



d. Compresión manual en caso de sangrado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Flexionar el miembro inferior sobre el que se realizó la punción

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La pericardiocentesis se realiza por medio de técnica:

Seleccione una:

- ☐ a. Aséptica
- ☒ b. Estéril
- ☐ c. Todas las anteriores
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estéril

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué tipo de shock será necesaria la utilización de medidas de asistencia ventricular una vez que haya fallado el tratamiento anterior?

Seleccione una:

- ☐ a. Shock hipovolémico
- ☐ b. Shock anafiláctico
- ☒ c. Shock cardiogénico
- ☐ d. Shock neurogénico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock cardiogénico

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando el shock cursa con hipotensión, alteración del estado neurológico, pulsos periféricos débiles o ausentes, diuresis aún más disminuida, acidosis metabólica progresiva y pueden aparecer arritmias, estamos en fase:

Seleccione una:

- ☐ a. Inicial
- ☐ b. Compensada
- ☒ c. Descompensada
- ☐ d. Irreversible

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Descompensada

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para que se manifieste la situación de shock hipovolémico, la pérdida de sangre debe ser superior a:

Seleccione una:

- ☒ a. 25%
- ☐ b. 35%
- ☐ c. 30%
- ☐ d. 15%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 25%

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La causa más común del shock cardiogénico es:

Seleccione una:

- ☒ a. Infarto agudo de miocardio con disfunción del ventrículo izquierdo
- ☐ b. Insuficiencia cardíaca crónica
- ☐ c. Ambas son correctas
- ☐ d. Ambas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Infarto agudo de miocardio con disfunción del ventrículo izquierdo

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es necesario corregir la volemia antes de iniciar tratamiento con drogas vasoactivas.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero
- ☐ b. Falso
- ☐ c. Solo en casos de shock hipovolémico
- ☐ d. Solo en casos de shock cardiogénico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como medida principal para el manejo de un paciente en estado de shock:

Seleccione una:

- ☐ a. Apertura de la vía aérea y correcta oxigenación
- ☐ b. Control estricto de las constantes vitales, diuresis...
- ☐ c. Vigilancia estricta del nivel de conciencia
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

el shock más frecuente de tipo distributivo es:

Seleccione una:

- ☐ a. Shock anafiláctico
- ☐ b. Shock endocrino
- ☐ c. Shock tóxico
- ☒ d. Shock séptico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock séptico

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El microorganismo que produce el shock de tipo toxico es:

Seleccione una:

- ☐ a. Staphilococcus aureus
- ☐ b. Klebsiella pneumoniae
- ☒ c. Estreptococo del grupo A
- ☐ d. Todos son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estreptococo del grupo A

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La alineación cervical, el uso de corticoides y atropina, es un tratamiento específico del shock de tipo:

Seleccione una:

- ☐ a. Cardiogénico
- ☐ b. Séptico
- ☐ c. Anafiláctico
- ☒ d. Neurogénico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Neurogénico

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Podemos diferenciar dos tipos de shock hipodinámico e hiperdinámico. El shock hipodinámico engloba:

Seleccione una:

- ☐ a. Shock anafiláctico, shock cardiogénico y shock obstructivo
- ☒ b. Shock obstructivo, shock cardiogénico y shock hipovolémico
- ☐ c. Shock hipovolémico, shock distributivo y shock cardiogénico
- ☐ d. Shock séptico, shock anafiláctico y shock neurogénico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock obstructivo, shock cardiogénico y shock hipovolémico

Evaluación inicial Módulo 4:

Test de conocimientos previos asignatura 5

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los valores normales de PIC varían entre:

Seleccione una:

- ☐ a. Entre 0 y 20 mmHG
- ☒ b. Entre 5 y 15 mmHG
- ☐ c. Entre 3 y 12 mmHG
- ☐ d. Entre 20 y 30 mmHG

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 5 y 15 mmHG

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El cráneo es un contenedor rígido que aloja tres elementos:

Seleccione una:

- ☒ a. Tejido cerebral (80%), líquido cefalorraquídeo (10%) y volumen sanguíneo (10%).
- ☐ b. Tejido cerebral (10%), líquido cefalorraquídeo (80%) y volumen sanguíneo (10%).
- ☐ c. Tejido cerebral (10%), líquido cefalorraquídeo (10%) y volumen sanguíneo (80%).
- ☐ d. Tejido cerebral (5%), líquido cefalorraquídeo (5%) y volumen sanguíneo (90%)

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tejido cerebral (80%), líquido cefalorraquídeo (10%) y volumen sanguíneo (10%).

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La Presión de Perfusión Cerebral (PPC) se calcula:

Seleccione una:

- ☐ a. Es la diferencia entre la Presión Arterial Media y la PIC
- ☐ b. $PAM - PIC = PPC$
- ☐ c. $TAS - PIC = PPC$
- ☒ d. A y B son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La posición adecuada para el paciente que ha sufrido TCE grave es:

Seleccione una:

- ☐ a. Decúbito lateral derecho con elevación de la cabeza
- ☐ b. Prono
- ☒ c. Cabeza en posición alineada y cabecero elevado
- ☐ d. Decúbito lateral izquierdo sin elevación del cabecero.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cabeza en posición alineada y cabecero elevado

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un estado de hipoperfusión cerebral entraña un importante riesgo de:

Seleccione una:

- ☐ a. Hiperemia
- ☒ b. Isquemia
- ☐ c. Aumento de la PIC
- ☐ d. Disminución de la PIC

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Isquemia

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El rango que se considera normal de PPC es de:

Seleccione una:

- ☐ a. 40-60 mmHG
- ☐ b. 5-15 mmHG
- ☒ c. 50- 150 mmHG.
- ☐ d. 70-100 mmHG

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 50- 150 mmHG.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un valor de 0 en el BIS corresponde a:

Seleccione una:

- ☐ a. Consciencia
- ☐ b. Obedece órdenes
- ☒ c. Inactividad cortical
- ☐ d. Glasgow 12

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inactividad cortical

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El método de elección para el diagnóstico, pronóstico y control evolutivo del TCE es:

Seleccione una:

- ☒ a. TAC Cerebral
- ☐ b. Resonancia Magnética
- ☐ c. Analítica, ECG y radiografía de tórax
- ☐ d. Todas son verdaderas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: TAC Cerebral

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente dormido sin respuesta a estímulos corresponde con una escala de Ramsay:

Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☒ b. 6
- ☐ c. 4
- ☐ d. 5

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente que tiene apertura de ojos espontánea, respuesta verbal orientada y obedece órdenes a estímulos motores tiene un Glasgow de:

Seleccione una:

- ☐ a. 8

☐ b. 10

☒ c. 15

☐ d. 6

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 15

Evaluación final Módulo 4: Autoevaluación asignatura 5

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para diagnosticar el SGB:

Seleccione una:

- ☐ a. En las primeras horas se observa una disminución importante de las proteínas en el LCR
- ☐ b. En las primeras horas se observa un aumento importante de las proteínas en el LCR
- ☒ c. En los días posteriores a los primeros síntomas se observa un aumento importante de proteínas en el LCR
- ☐ d. En los días posteriores a los primeros síntomas se observa una disminución importante en el LCRT.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En los días posteriores a los primeros síntomas se observa un aumento importante de proteínas en el LCR

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuál de estas afirmaciones es CIERTA:

Seleccione una:

- ☐ a. En el manejo de la Hiper PIC, se encuentra mantener normotermia, tolerando una hipotermia de hasta 34-35°C
- ☐ b. Mantendremos una glucemia superior a 190mg/dl
- ☐ c. a y b son ciertas
- ☒ d. Ninguna de las afirmaciones es cierta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el manejo de la Hiper PIC, se encuentra mantener normotermia, tolerando una hipotermia de hasta 34-35°C

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de esas afirmaciones es CIERTA:

Seleccione una:

- ☐ a. Las enfermedades hematológicas no hacen parte de las causas de hemorragia
- ☐ b. Los tumores cerebrales no sangran, por lo que no pueden ser causa de una hemorragia cerebral
- ☒ c. Sospecharemos de una hemorragia cerebral, secundaria a malformaciones arterio-venosas en pacientes adultos jóvenes sin HTA.
- ☐ d. El consumo de drogas no es causa de riesgo para una hemorragia cerebral.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sospecharemos de una hemorragia cerebral, secundaria a malformaciones arterio-venosas en pacientes adultos jóvenes sin HTA.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los cuidados de enfermería en la UCI en pacientes con SGB son:

Seleccione una:

- ☐ a. Control estricto de los signos vitales (TA, FC, Tª, SatO2, FR)
- ☐ b. Valoración neurológica continua para evaluar la progresión de la enfermedad (nivel de conciencia, evaluar la fuerza muscular, etc.)
- ☐ c. Fomentar la fisioterapia respiratoria para evitar las atelectasias y las neumonías
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el tratamiento del paciente con hiperPIC:

Seleccione una:

- ☐ a. No lo mantendremos con Paco2 más bajos de 40
- ☐ b. Siempre se utilizará corticosteroides
- ☐ c. Procuraremos mantener tensiones bajas
- ☒ d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son falsas

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto a los cuidados de enfermería en pacientes neurocríticos:

Seleccione una:

- ☐ a. No será necesario vigilancia de diuresis horaria
- ☐ b. No se realizará valoración motora para no aumentar PIC del paciente
- ☒ c. Se realizará valoración pupilar y examinará la función motora
- ☐ d. ninguna de las anteriores afirmaciones es cierta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se realizará valoración pupilar y examinará la función motora

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las manifestaciones clínicas de los tumores cerebrales son:

Seleccione una:

- ☐ a. Dolor de cabeza
- ☐ b. Vómitos inexplicables
- ☐ c. Problemas en la visión y audición
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál es la causa más frecuente de hemorragia cerebral?

Seleccione una:

- ☐ a. Farmacológica
- ☒ b. Hipertensión arterial
- ☐ c. Tumores
- ☐ d. Drogas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipertensión arterial

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de estas afirmaciones es FALSA:

Seleccione una:

- ☐ a. La TA, en una hemorragia, es necesario que tenga valores muy elevados, para mejorar PPC.
- ☐ b. La presencia de hipoxia tiende a aumentar la PIC
- ☐ c. a y b son ciertas
- ☒ d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son falsas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En los cuidados de enfermería en las primeras horas de paciente intervenido de una extirpación de un tumor cerebral hay que tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☐ a. Vigilar el sangrado y vigilar las posibles convulsiones en las primeras horas postquirúrgicas
- ☐ b. Vigilar el estado de conciencia y las pupilas
- ☒ c. a y b son ciertas
- ☐ d. Vigilar la ingesta y la deambulaci3n

Retroalimentaci3n

La respuesta correcta es: a y b son ciertas

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Unas pupilas con menos de 2mm de diámetro son unas pupilas:

Seleccione una:

- ☐ a. Isocóricas
- ☐ b. Reactivas
- ☐ c. Medias
- ☒ d. Mióticas

Retroalimentaci3n

La respuesta correcta es: Mióticas

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el SGB los síntomas que hay que actuar con urgencia son:

Seleccione una:

- ☐ a. Debilidad muscular
- ☐ b. Dificultad para deglutir

☐ c. Ausencia temporal de la respiración

☒ d. b y c son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son ciertas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para el tratamiento de la SGB:

Seleccione una:

☐ a. Está contraindicado la plasmaféresis

☐ b. Está indicado la plasmaféresis como único tratamiento

☒ c. Está indicado la administración de Inmunoglobulina G Humana IV y la plasmaféresis

☐ d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está indicado la administración de Inmunoglobulina G Humana IV y la plasmaféresis

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto al diagnóstico de la hemorragia:

Seleccione una:

☐ a. Siempre será necesario e imprescindible un electromiograma

☐ b. Es necesario un TAC

☐ c. RM para determinar la edad evolutiva del hematoma

☒ d. b y c son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son ciertas

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el tratamiento de la SGB:

Seleccione una:

☐ a. La administración de Inmunoglobulina G Humana IV se aconseja en los primeros 7 días de la enfermedad

☐ b. Las ventajas de la administración de Inmunoglobulina G Humana IV sobre la Plasmaféresis son su fácil administración, y seguridad en pacientes inestables.

☐ c. a y b son falsas

☒ d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un tumor cerebral se diagnostica a través de las siguientes pruebas:

Seleccione una:

- ☐ a. TAC
- ☐ b. RM
- ☐ c. Biopsia

☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los síntomas más frecuentes de la hemorragia se encuentran:

Seleccione una:

- ☐ a. Debilidad, entumecimiento o parálisis de cara, brazo o pierna
- ☐ b. Dolor de cabeza repentino
- ☐ c. Pérdida de coordinación

☒ d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente con una escala Glasgow menor de 7, diremos que es un paciente:

Seleccione una:

- ☐ a. Totalmente despierto, con alguna deficiencia de respuesta
- ☐ b. Un poco adormilado
- ☒ c. Un paciente neurológico con una escala Glasgow inferior a 8 debe ser intubado

para preservar vía aérea

☐ d. Un paciente neurológico con dolor

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un paciente neurológico con una escala Glasgow inferior a 8 debe ser intubado para preservar vía aérea

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Existe una mayor incidencia para contraer el SGB en:

Seleccione una:

- ☐ a. La población infantil
- ☐ b. En la población entre los 50-60 años
- ☐ c. a y b son correctas
- ☒ d. En adultos jóvenes y en mayores de 55 años

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En adultos jóvenes y en mayores de 55 años

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una neuropatía:

Seleccione una:

- ☒ a. Adquirida que se desencadena tras un proceso de tipo infeccioso
- ☐ b. Hereditaria
- ☐ c. Es una enfermedad crónica
- ☐ d. b y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adquirida que se desencadena tras un proceso de tipo infeccioso