

Curso de enfermería en **Enfermedad Inflamatoria Intestinal**

Tema 3


Inicio (<https://www.geminis-enfermeriaei.com>)

> Curso de enfermería en EI (<https://www.geminis-enfermeriaei.com/assignaturas/detalle/curso-de-enfermeria-en-eii/2>)

> Tema 3

El tiempo restante para la realización del curso es de 55 días, 23 horas y 13 minutos.

PROGRESO MÓDULO: ≡



Tratamientos para la EI (...)

Descargar capítulo y pres...

Autoevaluación (opcional...)

<< (<https://www.geminis-enfermeriaei.com/contenido/detalle-contenido/descargar-capitulo-y-presentacion-diapositivas/6>)

📄 + Info

Enhorabuena, usted ha superado esta evaluación
Su puntuación para esta evaluación ha sido un 80% 4/5

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los aminosalicilatos es falsa?

- ☐ a. Están indicados en el tratamiento de la colitis ulcerosa.
- ☒ b. Son útiles en el tratamiento de la enfermedad de Crohn moderada y grave.

- ☒ ☐ c. Debe monitorizarse la función renal en pacientes con tratamiento concomitante con otros fármacos nefrotóxicos.
- ☐ d. Pueden administrarse por vía oral y rectal.
2. ¿Cuál de los siguientes esteroides tiene menor biodisponibilidad y, por tanto, menos efectos secundarios?
- ☒ ☐ a. Budesonida.
- ☐ b. Prednisona.
- ☐ c. Prednisolona.
- ☐ d. Metilprednisolona.
3. ¿Cuál de los siguientes es un efecto secundario típico de los esteroides, cuando se emplean durante periodos prolongados?
- ☐ a. Hipertensión arterial.
- ☐ b. Diabetes mellitus.
- ☐ c. Osteoporosis.
- ☒ ☐ d. Todos los anteriores son correctos.
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los inmunosupresores tiopurínicos es cierta?
- ☐ a. No es necesaria la monitorización del hemograma durante las primeras semanas de tratamiento, ya que la toxicidad medular es, generalmente, tardía.
- ☒ ☐ b. Es recomendable disponer de la determinación del genotipo o la actividad la tiopurina metiltransferasa (TPMT) antes de iniciar el tratamiento.
- ☐ c. No se ha descrito un aumento de riesgo de infecciones asociadas al tratamiento.
- ☐ d. No se ha descrito un aumento de riesgo de linfomas asociados al tratamiento.
5. Con respecto al metotrexato, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
- ☐ a. No es un fármaco teratogénico, y puede emplearse con seguridad en el embarazo.
- ☐ b. Las náuseas son un efecto secundario poco frecuente.
- ☐ c. Está indicado para el tratamiento de la colitis ulcerosa leve a moderada.
- ☒ ☐ d. Debe vigilarse la posibilidad de desarrollo de fibrosis hepática en pacientes tratados a largo plazo.

<< Anterior (<https://www.geminis-enfermeriaei.com/contenido/detalle-contenido/descargar-capitulo-y-presentacion-diapositivas/6>)

