

Curso de enfermería en **Enfermedad Inflamatoria Intestinal**

Tema 7


Inicio (<https://www.geminis-enfermeriaeii.com>)

> Curso de enfermería en EI (<https://www.geminis-enfermeriaeii.com/asignaturas/detalle/curso-de-enfermeria-en-eii/2>)

> Tema 7

El tiempo restante para la realización del curso es de 55 días, 23 horas y 11 minutos.

PROGRESO MÓDULO: ≡



Manejo de fármacos sub... ✓

Descargar capítulo y pres... ✓

Autoevaluación (opcional... 🔍

<< (<https://www.geminis-enfermeriaeii.com/contenido/detalle-contenido/descargar-capitulo-y-presentacion-diapositivas/18>)

📘 + Info

Enhorabuena, usted ha superado esta evaluación
Su puntuación para esta evaluación ha sido un 100% 5/5

1. Dentro del arsenal terapéutico los fármacos que se administran vía subcutánea para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal son:
- ☐ a. Metotrexato
 - ☐ b. Adalimumab, Golimumab, Ustekinumab y Certolizumab
 - ☒ c. a y b son correctas.

☐ d. Adalimumab, Golimumab, Ustekinumab ,Certolizumab y Natalizumab

2. Es determinante para abordar de manera efectiva la inflamación intestinal...

- ☐ a. Una correcta administración del tratamiento, evitando manipulaciones incorrectas del dispositivo de administración.
- ☐ b. Un adherencia optima del paciente
- ☐ c. Mantener al paciente en remisión clínica

☒ d. Todas son correctas.

3. Antes de empezar el tratamiento, es importante conocer del paciente...

- ☐ a. Si ha comprendido la información proporcionada por la enfermera, sobre el fármaco y la técnica.
- ☐ b. Si existen limitaciones físicas y/o psíquicas.
- ☐ c. Valorar el grado de colaboración

☒ d. Todas son correctas.

4. Dentro de las ventajas de la administración del tratamiento por vía subcutánea están: Señala la falsa:

- ☐ a. Es una técnica poco agresiva: sólo interesa el tejido celular subcutáneo, con agujas de pequeño calibre (29/27G)
- ☒ b. Nunca produce eritema local
- ☐ c. Se puede utilizar en domicilio: no requiere vigilancia tan intensa como la vía intravenosa ni hospitalización.
- ☐ d. Permite mayor autonomía del paciente: se puede instruir al paciente y/o a la familia a usar la vía subcutánea.

5. En caso de viajar en avión con un fármaco subcutáneo que precisa conservación en frío...

- ☐ a. Puede transportarlo dentro del equipaje para facturar sin problema
- ☐ b. No es preciso llevar un documento o informe dónde se indique que precisa el tratamiento.
- ☒ c. Debe llevarlo en el equipaje de mano, acompañado de su receta o informe médico y presentar la medicación separadamente en el control de seguridad, dentro de bolsas transparentes con sistema de apertura y cierre,
- ☐ d. No es preciso conocer la normativa en vigor de los aeropuertos.

Aviso legal (<https://www.geminis-enfermeriaeii.com/pages/aviso-legal>)

Política privacidad (<https://www.geminis-enfermeriaeii.com/pages/politica-de-privacidad>)