

Organizado por:

 (https://www.geminis-enfermeriaeii.com)



# Curso de enfermería en **Enfermedad Inflamatoria Intestinal**

Tema 8


Inicio (https://www.geminis-enfermeriaeii.com)

> Curso de enfermería en EII (https://www.geminis-enfermeriaeii.com/asignaturas/detalle/curso-de-enfermeria-en-eii/2)

> Tema 8

El tiempo restante para la realización del curso es de 54 días, 7 horas y 44 minutos.

**PROGRESO MÓDULO:** 



Autoevaluación (opc... 

Apartado B

Adherencia terapéuti... 

Autoevaluación (opc... 

 + Info

ica-e-intervenciones-para-su-mejora/24) aeii.com/contenido/detalle-contenido/tecnicas-de-comunicacion/21)

Enhorabuena, usted ha superado esta evaluación  
Su puntuación para esta evaluación ha sido un 100% 5/5

1. De los siguientes componentes del acto comunicativo, señale la respuesta incorrecta:

- a. Fuente.
- b. Receptor.
- c. Canal.
- d. Paralenguaje.

“ Los componentes de la comunicación son el emisor o fuente, receptor, mensaje, canal, código y contexto. El mensaje se transmite con un código, que deben compartir emisor y receptor y que puede estar constituido fundamentalmente tanto por lenguaje verbal como no verbal. El paralenguaje (interjecciones, entonación... matiza el mensaje y aporta cierta información, pero no es un componente per sé del acto comunicativo necesario. ”

2. Indique el porcentaje que estima más correcto del peso de la comunicación no verbal en un acto comunicativo habitual:

- a. 15-20%.
- b. 25-40%.
- c. 45-60%.
- d. 65-80%.

“ El componente informativo más importante en el acto comunicativo es el no verbal. ”

3. Relacione la asociación correcta de relación profesional-paciente, hacia quién/qué está enfocada y propósito de la relación:

- a. Modelo paternalista, centrada en el paciente, relación facilitadora.
- b. Modelo deliberativo, centrado en la enfermedad, relación directiva.
- c. Modelo democrático, centrado en la enfermedad, relación facilitadora.

“ Las asociaciones correctas son:  
1. *Modelo paternalista, centrada en el paciente, relación directiva*  
2. *Modelo deliberativo, centrado en el paciente, relación facilitadora*  
3. *Modelo democrático, centrado en la enfermedad, relación facilitadora*  
4. *Modelo autoritario, centrado en la enfermedad, relación directiva* ”

d. Modelo autoritario, centrado en la enfermedad, relación facilitadora.

4. Cuál de los siguientes métodos de comunicación es el más utilizado por los profesionales sanitarios para dirigirse colectivamente:

a. Charla.

“ Las charlas y coloquios son las formas de comunicación colectiva más frecuentemente utilizadas por los profesionales de la salud hacia la población general o hacia grupos de pacientes en particular. ”

b. Clase.

c. Dinámica de grupo.

d. Medios de comunicación como la TV, periódicos, radio...

5. alguna de las siguientes actitudes puede deteriorar el acto comunicativo con el paciente. Señale cuál:

a. Empatía.

b. Escucha activa.

c. Contacto visual continuo.

“ El contacto visual es necesario, pero de forma intermitente. De forma continua puede ser percibido por el paciente como amenazante. ”

d. Voz firme.

Aviso legal (<https://www.geminis-enfermeriaeii.com/pages/aviso-legal>)

| Política privacidad (<https://www.geminis-enfermeriaeii.com/pages/politica-de-privacidad>)