

EVALUACIÓN MÓDULO 3: ATENCIÓN INTEGRAL DE LA CONVALECENCIA

1.- Cuando queremos medir la predicción de la respuesta al tratamiento nutricional, ¿cuál sería el cribado nutricional más adecuado?:

- A.- SNAQ.
- B.- VGS.
- ☒ C.- NRS 2002.
- D.- Ninguno de los anteriores.

2.- ¿Qué tipo de registro de la ingesta se debería llevar a nivel hospitalario?:

- A.- Recordatorio de 3 días.
- B.- Consumo de grupos de alimentos.
- ☒ C.- Registro cuantitativo, basado en requerimientos habituales.
- D.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

3.- ¿Cuál es el porcentaje de las consultas en Atención Primaria que se dedica a la multimorbilidad?:

- A.- 1/4 de las consultas.
- B.- 1/3 de las consultas.
- C.- 1/2 de las consultas.
- ☒ D.- 1/5 de las consultas.

4.- Según el informe de Chest de 1999, ¿cuántos días más de hospitalización necesitan los pacientes desnutridos?:

- A.- 10.
- ☒ B.- 13.
- C.- 12.
- D.- 11.

5.- ¿Cada cuánto tiempo tienen que hacerse controles analíticos a un paciente estable?:

- A.- Cada 4 meses.
- B.- Cada 5 meses.
- ☒ C.- Cada 6 meses.
- D.- Cada 9 meses.

6.- Se considera desnutrición leve-moderada la pérdida de peso de:

- A.- Menos de 5 por ciento.
- B.- Entre 4 y 8 por ciento.
- ☒ C.- Entre 5 y 10 por ciento.
- D.- Más de un 10 por ciento.

7.- ¿Durante cuántas semanas debe realizar actividad física de resistencia para recuperar la masa muscular perdida?:

- A.- 12-24 semanas.
- ☒ B.- 3-10 semanas.
- C.- 25-30 semanas.
- D.- Más de 30 semanas.

8.- ¿Cómo clasificaría a un paciente con una puntuación en el MNA- SF® de 0-7?:

- A.- Normonutrido.
- B.- Riesgo de desnutrición.
- ☒ C.- Desnutrición.
- D.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

9.- En términos generales, ¿cuál es el porcentaje de actividad del sector de la salud dedicado a la cronicidad?:

- A.- 50 por ciento.
- B.- 60 por ciento.
- ☒ C.- 75 por ciento.
- D.- 70 por ciento.

10.- Dentro de los métodos prospectivos de diagnóstico está el registro dietético. ¿Cuántos días debemos recoger la ingesta alimentaria?

- ☒ A.- 3 días.
- B.- 4 días.
- C.- 5 días.
- D.- 6 días.