

Comenzado el	miércoles, 14 de julio de 2021, 14:10
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 14 de julio de 2021, 14:16
Tiempo empleado	5 minutos 32 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una mujer con 92kg de peso y 1.61m de altura, sin antecedentes personales relevantes y segunda gestación, con hijo previo sano, ¿qué medidas deberá hacer para prevenir los defectos del tubo neural?

Seleccione una:

- ☐ Oa. Tomar suplementos diarios de 0,4mg/día de ácido fólico.
- ☐ Ob. Tomar suplementos diarios de 0,4mg/día de ácido fólico y 200mcg de yodo.
- ☐ Oc. Tomar suplementos diarios de 4mg/día de ácido fólico.
- ☐ Od. Tomar suplementos diarios de 4mg/día de ácido fólico y 200mcg de yodo.

Retroalimentación

Epígrafe control prenatal / Consulta pregestacional.

La respuesta correcta es: Tomar suplementos diarios de 4mg/día de ácido fólico.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se considera un factor de riesgo la esterilidad en tratamiento, al menos de ¿cuántos años?

Seleccione una:

- ☐ Oa. 1.
- ☐ Ob. 2.
- ☐ Oc. 3.
- ☐ Od. 4.

Retroalimentación

Epígrafe control prenatal / Consultas prenatales.

La respuesta correcta es: 2.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una prueba de sobrecarga oral de glucosa:

Seleccione una:

- ☐ a. Se le indicará a la gestante una dieta previa restrictiva en hidratos de carbono, un ayuno de 8-14 horas y esperar 5 minutos desde la ingesta de la glucosa hasta la primera extracción sanguínea.
- ☐ b. Se le indicará a la gestante una dieta previa no restrictiva en hidratos de carbono, un ayuno de 8-14 horas y esperar 5 minutos desde la ingesta de la glucosa hasta la primera extracción sanguínea.
- ☐ c. Se le indicará a la gestante una dieta previa restrictiva en hidratos de carbono, un ayuno de 6-8 horas y esperar 15 minutos desde la ingesta de la glucosa hasta la primera extracción sanguínea.
- ☐ d. Se le indicará a la gestante una dieta previa restrictiva en hidratos de carbono, un ayuno de 6-8 horas y no esperar desde la ingesta de la glucosa hasta la primera extracción sanguínea.

Retroalimentación

Epígrafe Cribado de diabetes gestacional.

La respuesta correcta es: Se le indicará a la gestante una dieta previa no restrictiva en hidratos de carbono, un ayuno de 8-14 horas y esperar 5 minutos desde la ingesta de la glucosa hasta la primera extracción sanguínea.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Idealmente la primera consulta prenatal ha de realizarse antes de la semana:

Seleccione una:

- ☐ a. 4.
- ☐ b. 6.
- ☐ c. 10.
- ☐ d. 12.

Retroalimentación

Epígrafe control prenatal.

La respuesta correcta es: 10.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué trimestre se realiza urocultivo de control en la gestación?

Seleccione una:

- ☐ a. Primero.
- ☐ b. Segundo.
- ☐ c. Tercero.
- ☐ d. En todos los anteriores.

Retroalimentación

Epígrafe control prenatal.

La respuesta correcta es: Primero.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo en el embarazo?

Seleccione una:

- ☐ a. Edad materna de 18 años.
- ☐ b. IMC menor que 19,5.
- ☐ c. Riesgo laboral.
- ☐ d. Tabaquismo.

Retroalimentación

Epígrafe control prenatal / Consultas prenatales.

La respuesta correcta es: IMC menor que 19,5.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo puede comenzar a realizarse el control materno del movimiento fetal?

Seleccione una:

- ☐ a. Entre las semanas 16 y 20.
- ☐ b. Entre las semanas 20 y 26.
- ☐ c. Entre las semanas 24 y 30.
- ☐ d. Entre las semanas 26 y 32.

Retroalimentación

Epígrafe Métodos de evaluación del estado fetal durante el embarazo.

La respuesta correcta es: Entre las semanas 26 y 32.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un objetivo de la ecografía del primer trimestre?

Seleccione una:

- ☐ Oa. Estimación de la edad de gestación.
- ☐ Ob. Diagnóstico de anomalías estructurales y marcadores de cromosomopatías.
- ☐ Oc. Identificar la existencia de patología uterina y de los anejos.
- ☐ Od. Observación de la morfología embrionaria.

Retroalimentación

Epígrafe Exploración general y obstétrica / Exploración obstétrica con ultrasonido.

La respuesta correcta es: Diagnóstico de anomalías estructurales y marcadores de cromosomopatías.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la opción correcta sobre la asistencia prenatal:

Seleccione una:

- ☐ Oa. La historia clínica y la citología solo se realizarán en la primera consulta o durante el primer trimestre.
- ☐ Ob. La altura uterina se controlará en todas las consultas.
- ☐ Oc. Las maniobras de Leopold se realizarán desde el segundo trimestre.
- ☐ Od. Todas son falsas.

Retroalimentación

Epígrafe control prenatal.

La respuesta correcta es: Las maniobras de Leopold se realizarán desde el segundo trimestre.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un resultado de glucemias: basal = 115 mg/dl, a la hora = 192 mg/dl, a las 2 horas = 162 mg/dl y a las 3 horas = 112 mg/dl en una sobrecarga oral de glucosa de 100g significa que:

Seleccione una:

- ☐ Oa. Hay una diabetes gestacional.
- ☐ Ob. Hay una intolerancia a los hidratos de carbono, no es necesario repetir la prueba.

- ☐ Oc. Hay una intolerancia a los hidratos de carbono, es necesario repetir la prueba.
- ☐ Od. El resultado es normal.

Retroalimentación

Epígrafe Cribado de diabetes gestacional.

La respuesta correcta es: Hay una diabetes gestacional.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántas consultas prenatales han de realizarse para un buen control de la gestación?

Seleccione una:

- ☐ Oa. 3-5.
- ☐ Ob. 5-6.
- ☐ Oc. 6-9.
- ☐ Od. 7-10.

Retroalimentación

Epígrafe control prenatal / Consultas prenatales / Consultas prenatales sucesivas.

La respuesta correcta es: 7-10.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El método de cribado de defectos congénitos de elección incluye:

Seleccione una:

- ☐ Oa. Marcadores ecográficos y edad materna.
- ☐ Ob. La determinación de la PAPP-A y β -hCG y marcadores ecográficos.
- ☐ Oc. La determinación de la PAPP-A y la translucencia nual.
- ☐ Od. La translucencia nual y factores demográficos.

Retroalimentación


Epígrafe Cribado de defectos congénitos.

La respuesta correcta es: La determinación de la PAPP-A y β -hCG y marcadores ecográficos.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes no es una recomendación ante las hemorroides en la gestación?

Seleccione una:

- ☐ a. Usar compresas heladas.
- ☐ b. Usar compresas calientes.
- ☐ c. Usar en primer lugar pomadas anestésicas.
- ☐ d. Realizar baños de asiento.

Retroalimentación

Epígrafe Recomendaciones para aliviar las molestias comunes del embarazo.

La respuesta correcta es: Usar en primer lugar pomadas anestésicas.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes es un antecedente reproductivo considerado factor de riesgo?

Seleccione una:

- ☐ a. Diabetes mellitus.
- ☐ b. Tromboembolismo.
- ☐ c. a y b son correctas.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

Epígrafe control prenatal / Consultas prenatales.

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A una gestante Rh – con test de Coombs + se le administrará la gammaglobulina anti-D:

Seleccione una:

- ☐ a. En cuanto se obtenga el resultado del Coombs.
- ☐ b. En la semana 28 de gestación.
- ☐ c. Tras el parto.
- ☐ d. En ningún momento.

Retroalimentación

Epígrafe control prenatal / Consultas prenatales / Consultas prenatales sucesivas.

La respuesta correcta es: En ningún momento.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre la semana 37 y 40, ¿cuántas consultas semanales de control han de realizarse?

Seleccione una:

- ☐ a. 1.
- ☐ b. 1-2.
- ☐ c. 1-3.
- ☐ d. Si la gestación es de bajo riesgo, se hará 1 consulta bisemanal.

Retroalimentación

Epígrafe control prenatal / Consultas prenatales / Consultas prenatales sucesivas.

La respuesta correcta es: 1-2.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes determinaciones no se solicitan en la analítica del tercer trimestre?

Seleccione una:

- ☐ a. Hemograma.
- ☐ b. Coagulación.
- ☐ c. Coombs.
- ☐ d. Serología.

Retroalimentación

Epígrafe control prenatal.

La respuesta correcta es: Coombs.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El cribado de defectos congénitos ha de realizarse mediante el cribado combinado del primer trimestre antes de la semana:

Seleccione una:

- ☐ a. 12.
- ☐ b. 13.
- ☐ c. 14.

Od. 15.

Retroalimentación

Epígrafe Cribado de defectos congénitos.

La respuesta correcta es: 14.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué momento se debe realizar la ecografía del segundo trimestre según la SEGO?

Seleccione una:

- ☐ Oa. Entre la semana 16+0 y la 20+6.
- ☐ Ob. Entre la semana 17+0 y la 21+6.
- ☐ Oc. Entre la semana 18+0 y la 21+6.
- ☐ Od. Entre la semana 19+0 y la 20+6.

Retroalimentación

Epígrafe control prenatal.

La respuesta correcta es: Entre la semana 18+0 y la 21+6.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A partir de qué semana ha de realizarse el test basal en una gestación de bajo riesgo?

Seleccione una:

- ☐ Oa. 37.
- ☐ Ob. 38.
- ☐ Oc. 41.
- ☐ Od. 42.

Retroalimentación

Epígrafe control prenatal / Consultas prenatales / Consultas prenatales sucesivas.

La respuesta correcta es: 41.

[Finalizar revisión](#)