

Comenzado el	martes, 20 de julio de 2021, 17:04
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 20 de julio de 2021, 17:06
Tiempo empleado	1 minutos 40 segundos
Puntos	8,00/20,00
Calificación	4,00 de 10,00 (40%)
Comentario -	No Apto

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante el parto:

Seleccione una:

- ☐ Oa. La concentración de leucocitos disminuye.
- ☐ Ob. El fibrinógeno plasmático aumenta.
- ☐ Oc. El tiempo de coagulación aumenta.
- ☐ Od. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Adaptaciones materno-fetales durante el proceso de parto / Cambios fisiológicos en la mujer durante el parto.

La respuesta correcta es: El fibrinógeno plasmático aumenta.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué da inicio al periodo de alumbramiento?

Seleccione una:

- ☐ Oa. El final del periodo expulsivo.
- ☐ Ob. La expulsión de la placenta.
- ☐ Oc. La expulsión de las membranas ovulares.
- ☐ Od. b y c son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Asistencia a la mujer durante el proceso de parto / Periodo del alumbramiento.

La respuesta correcta es: El final del periodo expulsivo.

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la técnica recomendada para una episiotomía?

Seleccione una:

- ☐ a. La media.
- ☐ b. La mediolateral, comenzándola en el lateral del introito y dirigiéndola habitualmente hacia el lado izquierdo con un ángulo de 45-60°.
- ☐ c. La mediolateral, comenzándola en la comisura posterior del introito y dirigiéndola habitualmente hacia el lado derecho con un ángulo de 45-60°.
- ☐ d. La mediolateral, comenzándola en el lateral del introito y dirigiéndola hacia uno de los lados, dependiendo de si quien la practica es zurdo o diestro, en un ángulo de 30-40°.

Retroalimentación

Epígrafe Asistencia a la mujer durante el proceso de parto / Periodo expulsivo / Cuidados generales y específicos.

La respuesta correcta es: La mediolateral, comenzándola en la comisura posterior del introito y dirigiéndola habitualmente hacia el lado derecho con un ángulo de 45-60°.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un tacto vaginal, ¿con qué se realizará el lavado previo?

Seleccione una:

- ☐ a. Con agua corriente.
- ☐ b. Con SSF.
- ☐ c. Con clorhexidina.
- ☐ d. Con clorhexidina jabonosa.

Retroalimentación

Epígrafe Asistencia a la mujer durante el proceso de parto / Periodo de dilatación / Evidencia científica en revisiones sistemáticas de técnicas y procedimientos

La respuesta correcta es: Con agua corriente.

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En contacto piel con piel:

Seleccione una:

- ☐ a. Hay más probabilidad de amamantar.
- ☐ b. Se amamanta durante más tiempo.
- ☐ c. a y b son correctas.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

Epígrafe técnicas de apoyo en las diferentes etapas del parto / Evidencias científicas en revisiones sistemáticas.

La respuesta correcta es: a y b son correctas.

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La inmersión en agua durante el periodo de dilatación:

Seleccione una:

- ☐ a. Reduce el dolor.
- ☐ b. Reduce la petición de analgesia epidural/raquídea.
- ☐ c. No perjudica al bienestar fetal.
- ☐ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe técnicas de apoyo en las diferentes etapas del parto / Evidencias científicas en revisiones sistemáticas.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo está indicada la posición supina durante la dilatación?

Seleccione una:

- ☐ a. Ante la presencia de DIP I.
- ☐ b. Ante la presencia de DIP II.
- ☐ c. Ante amniorrexis con la cabeza fetal muy alta.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

Epígrafe Asistencia a la mujer durante el proceso de parto / Periodo de dilatación / Cuidados generales y específicos.

La respuesta correcta es: Ante amniorrexia con la cabeza fetal muy alta.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante el periodo de dilatación:

Seleccione una:

- ☐ a. Disminuye lentamente el pH fetal.
- ☐ b. Aumentan las bases.
- ☐ c. Aumenta la PCO₂.
- ☐ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Adaptaciones materno-fetales durante el proceso de parto / Reacción fetal al trabajo de parto.

La respuesta correcta es: Disminuye lentamente el pH fetal.

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante el parto, el sueño fetal:

Seleccione una:

- ☐ a. No tiene lugar.
- ☐ b. Dura unos 40 minutos y la FR fetal permanece invariable
- ☐ c. Disminuye la frecuencia cardiaca fetal.
- ☐ d. b y c son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Adaptaciones materno-fetales durante el proceso de parto / Reacción fetal al trabajo de parto.

La respuesta correcta es: Disminuye la frecuencia cardiaca fetal.

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El apoyo del trabajo de parto es más efectivo cuando es proporcionado por:

Seleccione una:

- ☐ a. TCAE.
- ☐ b. Personal facultativo.
- ☐ c. Personas ajenas al hospital.
- ☐ d. Matronas.

Retroalimentación

Epígrafe técnicas de apoyo en las diferentes etapas del parto.

La respuesta correcta es: Personas ajenas al hospital.

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la opción correcta sobre la auscultación intermitente:

Seleccione una:

- ☐ a. Se realiza, al menos, cada 30-40 minutos durante el período de dilatación.
- ☐ b. Se realiza, al menos, cada 1-5 minutos en el periodo expulsivo.
- ☐ c. Se llevará a cabo durante 10-20 segundos, como mínimo.
- ☐ d. Se realizará después de una contracción.

Retroalimentación

Epígrafe Asistencia a la mujer durante el proceso de parto / Periodo de dilatación / Evidencia científica en revisiones sistemáticas de técnicas y procedimientos

La respuesta correcta es: Se realizará después de una contracción.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la OMS, ¿qué porcentaje de episiotomías se considera óptimo?

Seleccione una:

- ☐ a. 0%.
- ☐ b. 10%.
- ☐ c. 20%.
- ☐ d. 30%.

Retroalimentación

Epígrafe Asistencia a la mujer durante el proceso de parto / Periodo expulsivo / Cuidados generales y específicos.

La respuesta correcta es: 10%.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la OMS, ¿cuál de las siguientes prácticas es claramente útil y ha de ser promovida?

Seleccione una:

- ☐ a. Para las mujeres con bajo riesgo, se recomienda la ingesta de líquidos y alimentos durante el trabajo de parto.
- ☐ b. Manipulación activa del feto en el momento del nacimiento.
- ☐ c. Exploración manual del útero después del alumbramiento.
- ☐ d. Todas son incorrectas.

Retroalimentación

Epígrafe Asistencia a la mujer durante el proceso de parto / Objetivos en el cuidado del parto eutócico.

La respuesta correcta es: Para las mujeres con bajo riesgo, se recomienda la ingesta de líquidos y alimentos durante el trabajo de parto.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El óxido nitroso ha de utilizarse:

Seleccione una:

- ☐ a. A una concentración del 100%
- ☐ b. Al 25% con oxígeno.
- ☐ c. Al 50% con oxígeno.
- ☐ d. Al 75% con oxígeno.

Retroalimentación

Epígrafe Asistencia a la mujer durante el proceso de parto / Periodo de dilatación.

La respuesta correcta es: Al 50% con oxígeno.

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué momento se diagnostica retardo de la dilatación?

Seleccione una:

- ☐a. En progresos de menos de 1cm de dilatación por hora.
- ☐b. En progreso de menos de 1cm de dilatación a las 2 horas de amniorrexis.
- ☐c. Ninguna es correcta.
- ☐d. a y b son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Asistencia a la mujer durante el proceso de parto / Periodo de dilatación / Cuidados generales y específicos.

La respuesta correcta es: En progreso de menos de 1cm de dilatación a las 2 horas de amniorrexis.

Pregunta 16

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cada cuánto ha de medirse la temperatura durante la dilatación?

Seleccione una:

- ☐a. Cada hora.
- ☐b. Cada 2 horas.
- ☐c. Cada 4 horas.
- ☐d. Al menos, una vez durante el trabajo de parto.

Retroalimentación

Epígrafe Asistencia a la mujer durante el proceso de parto / Periodo de dilatación.

La respuesta correcta es: Cada 4 horas.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En comparación con las suturas interrumpidas, la técnica de reparación del periné con suturas subcuticulares continuas se asocia a:

Seleccione una:

- ☐a. Mayor dispareunia.
- ☐b. Menor necesidad de nueva sutura.
- ☐c. Menos dolor hasta los diez días posteriores al parto.
- ☐d. Mayor necesidad de analgesia.

Retroalimentación

Epígrafe Asistencia a la mujer durante el proceso de parto / Periodo de alumbramiento / Evidencia científica en revisiones sistemáticas de técnicas y procedimientos.

La respuesta correcta es: Menos dolor hasta los diez días posteriores al parto.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La analgesia epidural administrada antes de los 3-4cm de dilatación cervical:

Seleccione una:

- ☐ a. Aumenta la necesidad del uso de oxitocina.
- ☐ b. Aumenta el riesgo de cesárea.
- ☐ c. Aumenta la duración del parto.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

Epígrafe Asistencia a la mujer durante el proceso de parto / Periodo de dilatación / Evidencia científica en revisiones sistemáticas de técnicas y procedimientos

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta.

Pregunta 19

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante la contracción existe un aumento de la presión venosa central, del volumen minuto, de la presión arterial y del volumen sistólico de eyección; sólo se producen cambios mínimos cuando la gestante está en decúbito lateral, ya que no existe compresión aorto-ilíaca por el útero durante la contracción. A esto se le conoce como:

Seleccione una:

- ☐ a. Efecto Pigmalión.
- ☐ b. Presión uterotónica.
- ☐ c. Efecto Poseiro.
- ☐ d. Compresión de eyección.

Retroalimentación

Epígrafe Adaptaciones materno-fetales durante el proceso de parto / Cambios fisiológicos en la mujer durante el parto.

La respuesta correcta es: Efecto Poseiro.

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la opción correcta sobre los tratamientos complementarios y alternativos para el manejo del dolor:

Seleccione una:

- ☐ a. La acupuntura y la hipnosis tienen suficiente aval científico y no es necesaria más investigación sobre sus efectos analgésicos durante el parto.
- ☐ b. El dolor en el parto se agrava si se acompaña de tensión, miedo y ansiedad.
- ☐ c. La efectividad de la aromaterapia durante el parto está suficientemente demostrada y no es necesaria más investigación al respecto.
- ☐ d. La hipnosis reduce significativamente el uso de epidural en el parto.

Retroalimentación

Epígrafe técnicas de apoyo en las diferentes etapas del parto / Evidencias científicas en revisiones sistemáticas.

La respuesta correcta es: El dolor en el parto se agrava si se acompaña de tensión, miedo y ansiedad.

[Finalizar revisión](#)

Ir a...

[Salta Navegación por el cuestionario](#)

Navegación por el cuestionario