

Cuidados de enfermería al paciente politraumatizado en urgencias y emergencias

Comenzado el domingo, 14 de noviembre de 2021, 17:26

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 14 de noviembre de 2021, 17:42

Tiempo empleado 15 minutos 27 segundos

Puntos 20,00/20,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué momento de la intervención sanitaria ante un politraumatismo, debe ser identificada y controlada una hemorragia exanguinante:

Seleccione una:

- a. En la valoración primaria.
- b. En la valoración secundaria.
- c. En la valoración terciaria.
- d. En la evacuación y transporte del accidentado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En la valoración primaria.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación con el uso de dispositivos de seguridad en vehículos de motor, la activación del airbag ¿Qué características tiene su uso en un accidente?

Seleccione una:

- a. Es muy efectivo en la primera colisión con impacto frontal
- b. Puede producir lesiones menores como úlcera corneal, abrasión en cara, cuello y tórax.
- c. absorbe con lentitud la energía al aumentar la distancia de frenado del cuerpo
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la desventaja del FAST?

Seleccione una:

- a. Costo y tiempo
- b. Poco sensible
- c. Distorsión por gases intestinales
- d. Requiere traslado para hacerlo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Distorsión por gases intestinales

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué estructuras anatómicas pertenecen al espacio retroperitoneal

Seleccione una:

- a. Aorta abdominal
- b. Cava inferior
- c. Intestino delgado
- d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que sospecha diagnostica encontrarías ante una lesión en la pelvis

Seleccione una:

- a. Pérdida grandes volúmenes de sangre (innumerables vasos).
- b. Equimosis o heridas abiertas en periné.
- c. Lesiones rectales y genitourinarias
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué % de casos pueden presentar fracturas costillas izquierdas inferiores asociadas con laceraciones de bazo?

Seleccione una:

- a. En el 20% de los casos
- b. En el 30 % de los casos
- c. En el 10% de los casos
- d. No hay un % definido

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el 20% de los casos

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

Que valoración radiológica encontrarías ante una lesión en el diafragma

Seleccione una:

- a. Elevación línea diafragma
- b. Burbuja gástrica
- c. SNG en posición anómala.
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

El control de la hemorragia se logra a través de la estabilización mecánica del anillo pélvico y la compresión externa. ¿Qué dispositivo puedes utilizar para la estabilización de la pelvis?

Seleccione una:

- a. Una sabana
- b. Un cinturón pélvico
- c. Colchón de vacío
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al realizar una radiografía de abdomen y se han encontrado unas lesiones retroperitoneales. ¿Qué hemos encontrado en la radiografía que nos lleva a dicha conclusión?

Seleccione una:

- a. Desplazamiento de la burbuja gástrica
- b. Aumento de densidad en hipocondrio izquierdo
- c. Borramiento de líneas del psoas
- d. Revela neumoperitoneo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Borramiento de líneas del psoas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las principales causas de muerte en un traumatismo abdominal

Seleccione una:

- a. Hemorragia

- b. Sepsis
- c. ninguna es correcta
- d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes epígrafes no es propio de la valoración secundaria de los enfermos politraumatizados?

Seleccione una:

- a. Valoración del cuello.
- b. Valoración de la pelvis.
- c. Valoración de las extremidades.
- d. Valoración de la ventilación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valoración de la ventilación

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las ventajas del FAST es que es repetible ¿Cuál es el tiempo recomendado en el ATLS para repetir el estudio?

Seleccione una:

- a. 30 minutos
- b. 1 hora
- c. 2 horas



d. No hace falta esperar para repetirlo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 30 minutos

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un impacto de arma de fuego que órgano suele con mayor frecuencia resultar dañados

Seleccione una:



a. intestino delgado



b. Colon



c. Hígado



d. Vasos abdominales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: intestino delgado

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las lesiones que produce el cinturón de seguridad el que produce equimosis en el ombligo se llama:

Seleccione una:



a. Signo de Cullen



b. Signo de Grey–Turner



c. a y b son correctas



d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Signo de Cullen

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Observación, palpación, auscultación, percusión son medidas que nos sirven para valora.

Seleccione una:

- a. Tórax
- b. Abdomen
- c. Vía aérea
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuales son las recomendaciones ante una evisceración:

Seleccione una:

- a. No se deben hacer intentos por colocar de nuevo el tejido en la cavidad abdominal
- b. Realizar una cobertura aséptica de la herida con material estéril humedecido con SSF templado
- c. Los apósitos húmedos pueden estar cubiertos con un venaje grande, seco u oclusivo para mantener al paciente con calor
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Tiene un paciente con sospecha de fractura en la base del cráneo y te ordenan que introduzcas una sonda gástrica. ¿Qué factores tendrás en cuenta a la hora de realizar esta técnica de enfermería?

Seleccione una:

- a. La sonda gástrica debe colocarse por la boca para evitar el paso de esta al encéfalo a través de la lámina cribosa.
- b. la sonda gástrica debe colocarse por la nariz para evitar el paso de esta al encéfalo a través de la lámina cribosa.
- c. Contraindicado introducir la sonda por la nariz con sospecha de fractura en la base del cráneo
- d. a y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y c son correctas

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Por definición, para que un enfermo sea considerado como un “politraumatismo”, debe cumplir ciertas características. ¿Cuál de los siguientes enunciados, no es una de ellas?

Seleccione una:

- a. Las lesiones tienen repercusiones respiratorias y/o circulatorias que lo colocan en una situación crítica.
- b. Presenta una o más lesiones óseas traumáticas mayores.
- c. Presenta una severa alteración del nivel de conciencia.
- d. Presenta afectación de una o más vísceras.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presenta una severa alteración del nivel de conciencia.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Menciona una desventaja del Lavado Peritoneal Diagnostico

Seleccione una:

- a. Toma mucho tiempo para realizarlo
- b. No detecta lesiones en el intestino
- c. Poco sensible
- d. Poco específico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Poco específico

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué consiste la denominada “valoración primaria” del paciente politraumatizado?

Seleccione una:

- a. En valorar si el enfermo está consciente, si respira y si tiene pulso.
- b. La valoración primaria solo incluye la inspección del escenario, a fin de determinar el número de víctimas y poder solicitar los recursos necesarios.
- c. En la valoración y tratamiento de las urgencias vitales.
- d. En el control por parte del personal no sanitario, del escenario del accidente, para que los sanitarios puedan comenzar su trabajo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En la valoración y tratamiento de las urgencias vitales.

