

Que valor de la PIC nos hace plantearnos hacer una fasciotomía urgente, cuando la clínica del paciente es dudosa?

Seleccione una:

- a. Mayor de 30 mmHg
- b. Menor de 30 mmHg
- c. Menor de 20 mmHg
- d. Ninguna de las respuestas es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mayor de 30 mmHg

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué casos no se debe realizar la fasciotomía?

Seleccione una:

- a. En los casos en el que el síndrome compartimental a evolucionado más de 10 horas
- b. Cuando la PIC es mayor de 30 mmHg y la clínica no está clara
- c. En los casos en el que el síndrome compartimental a evolucionado 5 horas
- d. b y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En los casos en el que el síndrome compartimental a evolucionado más de 10 horas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el uso de fasciotomía profiláctica solo está aconsejado en caso de patologías con un alto riesgo de desarrollo de SC como son:

Seleccione una:

- a. Fracturas complicadas de extremidades
- b. Traumatismos por aplastamiento
- c. Reimplante de extremidades
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Que signos nos pueden hacer sospechar de una insuficiencia renal aguda?

Seleccione una:

- a. Oliguria
- b. Diuresismenor que 400 ml/24 horas
- c. Anuria
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Complicaciones de una fasciotomía urgente

Seleccione una:

- a. Alteraciones neurovasculares
- b. Infección de la herida
- c. Sepsis



d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale síntomas y signos que acompañan al síndrome compartimental a nivel sistémico

Seleccione una:



a. Alcalosis respiratoria



b. Acidosis metabólica



c. Hipoxemia



d. a y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y c son correctas

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué casos se ha de valorar la realización de amputación del miembro?

Seleccione una:



a. Musculo necrotizado



b. Riesgo de sepsis



c. Sangrado, coagulopatía y el fallo renal agudo



d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los síntomas que se produce en el síndrome compartimental es la presión. ¿Qué valor se estima el aumento de la PIC de la zona afectada?

Seleccione una:

- a. Por encima de 30 mmHg (presión capilar).
- b. Por encima de 20 mmHg (presión capilar)
- c. Por encima de 10 mmHg (presión capilar)
- d. Ninguna de las anteriores es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por encima de 30 mmHg (presión capilar).

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación al mecanismo en el que el edema no tiene posibilidad de escape y ejerce un aumento de presión progresivo sobre el miembro. ¿Qué causas lo producen?

Seleccione una:

- a. Compresión por yeso
- b. Torniquete
- c. Quemadura con escara
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué estructuras tienen más facilidad de sufrir un síndrome compartimental

Seleccione una:

- a. Estructura fascial
- b. Estructura ósea
- c. Estructura visceral
- d. a y b son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas.

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica que causas producen que el edema se ve agravado por hemorragia y aumenta el contenido del compartimento (Señale la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. Fracturas con lesiones vasculares.
- b. Isquemia-reperfusión tras reparación de lesiones arteriales.
- c. Lesiones eléctricas
- d. Inmovilización prolongada en una postura forzada

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inmovilización prolongada en una postura forzada

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a la vigilancia de la zona afectada, tendremos en cuenta los siguientes factores: (Indique la afirmación incorrecta)

Seleccione una:

- a. Pulsos distales
- b. Sensibilidad del miembro
- c. Control del perímetro del miembro afectado
- d. Vigilar aparición de CID

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vigilar aparición de CID

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué tipo de sueroterapia evitarías en un SA por su contenido en potasio

Seleccione una:

- a. Suero glucosado 5%
- b. Suero fisiológico 0,9%
- c. Ringer lactato.
- d. Gelafundina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ringer lactato.

Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Tras un SC qué enzimas intracelulares del músculo y tejidos blandos se elevan?
(Señale la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. CPK
- b. Mioglobina
- c. LDH
- d. HDH

Retroalimentación

La respuesta correcta es: HDH

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la primera actuación ante un síndrome de aplastamiento?

Seleccione una:

- a. Eliminar la compresión muscular
- b. Rápida valoración ABCD al paciente
- c. Administrar sueroterapia
- d. Control de diuresis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rápida valoración ABCD al paciente

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles serían las pautas a seguir en la valoración del patrón respiratorio en SA:
(Indica la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. FR
- b. Mecánica respiratoria
- c. Uso de musculatura accesoria
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los cuidados de enfermería irán dirigidos principalmente a la valoración del miembro afectado:

Seleccione una:

- a. Valorar pulsos distales.
- b. Valorar coloración, temperatura y perímetro de la zona afectada.
- c. Valorar fuerza, movilidad y sensibilidad
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 18

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Que pronostico le darías a una persona que ha sufrido un aplastamiento intenso mayor a 8-10 horas?

Seleccione una:

- a. Grave
- b. Muy grave
- c. Leve
- d. Gangrena isquémica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gangrena isquémica

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un síndrome por aplastamiento, ¿Cuál es el valor de la CPK que nos podremos encontrar?

Seleccione una:

- a. menor que 10000
- b. mayor que 10000
- c. mayor que 5000
- d. mayor que 3000

Retroalimentación

La respuesta correcta es: mayor que 10000

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica los síntomas correctos en el síndrome compartimental

Seleccione una:

- a. Presión
- b. Dolor intenso
- c. Parálisis
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas