

## Test de Introducción

## PREGUNTA 1 DE 6

**La Valoración Geriátrica Integral (VGI):**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Según Rubenstein es el proceso diagnóstico multidimensional, usualmente interdisciplinario, dirigido a cuantificar los problemas y capacidades médicos, funcionales, psíquicos y sociales del mayor con el objeto de trazar un plan para el tratamiento y el seguimiento a largo plazo.

**B**

Nace de la necesidad de aplicar un sistema de valoración especial y útil en el paciente geriátrico.

**C**

Su uso implica seguir un patrón bio-psico-social-funcional que nos permite un análisis estructurado.

**D**

Todas son correctas.

## PREGUNTA 2 DE 6

**Son objetivos de la VGI todos menos:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Conocer la situación basal del paciente.

**B**

Proporcionar al paciente la ubicación en el nivel asistencial (médico y social) más adecuado a sus necesidades.

**C**

Evaluar la respuesta al tratamiento y planes de cuidados no realizando ajustes en función de dicha evolución.

**D**

Mejorar la exactitud diagnóstica, descubriendo problemas tratables no diagnosticados previamente.

## PREGUNTA 3 DE 6

**La VGI aporta los siguientes beneficios:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Aumento de la supervivencia y mejoría de la capacidad funcional, y mejoría del estado afectivo y cognitivo.

**B**

Menor uso de servicios domiciliarios.

**C**

Disminución de la tasa ingresos hospitalarios y de institucionalización en residencia tras los mismos y disminución del número de fármacos.

**D**

A) y C) son ciertas.

**PREGUNTA 4 DE 6****Cuál de estas afirmaciones no es un objetivo de la valoración geriátrica integral:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Mejorar la exactitud diagnóstica en base a un diagnóstico cuádruple (clínico, funcional, mental y social).

**B**

Descubrir problemas tratables no diagnosticados previamente.

**C**

Establecer un tratamiento cuádruple adecuado y racional a las necesidades del anciano.

**D**

Empeorar el estado funcional y cognitivo del paciente.

**PREGUNTA 5 DE 6****¿Qué dimensiones no explora la escala de Zarit?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Sufrimiento del cuidador.

**B**

Antecedentes familiares

**C**

Salud física y psíquica

**D**

Recursos económicos.

PREGUNTA 6 DE 6

**¿Qué supone un grado III de dependencia?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Apoyo al menos una vez al día o necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

**B**

Apoyo al menos varias veces al día para su autonomía personal.

**C**

Cuando por su pérdida total de autonomía precisa el apoyo continuo de otra persona.

**D**

No precisa apoyo para sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

Test de valoración cognitiva

PREGUNTA 1 DE 9

**En la definición de demencia que no es cierto:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Es un síndrome de inicio agudo.

**B**

Suele presentar trastornos de memoria, amnesia de fijación y de evocación, orientación en tiempo y espacio, confabulación y falsos reconocimientos.

**C**

Afecta a funciones cognitivas y la conducta social.

**D**

Es un síndrome de inicio insidioso.

PREGUNTA 2 DE 9

**Qué test de screening de demencias está indicado en atención primaria:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

MMSE

**B**

Test de Pfeifer

**C**

Test del reloj

**D**

Mini-Cog

## PREGUNTA 3 DE 9

**Cuál no es un objetivo de las terapias no farmacológicas en el tratamiento de las demencias:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Estimular y mantener las capacidades mentales, fortalecer las relaciones sociales.

**B**

Disminuir la autonomía personal, aportar seguridad y estimular la propia identidad y autoestima.

**C**

Minimizar el estrés y evitar las reacciones psicológicas anómalas.

**D**

Mejorar el sentimiento de salud y calidad de vida de paciente y familiares.

## PREGUNTA 4 DE 9

**Cuál es una característica del delirium:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Aparición insidiosa.

**B**

Paciente con completa atención y alerta.

**C**

Curso fluctuante.

**D**

No es tratable

## PREGUNTA 5 DE 9

**Cuál es el tipo de delirium más frecuente:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Mixto

**B**

Hiperactivo

**C**

Hipoactivo

**D**

De perjuicio

PREGUNTA 6 DE 9

**Cuál no es una estrategia preventiva del delirium:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Estimulación cognitiva.

**B**

Neurolépticos

**C**

Reducción del ruido.

**D**

Hidratación

PREGUNTA 7 DE 9

**¿Qué repercusiones puede tener el insomnio en el paciente anciano?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Disminución del equilibrio.

**B**

Tiempos de reacción acelerados.

**C**

Aumenta el nivel de alerta y atención.

**D**

Todas las anteriores.

PREGUNTA 8 DE 9

### ¿Cuándo puede diagnosticarse insomnio crónico?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

- A**  
La incapacidad de conciliar el sueño durante 1 vez a la semana durante 3 semanas.
- B**  
Si aparece mínimo 3 noches por semana, durante al menos 3 meses.
- C**  
La incapacidad de conciliar el sueño por un factor estresante.
- D**  
En ninguno de los casos anteriores.

PREGUNTA 9 DE 9

### Acerca del tratamiento del insomnio. Señale la correcta:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

- A**  
El tratamiento de elección es la terapia cognitivo conductual-TCC (no farmacológica).
- B**  
El tratamiento de elección es el uso de Benzodiazepinas.
- C**  
No existe un tratamiento eficaz para el insomnio.
- D**  
Ante la necesidad de uso de tratamiento farmacológico, se comenzará con dosis de inicio elevadas.

Test de valoración funcional

PREGUNTA 1 DE 15

### Para realizar una correcta valoración de la capacidad funcional de un paciente, no es necesario:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

- A**  
Hacer una anamnesis al paciente
- B**  
Utilizar el índice de Barthel
- C**

Utilizar la escala MNA

**D**

Conocer las necesidades ortoprotésicas que precisa el paciente para caminar

#### PREGUNTA 2 DE 15

**Para valorar como realiza un paciente las actividades básicas de la vida diaria , lo realizamos con:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Escala Tinneti

**B**

Escala MNA

**C**

Índice de Barthel

**D**

Escala de Lawton

#### PREGUNTA 3 DE 15

**Que no se valora en el Índice de Barthel:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Capacidad para comer solo

**B**

Capacidad para poder utilizar dinero

**C**

Capacidad para realizar transferencias independiente

**D**

Todas las anteriores

#### PREGUNTA 4 DE 15

**El índice de Lawton y Brody es un instrumento para evaluar:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Actividades instrumentales de la vida diaria

**B**

Actividades avanzadas de la vida diaria

**C**

Actividades básicas de la vida diaria

## PREGUNTA 5 DE 15

**El índice de Lawton y Brody consta de :**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

5 ítems

**B**

7 ítems

**C**

8 ítems

## PREGUNTA 6 DE 15

**Respecto a la puntuación del Índice de Lawton y Brody marcar la verdadera:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

La puntuación para hombres y mujeres es la misma

**B**

En varones una puntuación de 5 significa dependencia total para las AIVD

**C**

En mujeres una puntuación de 8 significa independencia para todas las AIVD

## PREGUNTA 7 DE 15

**Cual de las siguientes es correcta, respecto al SPPB**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Es una prueba basada en la información que aporta el paciente o familiar

**B**

Es una prueba que sirve para predecir deterioro cognitivo

**C**

Es una prueba difícil de realizar y solo se utiliza en consultas especializadas de Geriátrica.



**D**

Es una prueba que ayuda a detectar fragilidad y predecir discapacidad.

## PREGUNTA 8 DE 15

**De cuantas pruebas o subtest consta el SPPB**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

2

**B**

3

**C**

4

**D**

5

## PREGUNTA 9 DE 15

**Cual de las siguientes pruebas, no forma parte del SPPB**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Equilibrio

**B**

Velocidad de la marcha en 4 metros

**C**

Velocidad de la marcha en 3 metros

**D**

Levantar y sentarse de una silla

## PREGUNTA 10 DE 15

**El siguiente valor de Velocidad de la marcha, indica riesgo de caídas.**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

1,3 a 1,1 m/s

**B**

0,9 a 1 m/s

**C**

0,8 a 1 m/s

**D**

< 0.8 m/s

#### PREGUNTA 11 DE 15

**Para realizar el test de la Velocidad de la marcha, se necesita todo lo siguiente, excepto:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Cronómetro

**B**

Espacio de 4 a 10 metros

**C**

Silla

#### PREGUNTA 12 DE 15

**En el Test Up and Go que valor, es marcador de fragilidad**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

8-10 seg

**B**

10-20 seg

**C**

> 20 seg

#### PREGUNTA 13 DE 15

**El ejercicio físico se define como:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Actividad física irregular realizada esporádicamente con el objetivo de mantener una buena aptitud física.

**B**

Actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física.

**C**

Cualquier actividad que incluya el movimiento corporal

#### PREGUNTA 14 DE 15

**Este programa de ejercicios son los que mayor evidencia han demostrado en retrasar la discapacidad y otros eventos adversos en ancianos.**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Ejercicios de resistencia cardiovascular

**B**

Ejercicios de equilibrio

**C**

Ejercicios multicomponentes

**D**

Tai chi

#### PREGUNTA 15 DE 15

**Para que un programa de ejercicios multicomponente sea eficaz en ancianos frágiles, se recomienda que se realicen al menos por un periodo entre:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

12-16 semanas

**B**

6-8 semanas

**C**

8-10 semanas

**D**

2 -4 semanas

Test de la valoración de la fragilidad

## PREGUNTA 1 DE 3

**¿Qué factores se encuentran relacionados con la fragilidad en el paciente anciano?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Sarcopenia

**B**

Disfunción endocrina

**C**

Disfunción inmune

**D**

Todas las anteriores

## PREGUNTA 2 DE 3

**¿Qué es la capacidad intrínseca?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Es un estado clínico de disminución de la reserva y la resistencia a estresores, dando como resultado un acúmulo de fallos de múltiples sistemas fisiológicos y causando un incremento de la vulnerabilidad a padecer complicaciones adversas

**B**

Es la capacidad de que conservar su independencia de manera precaria y correr un alto riesgo de convertirse en dependientes

**C**

El conjunto de las capacidades físicas y mentales de un individuo, está marcada por una serie de condicionantes

**D**

Todas las anteriores

## PREGUNTA 3 DE 3

**¿Cuál de estos no es un criterio Fried de FRAGILIDAD?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Pérdida de peso involuntaria de más de 10 kilogramos

**B**

Sentimiento de agotamiento generalizado

**C**

Velocidad lenta al caminar

**D**

Todas las anteriores

Tes de valoración Nutricional

#### PREGUNTA 1 DE 9

**Acude a la consulta un paciente para valoración nutricional. Pesa 70 kilos y mide 183 cm. ¿Que IMC tiene?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Delgadez extrema

**B**

Peso normal

**C**

2,09, peso premalnutrición

**D**

12,09 peso óptimo

#### PREGUNTA 2 DE 9

**El método de cribado nutricional, se denomina:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

MNA

**B**

I.Barthel

**C**

Nutritional Scan Cover

**D**

Todos ellos son correctos

#### PREGUNTA 3 DE 9

**Un MNA cuyo resultado arroja un total de 16 puntos, nos indica que:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

El paciente se encuentra en riesgo de desnutrición

**B**

No es necesario realizar una intervención nutricional

**C**

No es necesario controlar el peso del paciente

**D**

Ninguna de las anteriores es correcta

#### PREGUNTA 4 DE 9

##### ¿Qué tipo de disfagias existen?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

La disfagia orofaríngea

**B**

La disfagia esofágica

**C**

a y b son respuestas correctas

**D**

Ninguna de las respuestas son correctas.

#### PREGUNTA 5 DE 9

##### ¿Cual de las siguientes puede ser una complicación de presentar disfagia?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Malnutrición y deshidratación

**B**

Broncoaspiración

**C**

Dependencia funcional

**D**

Todas las anteriores

#### PREGUNTA 6 DE 9

**La terapia rehabilitadora en el tratamiento de la disfagia que consiste en la realización de ejercicios bucofaciales sin faliimiento en la boca se denomina:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Terapia directa

**B**

Terapia indirecta

**C**

Terapia inclusiva transbucofaringea

**D**

Rehabilitación motora sensorio-alimentaria

PREGUNTA 7 DE 9

**Seleccione las posibles causas de estreñimiento:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Inmovilidad.

**B**

Deshidratación.

**C**

Sobreuso de laxantes.

**D**

Todas las anteriores.

PREGUNTA 8 DE 9

**Sobre la escala de Bristol, seleccione la asociación correcta:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Tipo 1: estreñimiento. Heces duras.

**B**

Sirve para clasificar las deposiciones según su consistencia.

**C**

Tipo 7: estreñimiento. Heces duras.

**D**

Las respuestas a y b son correctas.

PREGUNTA 9 DE 9

**Respecto al tipo de laxantes y enemas, señale la correcta:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Los hay osmóticos, formadores de volumen, lubricantes y purgantes.

**B**

Se recomienda su uso prolongado y crónico.

**C**

Entre los tipos de enema, se aconseja el jabonoso como el de elección.

**D**

Los laxantes no tienen efectos secundarios.

Test de Enfermedades

**PREGUNTA 1 DE 6****¿Cuál de los siguientes se produce por falta de dopamina?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Rigidez.

**B**

Bradicinesia.

**C**

Inestabilidad postural.

**D**

Todas las anteriores.

**PREGUNTA 2 DE 6****Seleccione la aseveración falsa sobre la enfermedad de Parkinson:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

El freezing o congelación parkinsoniana se trata de la incapacidad o lentitud para iniciar la marcha por un obstáculo real o percibido.

**B**

La etiología de la enfermedad de Parkinson es desconocida, aunque podría estar influida por factores genéticos, ambientales y el envejecimiento.

**C**

Se trata de una enfermedad con síntomas únicamente motores.

**D**



Todas las respuestas son falsas.

### PREGUNTA 3 DE 6

**Señale la correcta:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que reduce la calidad de vida y aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad.

**B**

La buena respuesta a la levodopa es uno de sus criterios diagnósticos.

**C**

Existen opciones terapéuticas no farmacológicas, farmacológicas y quirúrgicas.

**D**

Todas las anteriores son correctas.

### PREGUNTA 4 DE 6

**¿Cuál de éstos no pertenece al tercer escalón analgésico?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Fentanilo.

**B**

Morfina.

**C**

Codeína.

**D**

Oxicodona.

### PREGUNTA 5 DE 6

**¿En qué situaciones debe iniciarse, si está indicada, la analgesia de tercer escalón con dosis menores de lo habitual?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Desnutrición severa.

**B**

Situación de agonía.

**C**

Insuficiencia respiratoria.

**D**

Todas las anteriores.

## PREGUNTA 6 DE 6

**Seleccione la opción correcta:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Tratamiento del dolor con morfina y tramadol combinados.

**B**

Tratamiento del dolor con morfina y paracetamol combinados.

**C**

Tratamiento del dolor con morfina y fentanilo combinados.

**D**

Iniciar tratamiento analgésico con altas dosis durante un tiempo prolongado.

Test de cuidados en el anciano

## PREGUNTA 1 DE 8

**¿ Qué movimientos llevan a cabo las articulaciones metacarpofalángicas?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Flexión (lumbricales)

**B**

Extensión (extensor común de los dedos, extensor propio del segundo y quinto dedo)

**C**

Aducción (interóseos palmares)

**D**

Todas las anteriores

## PREGUNTA 2 DE 8

**¿ Cual de las siguientes es una secuela de un ACVA?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Mano pléjica

**B**

Tetraplejía

**C**

Heterocromatopsia

**D**

Acatisia

### PREGUNTA 3 DE 8

#### ¿Qué es el Shaping?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Consistente en dividir cada actividad de la vida cotidiana en los movimientos particulares que la conforman y que comienza con movimientos simples reforzando positivamente cada mejora, está siendo muy efectivo y complementario a los ejercicios tradicionales

**B**

Ninguna de las anteriores

**C**

Requiere férula en la columna cervical

### PREGUNTA 4 DE 8

#### ¿Cuál es el área cerebral afecta en la afasia motora?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

El área de Wernicke

**B**

Área de Broca

**C**

Area frontal

**D**

Séptimo segmento área occipital

### PREGUNTA 5 DE 8

**¿ Cual de estas escalas de valoración no es la adecuada para valorar los recursos sociales de un paciente anciano?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Test de Barthel

**B**

Test Washington

**C**

Test de Guipuzcoa

**D**

Ninguna de las anteriores

PREGUNTA 6 DE 8

**¿ Cuales de estas características pertenecen al perfil de cuidador informal?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Varón

**B**

Sin parentesco familiar con el anciano al que cuidan

**C**

Empleo público altamente retribuido

**D**

Tendencia a la sobrecarga del cuidador

PREGUNTA 7 DE 8

**¿ Cual de estas escalas mide la sobrecarga del cuidador?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Test de Zarit

**B**

Test de Gronhol

**C**

Respuestas a y b correctas

**D**

Ninguna de las anteriores

PREGUNTA 8 DE 8

**¿Cuál de ellos no es un ítem de la escala de Zarit?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

¿Siente temor por el futuro que le espera a su familiar?

**B**

Cree que su familiar espera que usted le cuide, como si fuera la única persona con la que puede contar?

**C**

¿Siente que en ocasiones querría autolesionarse por venoclisis?

**D**

¿Siente que ha perdido el control sobre su vida desde que la enfermedad de su familiar se manifestó?

Test valoración afectiva

PREGUNTA 1 DE 7

**Respecto a la depresión en el paciente anciano, marque la verdadera:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

La depresión es una patología poco frecuente en el paciente anciano

**B**

La depresión es una patología de reciente descubrimiento en el paciente anciano

**C**

Es un síndrome psiquiátrico frecuente en el paciente anciano

**D**

Las respuestas b y c son correctas

PREGUNTA 2 DE 7

**¿Qué se corresponde con la clínica típica de la depresión en el anciano?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Anhedonia

**B**

Ecolalia

**C**

Sapopenia

**D**

Nistagmus

## PREGUNTA 3 DE 7

**¿ Cual de estas escalas no mide la depresión en el anciano?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Escala de Yesavage

**B**

Escala de Goldberg

**C**

Escala de Beck

**D**

Escala de OARS

## PREGUNTA 4 DE 7

**Con respecto al tratamiento de la depresión en paciente anciano, es incorrecto:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

con el fin de no empeorar posibles síntomas cognitivos, se deberán utilizar antidepresivos sin efectos anticolinérgicos ni sedantes

**B**

Iniciar el tratamiento con el doble de dosis que en adultos

**C**

evaluar posibles interacciones con otros fármacos que el enfermo reciba

**D**

no olvidar la cardiotoxicidad de algunos antidepresivos, sobre todo los del grupo heterocíclico

## PREGUNTA 5 DE 7

**Cual es el tratamiento farmacológico de primera elección en la ansiedad:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Las benzodiacepinas

**B**

Los ISRS y ISRN

**C**

Los neurolépticos

PREGUNTA 6 DE 7

**Qué anciano sufrirá más probablemente un trastorno de ansiedad:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

77 años, mujer, soltera, institucionalizada, sin estudios, discapacidad física.

**B**

84 años, mujer, maestra jubilada, reside en su domicilio, independiente para las actividades básicas.

**C**

90 años, varón, viudo, vive con sus hijos, le gusta leer, trabaja en su huerto.

PREGUNTA 7 DE 7

**Las recientes terapias de tercera generación o terapias contextuales, o de modificación de conducta, intentan modificar la conducta a la vez que trabajan aspectos como la relación del paciente con el problema y el contexto en que vive, para afrontar y disminuir la ansiedad. ¿de todas ellas, cual es la más estudiada en los ancianos?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)

**B**

La Terapia Dialéctico Conductual (TDC3)

La terapia basada en la Atención plena (mindfulness)

Test de dificultades terapéuticas

PREGUNTA 1 DE 3

**¿Cuáles de las siguientes recomendaciones son ciertas?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Al prescribir nuevos fármacos no es necesario considerar el tratamiento previo, evaluar interacciones y el grado de adherencia al cumplimiento.

**B**

No usar benzodiacepinas para el tratamiento del insomnio, la agitación o el delirio en personas de edad avanzada.

**C**

En pacientes con enfermedad de Parkinson está permitido usar fármacos con potenciales efectos secundarios extrapiramidales.

**D**

En los pacientes diabéticos es necesario aplicar medidas terapéuticas intensivas independientemente de que sean pacientes con multimorbilidad, frágiles, dependientes y con una expectativa de vida

### PREGUNTA 2 DE 3

**¿Cuáles de los siguientes fármacos pueden ocasionar mayor riesgo de caídas?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Losartan

**B**

Lorazepam

**C**

Tramadol

**D**

Omeprazol

### PREGUNTA 3 DE 3

**Cual de estos criterios son implícitos:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

MAI

**B**

STOPP/START

**C**

Beers

**D**

STOPPFrail