

## **SOPORTE VITAL AVANZADO PEDIATRICO Y NEONATAL**

### **EVALUACION PREVIA**

#### **PREGUNTA 1 DE 10**

**SEGÚN EL ORDEN DE ACTUACIÓN LOS SIGUIENTES PASOS DE LA RCP BÁSICA DEL NIÑO, ¿CUÁL SERÍA EL TERCER PASO?**

**A**

abrir vía aérea

#### **PREGUNTA 2 DE 10**

**LA SECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN MASAJE CARDIACO-VENTILACIÓN EN EL LACTANTE, CUANDO SE REALIZA POR PERSONAL SANITARIO, ES**

**B**

15//2

#### **PREGUNTA 3 DE 10**

**DURANTE LAS COMPRESIONES TORÁCICAS, LAS MANOS SE DEBEN DE COLOCAR:**

**B**

En la mitad inferior del esternón (“centro del pecho”)

#### **PREGUNTA 4 DE 10**

**SOBRE LAS CÁNULAS OROFARINGEAS SEÑALE LA INCORRECTA**

**C**

Su forma de colocación es igual para lactantes y niños

#### **PREGUNTA 5 DE 10**

**NOS AVISAN DE URGENCIAS POR UN NIÑO EN PCR, AL LLEGAR OBSERVAMOS UN RITMO ANCHO IRREGULAR SIN PULSO, ¿CUAL SERÍA LA ACTITUD MÁS CORRECTA?**

**C**

Desfibrilar a 4 j / Kg seguido de masaje cardíaco

#### **PREGUNTA 6 DE 10**

**CUAL DE ESTOS NO ES UN OBJETIVO DENTRO DE LA ESTABILIZACIÓN POSTREANIMACION**

**C**

Intentar mantener una glucemia alta y un nivel de sodio bajo

PREGUNTA 7 DE 10

**EN LA COMUNICACIÓN DURANTE LA RCP, SEÑALE LA FALSA:**

**C**

La información debe transmitirse con gran volumen, para asegurar la recepción del mensaje

PREGUNTA 8 DE 10

**NOS AVISAN A PARITORIO POR UN RECIÉN NACIDO DE UN MINUTO DE VIDA CON ANTECEDENTE DE CIRCULAR APRETADA DE CORDÓN, A NUESTRA LLEGADA LA MATRONA ESTÁ VENTILANDO PERO EL PACIENTE NO MOVILIZA TORAX Y LA FRECUENCIA CARDÍACA ES DE 60. ¿CUÁL SERÍA TU ACTITUD?**

**B**

Aspirar secreciones, recolocar vía aérea e intentar ventilar

PREGUNTA 9 DE 10

**EN RELACIÓN A LA REANIMACIÓN EN NEONATOS PREMATUROS SEÑALA LA AFIRMACIÓN CORRECTA**

**C**

Es importante realizar un "soporte de transición adecuado" minimizando las actitudes invasivas

PREGUNTA 10 DE 10

**RECIÉN NACIDO A TERMINO DE 3 KG, CON UN DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA. LO HEMOS INTUBADO Y LE ESTAMOS REALIZANDO MASAJE CARDIACO, SIGUE CON UNA FRECUENCIA CARDIACA MENOR DE 60 PPM, QUE DOSIS DE ADRENALINA LE ADMINISTRARÍAS POR VÍA INTRATRAQUEAL**

**B**

0.3 ml de Adrenalina 1/1000

**SOPORTE VITAL BASICO PEDIATRICO**

PREGUNTA 1 DE 25

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES SOBRE LAS COMPRESIONES TORÁCIAS ES CIERTA?**

**B**

Minimizar las interrupciones en las compresiones torácicas para asegurar que éstas suponen, al menos, el 60% del tiempo total de la RCP

PREGUNTA 2 DE 25

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SOBRE LA ASISTENCIA CIRCULATORIA EN EL SVB ES CIERTA?**

**D**

Todas las anteriores son ciertas

PREGUNTA 3 DE 25

**¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES SIGNOS NO ES CARACTERÍSTICO DE UNA OBSTRUCCIÓN SEVERA POR CUERPO EXTRAÑO?**

**C**

Habla conservada

PREGUNTA 4 DE 25

**¿QUÉ MANIOBRA DE LAS SIGUIENTES SE RECOMIENDA PARA ABRIR LA VÍA AÉREA DURANTE UN SVB EN AUSENCIA DE SOSPECHA DE LESIÓN CERVICAL?**

**D**

Maniobra frente-mentón

PREGUNTA 5 DE 25

**ANTE UNA VÍCTIMA INCONSCIENTE CON UNA RESPIRACIÓN NORMAL DEBEMOS:**

**C**

Colocar al paciente en la posición de seguridad reevaluando continuamente al paciente para comprobar que no deteriora su situación

PREGUNTA 6 DE 25

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES SOBRE LAS COMPRESIONES TORÁCIAS ES CIERTA?**

**D**

Todas las anteriores son ciertas

PREGUNTA 7 DE 25

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CIERTA PARA ABRIR LA VÍA AÉREA DURANTE UN SVB DE UNA VÍCTIMA EN CASO DE SOSPECHA DE LESIÓN CERVICAL?**

**D Todas son correctas**

PREGUNTA 8 DE 25

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CIERTA?**

**B**

La mayoría de los reanimadores consideran su intervención durante el SVB como una experiencia positiva

PREGUNTA 9 DE 25

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES SOBRE LAS RESPIRACIONES DE RESCATE EN EL SVB ES FALSA?**

**A**

Con cada insuflación proporcionar cuanto más volumen mejor, empleando respiraciones rápidas y enérgicas

PREGUNTA 10 DE 25

**¿CUÁNDO SE PUEDE INTERRUMPIR LA RCP DURANTE UN SVB?**

**D**

Todas las anteriores son ciertas

PREGUNTA 11 DE 25

**DURANTE EL SVB, ANTE UNA VÍCTIMA CON SOSPECHA DE PARADA CARDIACA, PERO QUE SE ENCUENTRA CONSCIENTE DEBEMOS:**

**C**

Dejar a la víctima en la misma posición en la que la encontramos, tratando de evitar que se produzcan más daños

PREGUNTA 12 DE 25

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES RESPECTO A LAS RESPIRACIONES AGÓNICAS O GASPING ES CIERTA?**

**C**

El gasping es un signo de parada cardiaca de vital importancia, y su presencia debe de alentar a los testigos a iniciar las maniobras de RCP sin demora

PREGUNTA 13 DE 25

**¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS NO FORMA PARTE DE LA CADENA DE SUPERVIVENCIA?**

**B**

Intubación orotraqueal precoz del paciente en parada cardiaca

PREGUNTA 14 DE 25

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES SOBRE LA PROFUNDIDAD DE LAS COMPRESIONES TORÁCIAS ES CIERTA?**

**B**

Debe ser siempre superior a los 5 cm e inferior a los 6 cm

PREGUNTA 15 DE 25

**DURANTE LAS COMPRESIONES TORÁCIAS, LAS MANOS SE DEBEN DE COLOCAR:**

**B**

En la mitad inferior del esternón (“centro del pecho”)

PREGUNTA 16 DE 25

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CIERTA?**

**D**

Todas las anteriores son ciertas

PREGUNTA 17 DE 25

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CIERTA EN UN PACIENTE CON OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA E INCONSCIENTE?**

**B**

Se deben de iniciar las compresiones torácicas incluso aunque se palpe pulso en la víctima

PREGUNTA 18 DE 25

**¿CUÁL ES LA RELACIÓN RECOMENDADA ENTRE LAS COMPRESIONES Y LAS VENTILACIONES DE RESCATE?**

**A**

30:2

PREGUNTA 19 DE 25

**¿CON QUÉ MANIOBRA DE LAS SIGUIENTES DEBEMOS INICIAR LA RCP EN UNA VÍCTIMA INCONSCIENTE QUE NO RESPIRA?**

**B**

Iniciar siempre el SVB con las compresiones torácicas

PREGUNTA 20 DE 25

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES EN RELACIÓN AL SVB ES FALSA?**

**B**

En una parada cardíaca presenciada se deben de iniciar siempre las maniobras de RCP con las ventilaciones de rescate

PREGUNTA 21 DE 25

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES SOBRE LA FRECUENCIA DE LAS COMPRESIONES TORÁCIAS ES CIERTA?**

**D**

Todas las anteriores son ciertas

PREGUNTA 22 DE 25

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES TÉCNICAS DE RCP NO ES VÁLIDA?**

**C**

RCP sólo con ventilaciones de rescate con una frecuencia de 10-12/min

PREGUNTA 23 DE 25

**¿QUÉ DEBEMOS HACER EN CASO DE QUE UNA VÍCTIMA PRESENTE SIGNOS DE OBSTRUCCIÓN LEVE DE LA VÍA AÉREA?**

**A**

Animar a la víctima a que siga tosiendo

PREGUNTA 24 DE 25

**¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES MANIOBRAS HAN DEMOSTRADO SER EFECTIVAS EN VÍCTIMAS CON SIGNOS DE OBSTRUCCIÓN SEVERA DE LA VÍA AÉREA?**

**D**

Todas las anteriores son ciertas

PREGUNTA 25 DE 25

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES SOBRE LAS COMPRESIONES TORÁCIAS ES CIERTA?**

**B**

Minimizar las interrupciones en las compresiones torácicas para asegurar que éstas suponen, al menos, el 60% del tiempo total de la RCP

## **SOPORTE VITAL AVANZADO**

PREGUNTA 1 DE 14

**LA ARRITMIA MÁS FRECUENTE EN LA PARADA CARDIORRESPIRATORIA EN LA INFANCIA ES:**

**C**

La asistolia

PREGUNTA 2 DE 14

**CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA SIN PULSO ES CIERTO QUE**

**D**

Las respuestas b y c son correctas

PREGUNTA 3 DE 14

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SOBRE LOS DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS ES FALSA?**

**B**

En los DEAs se puede programar la dosis de descarga

PREGUNTA 4 DE 14

**EN RELACIÓN A LAS COMPLICACIONES DE LA REANIMACIÓN ES CIERTO QUE:**

**C**

Las sobredosificaciones de fármacos pueden ocurrir

PREGUNTA 5 DE 14

**EN RELACIÓN AL USO DEL CAPNÓGRAFO DURANTE LA REANIMACIÓN SEÑALE LA AFIRMACION CORRECTA**

PREGUNTA 6 DE 14

**SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA EN RELACIÓN A LA PRESENCIA DE UN BUEN LIDERAZGO EN LA REANIMACIÓN**

**D**

Todas las anteriores son correctas

PREGUNTA 7 DE 14

**SOBRE LAS CÁNULAS OROFARINGEAS SEÑALE LA INCORRECTA**

**C**

Su forma de colocación es igual para lactantes y niños

PREGUNTA 8 DE 14

**CUAL DE ESTAS CARACTERÍSTICAS DEBE CUMPLIR UNA MASCARILLA FACIAL**

**B**

Acople adecuado de boca y nariz

PREGUNTA 9 DE 14

**EN RELACION A LA MASCARILLA LARÍNGEA SEÑALE LA RESPUESTA FALSA**

PREGUNTA 10 DE 14

**SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA EN RELACIÓN A LA TÉCNICA DE INTUBACIÓN**

**C**

La posición adecuada en el lactante es la hiperextensión cervical máxima

PREGUNTA 11 DE 14

**QUÉ VÍA PUEDE UTILIZARSE PARA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS DURANTE LA RCP EN NIÑOS?**

PREGUNTA 12 DE 14

**CON RESPECTO A LA VÍA INTRAÓSEA, ES CIERTO**

**B**

Debe canalizarse cuando no se logra una vía venosa periférica en 60 segundos

PREGUNTA 14 DE 14

**EN RELACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE CRISTALOIDES EN LA PCR CUAL ES LA DOSIS RECOMENDADA**

B

**TERAPIA ELECTRICA**

PREGUNTA 1 DE 2

**NOS AVISAN DE URGENCIAS POR UN NIÑO EN PCR, AL LLEGAR OBSERVAMOS UN RITMO ANCHO IRREGULAR SIN PULSO, ¿CUAL SERÍA LA ACTITUD MÁS CORRECTA?**

**C**

Desfibrilar a 4 j / Kg seguido de masaje cardíaco

PREGUNTA 2 DE 2

**PACIENTE DE 11 AÑOS Y 40 KG CON FIBRILACIÓN VENTRICULAR, QUE NO HA REMITIDO TRAS TRES DESFIBRILACIONES A 160 JOULS, QUE ACTITUD LE PARECE MÁS CORRECTA**

**D**

Administrar Adrenalina, Amiodarona y seguir compresiones

SOPORTE VITAL AVANZADO NEONATAL

PREGUNTA 1 DE 8

**LA VALORACIÓN DE LA NECESIDAD DE APLICAR REANIMACIÓN A UN RECIÉN NACIDO EN PARITORIOS LA HACEMOS**

**D**

Valorando la respiración, frecuencia cardíaca y color durante la estabilización

PREGUNTA 2 DE 8

**EN LA REANIMACIÓN DEL RECIÉN NACIDO VENTILAREMOS CON BOLSA Y MASCARILLA, ¿CUÁL ES FALSA?**

**C**

cuando el niño llore vigorosamente

PREGUNTA 3 DE 8

**NOS AVISAN A PARITORIO POR UN RECIÉN NACIDO DE UN MINUTO DE VIDA CON ANTECEDENTE DE CIRCULAR APRETADA DE CORDÓN, A NUESTRA LLEGADA LA MATRONA ESTÁ VENTILANDO PERO EL PACIENTE NO MOVILIZA TORAX Y LA FRECUENCIA CARDÍACA ES DE 60. ¿CUÁL SERÍA TU ACTITUD?**

**B**

Aspirar secreciones, recolocar vía aérea e intentar ventilar

PREGUNTA 4 DE 8

**NACE UN RECIÉN NACIDO CON LÍQUIDO LIGERAMENTE TEÑIDO DE MECONIO, CON LLANTO ENÉRGICO, BUENA COLORACIÓN Y FRECUENCIA CARDIACA DE 120 LPM. ¿QUÉ MANIOBRA DEBEMOS HACER?**

**D**

Secar y observar

PREGUNTA 5 DE 8

**EN RELACIÓN A LA REANIMACIÓN EN NEONATOS PREMATUROS SEÑALA LA AFIRMACIÓN CORRECTA**

PREGUNTA 6 DE 8

**CUAL DE ÉSTOS SUPUESTOS NO SERÍA UNA INDICACIÓN DE NO REANIMACIÓN**

**C**

Cardiopatía congénita severa

PREGUNTA 7 DE 8

**RECIÉN NACIDO A TERMINO DE 3 KG, CON UN DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA. LO HEMOS INTUBADO Y LE ESTAMOS REALIZANDO MASAJE CARDIACO, SIGUE CON UNA FRECUENCIA CARDIACA MENOR DE 60 PPM, QUE DOSIS DE ADRENALINA LE ADMINISTRARÍAS POR VÍA INTRATRAQUEAL**

**B**

0.3 ml de Adrenalina 1/1000

PREGUNTA 8 DE 8

**EN EL PACIENTE ANTERIOR, SI NO RECUPERA PULSO NI LATIDO Y LE QUEREMOS ADMINISTRAR VOLUMEN, ¿QUÉ VÍA CANALIZAREMOS PRIORITARIAMENTE?**

**C**

Vena umbilical

**GESTION DE EQUIPOS DE RCP**

PREGUNTA 1 DE 10

**LA ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RESUCITACIÓN DEPENDERÁ DE... SEÑALE LA FALSA:**

PREGUNTA 2 DE 10

**RESPECTO AL DIRECTOR DE LA RCP, SEÑALE LA RESPUESTA FALSA:**

**B**

PREGUNTA 3 DE 10

**CUÁL NO ES UN MIEMBRO HABITUAL DEL EQUIPO DE RESUCITACIÓN:**

**C**

El que recaba información sobre el paciente, del historial o de sus familiares.

PREGUNTA 4 DE 10

**EN LA COMUNICACIÓN DURANTE LA RCP, SEÑALE LA FALSA:**

PREGUNTA 5 DE 10

**RESPECTO A LA COMUNICACIÓN DEL DIRECTOR DE LA RCP CON EL EQUIPO, SEÑALE LA RESPUESTA FALSA:**

**A**

Debe resaltar claramente si ha habido algún error durante la RCP, para que no vuelva a cometerse

PREGUNTA 6 DE 10

**RESPECTO A LA FORMACIÓN DE COMITÉS HOSPITALARIOS O DEPARTAMENTALES DE RCP Y A LAS RAZONES DE SU EXISTENCIA, SEÑALA LA FALSA:**

**D**

Todas las anteriores son verdaderas

PREGUNTA 7 DE 10

**RESPECTO AL PERSONAL QUE FORMA PARTE DE LOS COMITÉS DE RCP, SEÑALE LA VERDADERA:**

**A**

Debe estar compuesto por médicos y enfermeras

PREGUNTA 8 DE 10

**RESPECTO AL PLAN DE FORMACIÓN DE RCP, SEÑALE LA FALSA:**

**D**

La formación puede realizarse fácilmente, sin recursos proporcionados por el hospital

PREGUNTA 9 DE 10

**RESPECTO A LOS SISTEMAS DE ALERTA PRECOZ, SEÑALE LA FALSA:**

**C**

Podemos crear una escala de alerta precoz según los criterios de nuestro centro y utilizarla más específicamente en nuestro medio

PREGUNTA 10 DE 10

**EL EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA PUEDE:**

**D**

Todas las anteriores son verdaderas

## **RCP INTEGRADA Y ESTABILIZACION POST – RCP**

### **PREGUNTA 1 DE 7**

#### **SEÑALE LA RESPUESTA ADECUADA EN RELACIÓN AL PRONOSTICO DE LA PCR PEDIATRICA**

**C**

En centros especializados con programas de entrenamiento en la RCP, es más frecuente que la causa de muerte sea la muerte cerebral

### **PREGUNTA 2 DE 7**

#### **SOBRE EL PRONÓSTICO DE LA PARADA CARDIORRESPIRATORIA EN PEDIATRÍA, ES FALSO:**

### **PREGUNTA 3 DE 7**

#### **CUAL DE ESTOS NO ES UN OBJETIVO DENTRO DE LA ESTABILIZACIÓN POSTREANIMACION**

**C**

Intentar mantener una glucemia alta y un nivel de sodio bajo

### **PREGUNTA 4 DE 7**

#### **CUAL DE ESTOS NO ES UN PARÁMETRO DE VALORACION HEMODINÁMICA INTENSIVA**

**D**

Pirúvico

### **PREGUNTA 5 DE 7**

**PACIENTE DE 2 AÑOS Y 10 KILOS TRAI DO POR UNIDAD DE EMERGENCIAS A NUESTRO HOSPITAL. LE CONECTAMOS A NUESTRO VENTILADOR MECANICO, QUE VOLUMEN TIDAL SERIA RECOMENDABLE**

**C**

80

PREGUNTA 6 DE 7

**PACIENTE DE 11 AÑOS CON PARADA CARDIACA EXTRAHOSPITAL TRAS TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO, A SU INGRESO PRESENTA MIDRIASIS UNILATERAL, TA DE 180/120 Y FC DE 42. CUAL ES TU ACTITUD**

**C**

Administrar suero hipertónico y solicitar valoración urgente por neurocirugía

PREGUNTA 7 DE 7

**EN RELACION A LA HIPOTERMIA CUAL DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA**

**B**

No se requiere control térmico en estos pacientes

**EXAMEN FINAL**

PREGUNTA 1 DE 58

**EL MECANISMO MÁS FRECUENTE DE PARADA CARDIORRESPIRATORIA EN PEDIATRÍA ES**

PREGUNTA 2 DE 58

**CUAL ES LA CAUSA MAS FRECUENTE DE PARADA CARDIACA INTRAHOSPITALARIA**

**A**

Cardiaca

PREGUNTA 3 DE 58

**SEÑALE CUAL DE ESTOS NO ES UN MECANISMO DE PREVENCIÓN DE LA PARADA CARDIACA INTRAHOSPITALARIA**

**B**

Presencia de familiares 24 horas

PREGUNTA 4 DE 58

**SEGÚN EL ORDEN DE ACTUACIÓN LOS SIGUIENTES PASOS DE LA RCP BÁSICA DEL NIÑO, ¿CUÁL SERÍA EL TERCER PASO?**

**A**

abrir vía aérea

PREGUNTA 5 DE 58

**LA MANIOBRA INDICADA PARA LA APERTURA DE LA VÍA AÉREA EN LOS LACTANTES ES**

PREGUNTA 6 DE 58

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES SOBRE LAS COMPRESIONES TORÁCIAS ES CIERTA?**

**D**

Todas las anteriores son ciertas

PREGUNTA 7 DE 58

**DESPUÉS DE DAR CINCO RESPIRACIONES DE RESCATE, ¿QUÉ PULSO PODEMOS PALPAR EN EL LACTANTE?**

**B**

Braquial

PREGUNTA 8 DE 58

**RESPECTO AL MASAJE CARDÍACO EN EL NIÑO, UNA DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES FALSA:**

**B**

La mayoría de los reanimadores consideran su intervención durante el SVB como una experiencia positiva

PREGUNTA 9 DE 58

**LA SECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN MASAJE CARDIACO-VENTILACIÓN EN EL LACTANTE, CUANDO SE REALIZA POR PERSONAL SANITARIO, ES**

**B**

15//2

PREGUNTA 10 DE 58

**¿CUÁNDO SE PUEDE INTERRUMPIR LA RCP DURANTE UN SVB?**

**D**

Todas las anteriores son ciertas

PREGUNTA 11 DE 58

**DURANTE EL SVB, ANTE UNA VÍCTIMA CON SOSPECHA DE PARADA CARDIACA, PERO QUE SE ENCUENTRA CONSCIENTE DEBEMOS:**

**C**

Dejar a la víctima en la misma posición en la que la encontramos, tratando de evitar que se produzcan más daños

PREGUNTA 12 DE 58

**CUAL DE ESTAS AFIRMACIONES ES INCORRECTA EN RELACION A LA OBSTRUCCIÓN DE VIA AERA**

PREGUNTA 13 DE 58

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES SOBRE LA PROFUNDIDAD DE LAS COMPRESIONES TORÁCIAS ES CIERTA?**

PREGUNTA 14 DE 58

**DURANTE LAS COMPRESIONES TORÁCIAS, LAS MANOS SE DEBEN DE COLOCAR:**

**B**

En la mitad inferior del esternón (“centro del pecho”)

PREGUNTA 15 DE 58

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CIERTA EN UN PACIENTE CON OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA E INCONSCIENTE?**

**B**

Se deben de iniciar las compresiones torácicas incluso aunque se palpe pulso en la víctima

PREGUNTA 16 DE 58

**¿CUÁL ES LA RELACIÓN RECOMENDADA ENTRE LAS COMPRESIONES Y LAS VENTILACIONES DE RESCATE?**

**A**

30:2

PREGUNTA 17 DE 58

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES SOBRE LA FRECUENCIA DE LAS COMPRESIONES TORÁCIAS ES CIERTA?**

**D**

Todas las anteriores son ciertas

PREGUNTA 18 DE 58

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES TÉCNICAS DE RCP NO ES VÁLIDA?**

**C**

RCP sólo con ventilaciones de rescate con una frecuencia de 10-12/min

PREGUNTA 19 DE 58

**¿QUÉ DEBEMOS HACER EN CASO DE QUE UNA VÍCTIMA PRESENTE SIGNOS DE OBSTRUCCIÓN LEVE DE LA VÍA AÉREA?**

**A**

Animar a la víctima a que siga tosiendo

PREGUNTA 20 DE 58

**¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES MANIOBRAS HAN DEMOSTRADO SER EFECTIVAS EN VÍCTIMAS CON SIGNOS DE OBSTRUCCIÓN SEVERA DE LA VÍA AÉREA?**

**D**

Todas las anteriores son ciertas

PREGUNTA 21 DE 58

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES SOBRE LAS COMPRESIONES TORÁCIAS ES CIERTA?**

**B**

Minimizar las interrupciones en las compresiones torácicas para asegurar que éstas suponen, al menos, el 60% del tiempo total de la RCP

PREGUNTA 22 DE 58

**LA ARRITMIA MÁS FRECUENTE EN LA PARADA CARDIORRESPIRATORIA EN LA INFANCIA ES:**

**C**

La asistolia

PREGUNTA 23 DE 58

**CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA SIN PULSO ES CIERTO QUE**

**D**

Las respuestas b y c son correctas

PREGUNTA 24 DE 58

**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SOBRE LOS DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS ES FALSA?**

**B**

En los DEAs se puede programar la dosis de descarga

PREGUNTA 25 DE 58

**EN RELACIÓN A LAS COMPLICACIONES DE LA REANIMACIÓN ES CIERTO QUE:**

**C**

Las sobredosificaciones de fármacos pueden ocurrir

PREGUNTA 26 DE 58

**EN RELACIÓN AL USO DEL CAPNÓGRAFO DURANTE LA REANIMACIÓN SEÑALE LA AFIRMACION CORRECTA**

**B**

Permite diferenciar intubación traqueal de esofágica en el paciente que no se encuentra en parada cardíaca

PREGUNTA 27 DE 58

**SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA EN RELACIÓN A LA PRESENCIA DE UN BUEN LIDERAZGO EN LA REANIMACIÓN**

**D**

Todas las anteriores son correctas

PREGUNTA 28 DE 58

**SOBRE LAS CÁNULAS OROFARINGEAS SEÑALE LA INCORRECTA**

**C**

Su forma de colocación es igual para lactantes y niños

PREGUNTA 29 DE 58

**CUAL DE ESTAS CARACTERÍSTICAS DEBE CUMPLIR UNA MASCARILLA FACIAL**

**B**

Acople adecuado de boca y nariz

PREGUNTA 30 DE 58

**EN RELACION A LA MASCARILLA LARÍNGEA SEÑALE LA RESPUESTA FALSA**

**D**

La línea negra tiene que quedar en la zona posterior del tubo transparente

PREGUNTA 31 DE 58

**SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA EN RELACIÓN A LA TÉCNICA DE INTUBACIÓN**

**C**

La posición adecuada en el lactante es la hiperextensión cervical máxima

PREGUNTA 32 DE 58

**QUÉ VÍA PUEDE UTILIZARSE PARA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS DURANTE LA RCP EN NIÑOS?**

**D**

Todas las anteriores

PREGUNTA 33 DE 58

**CON RESPECTO A LA VÍA INTRAÓSEA, ES CIERTO**

**B**

Debe canalizarse cuando no se logra una vía venosa periférica en 60 segundos

PREGUNTA 34 DE 58

**RESPECTO A LA VÍA INTRATRAQUEAL**

**C**

Permite la administración de adrenalina, bicarbonato, calcio y midazolam.

PREGUNTA 35 DE 58

**EN RELACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE CRISTALOIDES EN LA PCR CUAL ES LA DOSIS RECOMENDADA**

**B**

20 ml/kg

PREGUNTA 36 DE 58

**NOS AVISAN DE URGENCIAS POR UN NIÑO EN PCR, AL LLEGAR OBSERVAMOS UN RITMO ANCHO IRREGULAR SIN PULSO, ¿CUAL SERÍA LA ACTITUD MÁS CORRECTA?**

**C**

Desfibrilar a 4 j / Kg seguido de masaje cardíaco

PREGUNTA 37 DE 58

**PACIENTE DE 11 AÑOS Y 40 KG CON FIBRILACIÓN VENTRICULAR, QUE NO HA REMITIDO TRAS TRES DESFIBRILACIONES A 160 JOULS, QUE ACTITUD LE PARECE MÁS CORRECTA**

**B**

Desfibrilar a 300 Jouls

PREGUNTA 38 DE 58

**LA VALORACIÓN DE LA NECESIDAD DE APLICAR REANIMACIÓN A UN RECIÉN NACIDO EN PARITORIOS LA HACEMOS**

**D**

Valorando la respiración, frecuencia cardíaca y color durante la estabilización

PREGUNTA 39 DE 58

**EN LA REANIMACIÓN DEL RECIÉN NACIDO VENTILAREMOS CON BOLSA Y MASCARILLA, ¿CUÁL ES FALSA?**

**C**

cuando el niño llore vigorosamente

PREGUNTA 40 DE 58

**NOS AVISAN A PARITORIO POR UN RECIÉN NACIDO DE UN MINUTO DE VIDA CON ANTECEDENTE DE CIRCULAR APRETADA DE CORDÓN, A NUESTRA LLEGADA LA MATRONA ESTÁ VENTILANDO PERO EL PACIENTE NO MOVILIZA TORAX Y LA FRECUENCIA CARDÍACA ES DE 60. ¿CUÁL SERÍA TU ACTITUD?**

**B**

Aspirar secreciones, recolocar vía aérea e intentar ventilar

PREGUNTA 41 DE 58

**NACE UN RECIÉN NACIDO CON LÍQUIDO LIGERAMENTE TEÑIDO DE MECONIO, CON LLANTO ENÉRGICO, BUENA COLORACIÓN Y FRECUENCIA CARDIACA DE 120 LPM. ¿QUÉ MANIOBRA DEBEMOS HACER?**

**D**

Secar y observar

PREGUNTA 42 DE 58

**EN RELACIÓN A LA REANIMACIÓN EN NEONATOS PREMATUROS SEÑALA LA AFIRMACIÓN CORRECTA**

**B**

Una saturación de 78% a los 5 min es una indicación de administrar O2 al 100%

PREGUNTA 43 DE 58

**CUAL DE ÉSTOS SUPUESTOS NO SERÍA UNA INDICACIÓN DE NO REANIMACIÓN**

**C**

Cardiopatía congénita severa

PREGUNTA 44 DE 58

**RECIÉN NACIDO A TERMINO DE 3 KG, CON UN DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA. LO HEMOS INTUBADO Y LE ESTAMOS REALIZANDO MASAJE CARDIACO, SIGUE CON UNA FRECUENCIA CARDIACA MENOR DE 60 PPM, QUE DOSIS DE ADRENALINA LE ADMINISTRARÍAS POR VÍA INTRATRAQUEAL**

**B**

0.3 ml de Adrenalina 1/1000

PREGUNTA 45 DE 58

**EN EL PACIENTE ANTERIOR, SI NO RECUPERA PULSO NI LATIDO Y LE QUEREMOS ADMINISTRAR VOLUMEN, ¿QUÉ VÍA CANALIZAREMOS PRIORITARIAMENTE?**

**C**

Vena umbilical

PREGUNTA 46 DE 58

**LA ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RESUCITACIÓN DEPENDERÁ DE... SEÑALE LA FALSA:**

**B**

Del rol fijo que se adopte durante la RCP.

PREGUNTA 47 DE 58

**RESPECTO AL DIRECTOR DE LA RCP, SEÑALE LA RESPUESTA FALSA:**

**B**

Debe permanecer siempre apartado de las tareas de compresiones y ventilaciones, para poder centrarse en la organización y el tratamiento.

PREGUNTA 48 DE 58

**RESPECTO A LA COMUNICACIÓN DEL DIRECTOR DE LA RCP CON EL EQUIPO, SEÑALE LA RESPUESTA FALSA:**

**A**

Debe resaltar claramente si ha habido algún error durante la RCP, para que no vuelva a cometerse

PREGUNTA 49 DE 58

**CUÁL NO ES UN MIEMBRO HABITUAL DEL EQUIPO DE RESUCITACIÓN:**

**C**

El que recaba información sobre el paciente, del historial o de sus familiares.

PREGUNTA 50 DE 58

**RESPECTO A LOS SISTEMAS DE ALERTA PRECOZ, SEÑALE LA FALSA:**

**C**

Podemos crear una escala de alerta precoz según los criterios de nuestro centro y utilizarla más específicamente en nuestro medio

PREGUNTA 51 DE 58

**RESPECTO A LA FORMACIÓN DE COMITÉS HOSPITALARIOS O DEPARTAMENTALES DE RCP Y A LAS RAZONES DE SU EXISTENCIA, SEÑALA LA FALSA:**

**D**

Todas las anteriores son verdaderas

PREGUNTA 52 DE 58

**SEÑALE LA RESPUESTA ADECUADA EN RELACIÓN AL PRONOSTICO DE LA PCR PEDIATRICA**

**C**

En centros especializados con programas de entrenamiento en la RCP, es más frecuente que la causa de muerte sea la muerte cerebral

PREGUNTA 53 DE 58

**SOBRE EL PRONÓSTICO DE LA PARADA CARDIORRESPIRATORIA EN PEDIATRÍA, ES FALSO:**

**C**

Depende del tiempo entre la parada y el inicio de las maniobras de RCP

PREGUNTA 54 DE 58

**CUAL DE ESTOS NO ES UN OBJETIVO DENTRO DE LA ESTABILIZACIÓN POSTREANIMACION**

**C**

Intentar mantener una glucemia alta y un nivel de sodio bajo

PREGUNTA 55 DE 58

**CUAL DE ESTOS NO ES UN PARÁMETRO DE VALORACION HEMODINÁMICA INTENSIVA**

**D**

Pirúvico

PREGUNTA 56 DE 58

**PACIENTE DE 2 AÑOS Y 10 KILOS TRAI DO POR UNIDAD DE EMERGENCIAS A NUESTRO HOSPITAL. LE CONECTAMOS A NUESTRO VENTILADOR MECANICO, QUE VOLUMEN TIDAL SERIA RECOMENDABLE**

**C**

80

PREGUNTA 57 DE 58

**PACIENTE DE 11 AÑOS CON PARADA CARDIACA EXTRAHOSPITAL TRAS TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO, A SU INGRESO PRESENTA MIDRIASIS UNILATERAL, TA DE 180/120 Y FC DE 42. CUAL ES TU ACTITUD**

**C**

Administrar suero hipertónico y solicitar valoración urgente por neurocirugía

PREGUNTA 58 DE 58

**EN RELACION A LA HIPOTERMIA CUAL DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA**

**B**

No se requiere control térmico en estos pacientes