

ATENCIÓN INICIAL AL TRAUMA

[Página Principal](#) / [AV.Q011](#) / [Evaluación Septiemb...](#) / [Prueba de conocimi...](#)

Comenzado el	jueves, 15 de septiembre de 2022, 09:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 15 de septiembre de 2022, 11:31
Tiempo empleado	2 horas 29 minutos
Puntos	26,00/30,00
Calificación	8,67 de 10,00 (87%)
Comentario -	Apto

PREGUNTA 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Durante la valoración primaria (ABCDE), en el apartado Airway NO tenemos que:

Seleccione una:

- a. Colocar cánula de Guedell. ✘
- b. Estabilizar hemodinámicamente
- c. Realizar estricto control cervical .
- d. Realizar IOT.

PREGUNTA 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La mortalidad en el paciente politraumatizado responde a una distribución trimodal, el tercer pico suele deberse a:

Seleccione una:

- a. Rotura hepática.
- b. Shock séptico y/o fracaso multiorgánico. ✓
- c. Hemorragia intracraneal.
- d. Todas son correctas.

PREGUNTA 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si queremos valorar una posible afectación del bazo, nos fijaremos en el siguiente cuadrante:

Seleccione una:

- a. Hipocondrio derecho.
- b. Hipocondrio izquierdo. ✓
- c. Flanco derecho.
- d. Epigastrio.

PREGUNTA 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente que tiene problemas de oxigenación o de mala perfusión tisular, ¿Qué zonas se ven primero afectadas?:

Seleccione una:

- a. Las zonas de presión.
- b. Los miembros superiores.
- c. Los miembros inferiores.
- d. Las mucosas, labios, encías y lechos ungueales. ✓



PREGUNTA 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al valorar las pupilas nos fijaremos en:

Seleccione una:

- a. Si son reactivas y en su tamaño.
- b. El tamaño, reactividad y forma. ✓
- c. Su forma, reactividad y si son anisocóricas.
- d. Si son reactivas.

PREGUNTA 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la clasificación de las hemorragias, en función de las pérdidas sanguíneas, las de tipo II corresponde a:

Seleccione una:

- a. TAs normal, FC menor que 100lpm. Fr 14-20rpm. y agitación
- b. TAs normal, FC menor que 100lpm. Fr 20-30rpm. y agitación. ✓
- c. TAs normal, FC mayor que 100lpm. Fr 20-30rpm. y agitación.
- d. TAs normal, FC menor que 100lpm. FR 20-30rpm. y ansioso.

PREGUNTA 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Valorar el peristaltismo mediante la auscultación nos aporta información relevante en el paciente politraumatizado. ✓
- b. Ante la sospecha de lesión medular hay que valorar la posibilidad de administrar corticoides.
- c. La fractura de pelvis puede provocar un sangrado elevado causando shock hipovolémico.
- d. En el caso de presentar luxaciones no se deben traccionar para evitar el aumento de las lesiones vasculo-nerviosas.

PREGUNTA 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al valorar la pelvis de un paciente politraumatizado: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. La fractura de pelvis no provoca sangrado muy elevado.
- b. Que no haya rotación externa de MMII nos indica fractura de pelvis.
- c. El anillo pélvico se comprimirá con una mano.
- d. El tratamiento irá encaminado a disminuir el dolor y tratar de forma precoz el shock hipovolémico antes de que se haya instaurado. ✓

PREGUNTA 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La infusión de rescate debe realizarse:

Seleccione una:

- a. Con solución coloide/cristaloide en una proporción 3:1 respectivamente.
- b. Con una solución coloide y cristaloide indistintamente.
- c. Con solución cristaloide (1500-2000cc) y si no responde se utilizará solución coloide. ✓
- d. Solución cristaloide (500cc) y si no responde, solución coloide.

PREGUNTA 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es conocido que la mortalidad del paciente politraumatizado responde a una distribución trimodal. Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. El primer pico ocurre en los primeros minutos tras el accidente, aproximadamente en el 50% de los casos.
- b. El segundo pico ocurre durante las primeras horas tras el traumatismo, aproximadamente en el 40% de los casos. ✓
- c. El segundo pico ocurre durante las primeras horas tras el traumatismo, aproximadamente el 30% de los casos.
- d. El tercer pico ocurre en los primeros días o semanas de ingreso en UCC, aproximadamente en el 20% de los casos.



PREGUNTA 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Existe una relación entre los cuadrantes y posibles órganos afectados. Al valorar la zona del mesogastrio valoraremos una afectación en:

Seleccione una:

- a. Intestino delgado. ✓
- b. Colon ascendente.
- c. Vejiga.
- d. Colon descendente.

PREGUNTA 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si palpamos el pulso carotideo:

Seleccione una:

- a. TAs mayor que 60mmHg. ✓
- b. TAs mayor que 70mmHg.
- c. TAs mayor que 80mmHg.
- d. Ninguna respuesta es correcta.

PREGUNTA 13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Si el relleno capilar es superior a 2 seg puede indicar mala perfusión. ✗
- b. La piel fría es indicativo de buena perfusión.
- c. La piel azulada, pálida o cérea indica mala perfusión.
- d. La piel húmeda puede indicar mala perfusión.

PREGUNTA 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al valorar el relleno capilar, nos indicará mala perfusión si:

Seleccione una:

- a. mayor que 3seg.
- b. menor que 2seg.
- c. mayor que 2seg. ✓
- d. mayor que 4seg.

PREGUNTA 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si palpamos el pulso radial, esto nos indica una TAs:

Seleccione una:

- a. mayor que 90mmHg.
- b. mayor que 70mmHg.
- c. mayor que 60mmHg.
- d. mayor que 80mmHg. ✓

PREGUNTA 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el caso de sospechar neumotórax a tensión, se procederá a su drenaje inmediato insertando:

Seleccione una:

- a. Un abocath del nº 16 en el segundo espacio intercostal de la línea media claviclar.
- b. Un abocath del nº 14 en el cuarto espacio intercostal de la línea media claviclar.
- c. Un abocath del nº 14 en el segundo espacio intercostal de la línea media claviclar. ✓
- d. Un abocath del nº 16 en el tercer espacio intercostal de la línea media claviclar.

PREGUNTA 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La valoración secundaria incluye:

Seleccione una:

- a. Examen físico de cabeza a pies.
- b. Historia clínica.
- c. A y B son correctas. ✓
- d. Ninguna es correcta.

PREGUNTA 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la escala de coma de Glasgow, se procederá a la IOT con una puntuación:

Seleccione una:

- a. Igual o menor de 8 ✓
- b. menor de 13
- c. Entre 10 y 11
- d. mayor que 10

PREGUNTA 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Hay que buscar el origen de las hemorragias y realizar compresión directa o indirecta sobre el punto de sangrado. Está desaconsejada la elevación de la extremidad afectada y la compresión arterial por encima del punto de sangrado. ✓
- b. Nunca se debe realiza un torniquete.
- c. El uso de torniquetes no está indicado en amputaciones traumáticas, miembros catastróficos o hemorragias graves no controladas.
- d. Ninguna respuesta es correcta.

PREGUNTA 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Que estado mental tendrá un paciente que tiene una pérdida sanguínea de más de 2000ml. una TAs disminuida. FC mayor que 140lpm. y FR mayor que 35rpm.

Seleccione una:

- a. Agitado.
- b. Confundido.
- c. Somnoliento.
- d. Letárgico. ✓

PREGUNTA 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para detectar neumotórax auscultaremos:

Seleccione una:

- a. 2°-3° espacio intercostal de la cara anterior.
- b. 1°-2° espacio intercostal de la cara anterior. ✓
- c. 2°-3° espacio intercostal de la cara posterior.
- d. 1°-2° espacio intercostal de la cara posterior.

PREGUNTA 22

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un paciente que abre los ojos al dolor, tiene una respuesta verbal confusa y localizar el dolor. Tiene un Glasgow de:

Seleccione una:

- a. 12/15 ✗
- b. 10/15
- c. 11/15
- d. 9/15

PREGUNTA 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Las luxaciones no se deben traccionar ya que podremos producir o aumentar lesiones vasculo-nerviosas.
- b. El tratamiento de la fractura consiste en traccionar en el eje y posteriormente inmovilizar con férula.
- c. Es importante comprobar el pulso solo tras la inmovilización de la fractura. ✓
- d. La fractura abierta, fractura bilateral de fémur, de pelvis o secciones arteriales implican traslado urgente.

PREGUNTA 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El collarín debe cumplir tres requisitos:

Seleccione una:

- a. Ser semirrígido, tener apoyo mentoniano y orificio en la parte anterior.
- b. Ser rígido, tener apoyo mentoniano y orificio solo en la parte posterior.
- c. Ser rígido, tener apoyo mentoniano y orificio en la parte anterior. ✓
- d. Ser rígido, tener apoyo mentoniano y sin orificio en la parte anterior.

PREGUNTA 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los signos clínicos para evaluar el estado de perfusión tisular de un paciente son:

Seleccione una:

- a. Pulso, coloración de la piel, humedad, temperatura y relleno capilar. ✓
- b. Pulso, relleno capilar, PA y temperatura.
- c. Pulso, coloración de la piel, humedad y temperatura.
- d. Relleno capilar, estado de la piel y valoración de edemas.

PREGUNTA 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para asegurar el adecuado intercambio gaseoso a nivel alveolo-capilar, hay que mantener:

Seleccione una:

- a. PaO2 mayor que 60mmHg y SatO2 mayor que 90% ✓
- b. PaO2 mayor que 55mmHg y SatO2 mayor que 90%
- c. PaO2 mayor que 60mmHg y SatO2 mayor que 93%
- d. PaO2 menor que 60mmHg y SatO2 mayor que 90%

PREGUNTA 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La evaluación inicial se suele dividir en dos fases, durante el reconocimiento primario:

Seleccione una:

- a. Se establece un balance global de las lesiones existentes.
- b. Consiste en la identificación de lesiones leves y el inicio de medidas terapéuticas.
- c. Identifica las lesiones por aparatos.
- d. Consiste en la identificación de lesiones graves y el inicio de medidas terapéuticas. ✓

PREGUNTA 28

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En la clasificación de las hemorragias en función de la pérdida de sangre, cuando la TAs se ve disminuida y la FC mayor que 120lpm, la pérdida sanguínea corresponde a:

Seleccione una:

- a. mayor que 40%
- b. Entre 750-1500ml ✗
- c. 30-40%
- d. mayor que 2000ml

PREGUNTA 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Con una perfusión y volemia adecuada el color de la piel es azulado.
- b. En un paciente politraumatizado siempre se colocará SNG y SV.
- c. Abridaremos al paciente tapándole con una manta, pero nunca administraremos sueros calientes.
- d. Una consecuencia directa de la exposición del paciente es la hipotermia. ✓

PREGUNTA 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente que no abre los ojos al dolor, tiene una respuesta verbal incompresible y localiza al dolor, su puntuación en la escala de coma de Glasgow es de:

Seleccione una:

- a. 6/15
- b. 11/15
- c. 8/15 ✓
- d. 9/15

◀ Simulacro IMV

Ir a...

Curso: Atención inicial al trauma ▶

MENÚ PRINCIPAL

- FUDEN
- Campus Virtual
- Campus Postgrados
- Fuden inclusiva
- Tienda

ACTIVIDADES SATSE

- Aula Virtual
- Evaluación de las Competencias
- Oposiciones

ÁREA PERSONAL

- Mi cuenta
- Preferencias
- Subir documentación
- Mis diplomas



