

Pregunta

01/05

La infección por VPH es una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) más frecuentes, tanto en relaciones heterosexuales como homosexuales. Se estima que el 80% de las personas sexualmente activas se infectarán por VPH en algún momento de su vida.

Verdadera xxxx

Falsa

Pregunta

02/05

La infección por VPH es la causa necesaria para que se desarrolle el cáncer de cuello uterino y también juega un papel importante en otros cánceres femeninos como el de vulva y el de vagina. En los varones destaca por causar verrugas anogenitales.

Falsa xxxxx

Verdadera

Pregunta

03/05

La familia de virus *Papillomaviridae* está formada por más de 200 genotipos de virus del papiloma humano o VPH diferentes pero que comparten la estructura de su genoma. Estos virus tienen capacidad para infectar al ser humano, pero solo algunos tienen capacidad oncogénica.

Falsa

Verdadera xxxx

Pregunta

04/05

Los genotipos VPH6 y VPH11 son los responsables del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino en las mujeres.

Verdadera

Falsa xxxx

Pregunta
05/05

La infección por VPH se adquiere solamente a través de las relaciones sexuales vaginales.

Verdadera

Falsa xxxx