

1. Respecto a la anatomía faríngea: **E) TODAS CORRECTAS**
2. Señale la respuesta incorrecta con respecto a los tests clínicos predictivos: **C) La realización de un test clínico**
3. En cuanto a la técnica para llevar a cabo la intubación con videolaringoscopios sin canal: **E) ByD son correctas**
4. Uno de los siguientes exámenes no es imprescindible para la correcta valoración de la vía aérea: **A) TEST RADIOLOGICO**
5. ¿Qué tubos podemos utilizar con el videolaringoscopio Airtraq? **E) TODOS ELLOS**
6. Anatomía laríngea: **D)** El cricoides se puede palpar con facilidad inmediatamente por debajo del cartílago tiroideo, al que se une por medio de la membrana cricotiroides, punto de referencia para la cricotiroides
7. Respecto al momento óptimo de realizar la traqueotomía en el paciente crítico: **E)** La realización precoz de traqueotomía ha demostrado disminuir el tiempo de estancia en unidades de cuidados intensivos
8. Señala la respuesta verdadera sobre la anatomía de la lengua: **E)** La vascularización de la lengua procede principalmente de la arteria lingual, rama directa de la arteria carótida externa
9. Indique la respuesta incorrecta en relación con las complicaciones mayores asociadas al manejo de la vía aérea: **C)** En la mayor parte de las complicaciones graves ocurridas, se han descrito elementos que indican un adecuado abordaje de la vía aérea
10. Si se decide que es precisa la intubación traqueal (IOT): **C)** Tras cada intento fallido cambiaría alguna circunstancia que pudiese mejorar la visión: posición olfateo, nº pala del laringoscopio, guía de intubación, ...
11. ¿Cual de las siguientes afirmaciones es correcta? **D) TODAS CORRECTAS**

12. ¿Cual de las siguientes afirmaciones es correcta?
C) Existen modelos de palas tanto desechables como reutilizables para el videolaringoscopio Glidescope
13. ¿Que es la presión de sellado? **A)** Presión en el circuito ventilatorio, por encima de la cual fuga aire en orofaringe
14. Inervacion Laríngea: **B)** La rama interna o superior, inerva la mucosa de la parte superior de la laringe, porciones laterales de la faringe y la base de la lengua
15. Seleccione la respuesta correcta en relación con la clasificación de Cormack-Lehane: **C)** En el grado IIIa la intubación es posible en muchos casos mediante el empleo de una guía de bougie
16. En cuanto a las técnicas de traqueotomía percutánea: **D)** La técnica de Ciaglia modificada podría ser la técnica de elección entre las técnicas percutáneas a la luz de la literatura disponible en la actualidad
17. En el paciente crítico, es indicación de traqueotomía: **E) TODAS**
18. La vía aérea difícil: **E)** Se asocia a un aumento de la morbilidad y mortalidad
19. ¿Cual de las siguientes afirmaciones es correcta?
B) l videolaringoscopio C-MAC proporciona una visión directa e indirecta de la glotis
20. La técnica de intubación con videolaringoscopio Airtraq: **B)** Laringoscopia indirecta con técnica Macintosh
21. Señale la respuesta correcta en relación con la vía aérea difícil: **A) OBSTRETICA**
22. Uno de los siguientes parámetros no es predictor de intubación difícil: **C) BARBA**
23. En relación a las ayudas a la fibroscopia: **C)** La cánula VAMA presenta una marca láser que guía la intubación
24. ¿Cuál de los siguientes videolaringoscopios tiene canal de succión? **A)** Pentax
25. Con respecto a los tests clínicos predictivos, no es cierto que: **B)** El test de Mallampati posee, por sí solo, un alto valor predictivo positivo

26. La cavidad oral: **E) TODAS**
27. Según la clasificación de Spaulding, el fibroscopio para intubación es: **B) SEMICI**
28. ¿Que otras alternativas te plantearías si la IOT de este paciente fuese difícil? **B) Me plantearía utilizar la Mascarilla Laríngea**
29. Tras una intubación con fibroscopio, éste requiere: **B) NIVEL ALTO**
30. Traqueotomías por debajo del 4 o 5 anillo se asocian a una frecuencia aumentada de lesiones de vasos de la región cervical anterior: **B) Traqueotomías por debajo del 4 o 5 anillo se asocian a una frecuencia aumentada de lesiones de vasos de la región cervical anterior**
31. **Indique la respuesta falsa: B)** La apertura bucal relaciona el tamaño de la mandíbula con el del maxilar superior
32. **Indique la respuesta incorrecta respecto a la valoración de la vía aérea: B)** No es necesaria en caso de urgencia
33. **En la realización de traqueotomía percutánea: C)** No es preciso realizar control radiológico tras una traqueotomía percutánea de forma sistemática
34. **¿Qué dispositivo extraglotico consigue mejor presión de sellado? C) PROSEAL**
35. **De las siguientes opciones, una de ellas no es imprescindible para la valoración de la vía aérea: C) TEST RADIOLOGICO**
36. **Con respecto al test de Mallampati señale la respuesta falsa: C)** Se realiza con el paciente en sedestación, con la cabeza en posición neutra, y con fonación