

1

Las indicaciones de trasplante intestinal son:

- Trombosis de más de 2 territorios venosos.
- Sepsis de repetición
- Tumores desmoides invasivos
- Hepatopatía severa asociada a fallo intestinal
- Todas las anteriores**

2

Sobre la demencia avanzada, es falso que:

- Es una enfermedad incurable y progresiva
- El estadio 7 de la escala GDS corresponde a la fase más avanzada
- La supervivencia media en la fase avanzada-terminal se calcula que es de 12-16 meses.**
- Un problema frecuente son los trastornos del comportamiento alimentario
- Los problemas de la alimentación son parte de la evolución natural de la enfermedad

3

La adaptación intestinal...

- Es un proceso natural
- Puede durar 1-2 años tras la resección intestinal
- Se fomenta por la presencia de alimentos en la luz intestinal
- Existen cambios estructurales y hormonales
- Todas son ciertas**

4

¿Qué es el deadname?

- El nombre sentido
- El nombre asignado al nacer**
- El nombre de un alter ego
- El nombre alternativo
- El nombre deseado durante la transición

5

¿Qué enunciado de los siguientes sobre la absorciometría de rayos x de energía dual (DXA) es correcto?

- La exposición a radiación es muy elevada por lo que su uso está restringido a casos muy seleccionados
- Es un método muy costoso comparándolo con otras técnicas como la Resonancia Magnética o TAC
- Sus mediciones no se ven influenciadas por ningún elemento ni condición
- Se trata de un modelo de valoración de composición corporal tricompartmental y permite además hacer estimaciones a nivel regional en diferentes zonas corporales**
- Todas las respuestas son correctas

6

¿Cuál de estos enunciados no es cierto, en relación con el perfil profesional y capacitación de los y las profesionales de Endocrinología?

- Deberían liderar los cambios en las acciones de mejora relacionadas con la asistencia en la diabetes.
- Conocer el contexto y ofrecer resultados aumenta la capacidad de influencia y permite liderar acciones de mejora en la atención a la diabetes
- Es importante contribuir con acciones de mejora que contribuyan a cambios dirigidos hacia la transformación sanitaria.
- El perfil clínico y las patologías que tratan permite compartir responsabilidades y ofrecer una visión de la organización y abordaje de los problemas de salud multidisciplinar
- Carecen del perfil necesario para liderar acciones de mejora en la asistencia a la diabetes**

7

A la consulta de Endocrinología acude una persona asignada como mujer al nacer, se identifica con identidad femenina y se siente atraída por mujeres y hombres. En relación con el caso elija la respuesta correcta (*identidad de género - orientación sexual*):

- Persona no binaria - homosexual
- Mujer cisgénero - no binaria
- Mujer cisgénero - bisexual**
- Hombre transgénero - bisexual
- Hombre transgénero - heterosexual

8

Forman parte del tratamiento médico del síndrome de intestino corto todas excepto

- Omeprazol
- Loperamida
- Teduglutide
- Pucalopride
- Codeína

9

Las concentraciones de Hormona AntiMulleriana (AMH), en una paciente diagnosticada de infertilidad son:

- Superiores a las pacientes fértiles
- Inferiores a las pacientes fértiles
- Ninguna es correcta
- Inferiores, aunque en 2/3 de los casos pueden encontrarse en rango normal
- Su determinación no aporta información relevante al estudio de la infertilidad en la mujer.

10

Algunos elementos están facilitando la transición de las unidades de pediatría a adultos, excepto:

- Nuevos tratamientos como los nuevos análogos de insulina
- La Monitorización continua de glucosa
- Nuevos tratamientos como los inhibidores de SGLT2
- Plataformas de gestión de la diabetes
- Bombas de insulina

11

En relación a la alimentación de confort es cierto:

- Los líquidos deben administrarse espesados a viscosidad pudding
- La postura más adecuada es con ligera flexión cervical posterior
- Es conveniente el control periódico del peso para conocer la eficacia de la alimentación
- Se deben evitar alimentos con alto contenido en azúcar
- No es conveniente utilizar jeringas si también hay sospecha clínica de disfagia.

12

Señale la respuesta correcta respecto a la diabetes mellitus en enfermedades exocrinas del páncreas:

- Suele estar correctamente identificada desde el principio
- El control metabólico es mejor que el del paciente con DM2
- Raramente necesita incorporar al tratamiento insulina
- Tiene mayor riesgo de presentar hipoglucemia**
- Se comporta como una forma muy poco agresiva de DM2

13

¿Cuál de las siguientes opciones no es causa frecuente de infertilidad/hipogonadismo en la mujer?

- Síndrome de Turner
- Anorexia
- Ovarios poliquísticos
- Endometriosis
- Ejercicio regular**

14

Señale la respuesta falsa respecto a la denominación de la diabetes mellitus en enfermedades exocrinas del páncreas

- De momento no existe una denominación universalmente aceptada
- En PubMed deberemos buscarla por diferentes nombres
- El término diabetes tipo 3c hace referencia a un único tipo etiológico**
- Con frecuencia se la denomina diabetes pancreatopriva
- El término diabetes del páncreas exocrino se utiliza frecuentemente

15

Sobre las técnicas de imagen en nutrición, señale la correcta:

- Son menos útiles que las técnicas tradicionales de valoración nutricional
- Cada técnica de imagen permite valorar con más detalle ciertos componentes corporales frente a otras, no hay una técnica de imagen perfecta.**
- Son todas igualmente de precisas y fiables.
- Hay pocos avances en el desarrollo de técnicas de imagen
- Son todas las respuestas correctas

16

Las Unidades de Transición han demostrado varios aspectos, excepto:

- Son eficaces
- Incrementan el gasto sanitario**
- La educación del paciente redundará en la mejora del seguimiento y el control metabólico
- Reducen los episodios de cetoacidosis
- Mejoran la calidad de vida y el autocuidado

17

¿Qué no debemos hacer ante la negativa a la ingesta en personas con demencia avanzada?

- Descartar una enfermedad intercurrente
- Prescribir orexígenos**
- Explicar que la alimentación de confort es el tratamiento más adecuado
- Revisar la existencia de documento de voluntades anticipadas
- Mantener una adecuada higiene oral

18

En relación al mecanismo inmunológicamente mediado:

- Se ha descrito un aumento de la autoinmunidad después de la infección por Covid-19.
- El virus pone en marcha fenómenos autoinmunes, y se han descrito casos de Enfermedad de Graves
- La respuesta inflamatoria aguda al SARS-CoV-2 desencadena una cascada inmunológica mediada por la liberación de citocinas
- La liberación de citocinas conduce a un aumento en los niveles circulantes de IL-6, IL1RA, y quimioatrayentes
- Todas son correctas**

19

¿Cuál de estos enunciados es verdadero para liderar cambios que promuevan mejoras asistenciales

- Sólo con la actitud personal se pueden conseguir fácilmente.
- Es conveniente establecer alianzas con otros agentes implicados.**
- No se recomienda el apoyo ni la participación de gestores institucionales.
- La planificación de las acciones es prescindible.
- La comunicación de los resultados no es importante.

20

Señale qué entidad patológica no forma parte de la diabetes mellitus en enfermedades exocrinas del páncreas:

- Fibrosis Quística
- Pancreatitis Crónica
- Pancreatitis Aguda
- Cáncer de páncreas
- Glucagonoma

21

En relación con la Resonancia Magnética, señale la respuesta falsa:

- Se trata de un procedimiento seguro para todos los grupos de edades.
- Su acceso es limitado, costoso y requiere formación especializada para llevarlo a cabo.
- Existen diferentes técnicas dentro de la Resonancia Magnética.
- No genera exposición a radiación ionizante como TAC.
- Existe numerosa evidencia sobre las nuevas modalidades de Resonancia Magnética como la espectroscópica y son de aplicación rutinaria en la práctica clínica diaria.

22

¿Cuáles son los componentes del género?

- Orientación sexual, identidad de género y sexo biológico
- Orientación sexual, expresión de género e identidad de género
- Expresión de género, identidad de género y sexo biológico
- Expresión de género, orientación sexual e identidad de género
- Orientación sexual, deseo sexual y expresión de género

23

En relación a la tirotoxicosis tras la vacunación contra el SARS-CoV-2

- Se han descrito diferentes formas de tirotoxicosis
- Hay descritos casos en la literatura tanto de tiroiditis subaguda como de tiroiditis atípica
- Se han descrito casos de hipertiroidismo autoinmune
- La mayoría de estas formas de tirotoxicosis se han notificado con vacunas basadas en ARNm
- Todas son correctas