

24

Señale la respuesta falsa respecto a los criterios para diagnosticar diabetes mellitus en enfermedades exocrinas del páncreas

- Excluir consumo activo de alcohol
- Existencia de insuficiencia pancreática exocrina
- Imagen del páncreas patológica
- Ausencia de autoinmunidad de diabetes
- Los criterios no están universalmente establecidos y aceptados

25

En relación a la ecografía y su aplicación en nutrición, señale la respuesta correcta:

- No hay estudios en ecografía que permitan valorar la existencia de disfagia en los pacientes.
- Sobre la valoración cualitativa de la ecogenicidad del músculo, cuando es hipercogénico es sugestivo de mioesteatosis y un aspecto hipoecogénico es orientativo de edema/necrosis
- Los músculos estudiados para la estandarizar del uso de la ecografía en la valoración de sarcopenia son sólo los del cuádriceps
- Sólo se está realizando esta técnica de ecografía en nutrición a nivel

26

Una persona fue asignada como hombre al nacer y se identifica con lo masculino. En relación con el enunciado elija la respuesta correcta:

- Es un hombre cisgénero
- Es un hombre transgénero
- Es un hombre homosexual
- Es un hombre heterosexual
- Es un hombre intersexual

27

En relación a la tirotoxicosis secundaria a la vacuna contra el Covid-19:

- La mayoría de estas formas de tirotoxicosis se han notificado con vacunas basadas en ARNm.
- La proteína S se ha convertido en el principal objetivo para el desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2.
- Las secuencias péptido de la peroxidasa tiroidea comparten similitud con la proteína S
- Son necesarias más investigaciones para aclarar cuál es el riesgo real de tiroiditis según el tipo de vacuna contra el SARS-CoV-2.
- Todas son correctas

28

Respecto a la toma de decisiones sobre el tratamiento nutricional en personas con demencia avanzada, es verdadero que:

- La planificación compartida de la atención corresponde exclusivamente a la familia y al equipo médico
- El documento de voluntades anticipadas deja siempre claro el deseo del paciente ante cada situación
- Los documentos de instrucciones previas pueden ser difíciles de aplicar en algunas circunstancias**
- La familia tiene "siempre" la última palabra
- En caso de conflictos se puede recurrir a una segunda opinión o al Comité de Ética de investigación clínica

29

El CIE-11 habla de Discordancia de género. De los siguientes diagnósticos elija aquellos utilizados como sinónimos:

- Travestismo
- Incongruencia de género**
- Transexualismo
- Disforia de género
- Desarrollo sexual diferente (DSD/ADS)

30

En relación a la tirotoxicosis y el SARS-CoV-2, se han descrito un número creciente de series de:

- Tiroiditis subaguda manifiesta
- Tiroiditis atípica
- Enfermedad tiroidea autoinmune
- No se han descrito casos en la literatura de tirotoxicosis secundarias a infección por SARS-CoV-2
- A, B y C son correctas**

31

¿Dónde es producida la inhibina?

- Células de Leydig
- Células de Sertoli**
- Hipófisis
- Próstata
- Hipotálamo

32

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la nutrición enteral con sonda en la demencia avanzada es falsa?

- Limita la interacción social del paciente con la familia
- En ocasiones requiere el uso de contención mecánica
- Disminuye el riesgo de úlceras por presión**
- No aumenta la supervivencia
- No mejora el estado funcional de los pacientes

33

Son complicaciones asociadas al síndrome de intestino corto todas excepto una:

- Nefrolitiasis
- Trombosis venosas**
- Enfermedad metabólica ósea
- Sobrecrecimiento bacteriano
- Acidosis D láctica

34

¿Cuál es una definición acertada de la transición del paciente adolescente y adulto joven con enfermedades crónicas a una consulta de adultos?

- El Traslado administrativo de la atención médica desde una unidad de atención pediátrica a una de adultos.
- La Transición del tratamiento en unidad pediátrica a una unidad de adultos
- Paso más o menos rápido de una unidad de atención médica pediátrica a una de adultos.
- El traslado planificado y deliberado de los adolescentes y adultos jóvenes y condiciones físicas y médicas crónicas de los sistemas sanitarios centrados en el niño a los centrados en el adulto.**
- Cambio en los recursos médicos que recibe el paciente pediátrico al pasar a una unidad de adultos.

35

En relación a los mecanismos de acción por los cuales la infección por COVID-19 podría inducir la disfunción tiroidea, se ha descrito que:

- Los niveles de expresión de ACE2 son mucho mayores en el tejido tiroideo que en otros órganos.
- El virus SARS-CoV-2 está formado por la proteína S mediante la cual se introduce en la célula.
- Se produce una acción directa del virus en el tejido tiroideo (daño directo).
- El receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2 (ACE2) es necesario para la entrada del virus.
- Todas son correctas**

36

Respecto a las estrategias de cribado automatizado guiados por el sistema de información de laboratorio señale la opción falsa.

- Son sencillas de diseñar e implementar.
- Contribuyen a la identificación precoz de personas con diabetes.
- Permiten el diseño nuevo circuitos de organización asistencial y la optimización de los recursos.
- No facilitan la labor de los equipos de atención primaria.**
- Aumentan la satisfacción de los profesionales

37

Señala la cierta con respecto al síndrome de intestino corto (SIC).

- En el SIC tipo 1 existe una resección del íleon distal y una anastomosis ileocólica
- En el SIC tipo 2 existe una resección del colon e íleon distal manteniendo una yeyunostomía terminal
- En el SIC tipo 3 se preservan los últimos 10 cm de íleon distal y la válvula ileocecal**
- El SIC tipo 4 es el más severo de todos
- En el SIC tipo 2 existe alto riesgo de deshidratación

38

Señale la respuesta falsa respecto al tratamiento de la diabetes mellitus en enfermedades exocrinas del páncreas

- La metformina se puede utilizar en casi todas las entidades de este tipo de diabetes
- La insulina raramente provoca hipoglucemia**
- En pacientes con antecedentes de pancreatitis aguda se deben usar con precaución los iDPP4
- Se puede solicitar la financiación por el sistema público sanitario de la monitorización continua de glucosa
- Precisan de tratamiento sustitutivo con enzimas pancreáticas y habitualmente con vitamina D.

39

De los siguientes obstáculos que se pueden observar en la transición del paciente adolescente y adulto joven con diabetes tipo 1 a una consulta de adultos, ¿Cuál considera erróneo?

- En el adolescente falta de conocimientos e información
- En los padres adhesión al pediatra
- En los padres miedo a dar autonomía a sus hijos
- En el Sistema sanitario falta de comunicación entre servicios
- En el sistema sanitario la existencia de unidades específicas de DM tipo 1**

40

¿Cuáles funciones desarrolla la hormona FSH?

- Estimular secreción de folículos ováricos
- Estimular secreción de estrógenos en la granulosa
- Inducir ovulación
- Producción de inhibina por el cuerpo lúteo
- Todas son correctas**

41

¿Con cuál de estos agentes no es necesario trabajar para obtener mejoras en la atención a las personas con diabetes?

- Profesionales de medicina de atención primaria.
- Profesionales de enfermería de atención primaria.
- Profesionales de hospitalarios.
- Personas con diabetes.
- Todos los anteriores son ciertos**

42

Es falso en el control metabólico en la adolescencia:

- La transición temprana mejora el control metabólico**
- La tasa de abandonos en ausencia de un programa formal de transición es elevada.
- La adolescencia es un momento de alto riesgo de hospitalización
- Las complicaciones microvasculares tempranas no son infrecuentes en adolescentes
- La presencia de síntomas depresivos en el niño y adolescente con DM tipo 1 es el doble que en población no diabética

43

Respecto al espermatozoides, la palabra astenospermia hace referencia a:

- Volumen
- Cantidad expresada en millones/ml
- Movilidad**
- Morfología
- Tamaño

44

En cuanto a la ecografía y su aplicación en nutrición, señale la respuesta falsa:

- Es una técnica rápida y accesible
- Es portátil y no invasiva
- Disponemos actualmente de medidas estandarizadas para edad y sexo**
- Existe riesgo de interferencia por errores técnicos y alteraciones anatómicas
- Todas las respuestas son falsas

45

¿Cuál de estas acciones no es responsabilidad de las y los profesionales de endocrinología?

- Ruta asistencial diabetes mellitus.
- Mejorar el control de la diabetes mellitus en el área de influencia del centro de trabajo.
- Actualizar el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado**
- Optimizar el control de la diabetes en el ámbito hospitalario
- Promover el uso racional de la terapia farmacológica para el control de la diabetes mellitus.