

[Página Principal](#) > [Mis cursos](#) > [DF-CEU](#) >

Módulo 4: Actualización en cuidados en las urgencias pediátricas y gineco-obstétricas >

[Prueba de conocimientos 4](#)

Comenzado el	lunes, 26 de diciembre de 2022, 13:02
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 26 de diciembre de 2022, 13:13
Tiempo empleado	11 minutos 1 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sospecharemos de una preeclamsia en una mujer embarazada, cuando entre otras cosas presente

Seleccione una:

- a. TAS de 120 mmHg y TAD de 80 mmHg
- b. TAS mayor que 160 mmHg y TAD mayor que 110mmHg en dos tomas separadas ✓
- c. Hipotensión mantenida
- d. TAS mayor que 150 mmHg y TAD mayor que 100mmHg

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El útero es normal, sólo ante una

Seleccione una:

- a. Vasa previa ✓
- b. Rotura Uterina
- c. Desprendimiento de placenta
- d. Placenta previa

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En urgencias gineco-obstétricas, el acrónimo DPPNI significan

Seleccione una:

- a. Diabetes Prevention Program Natural Incubation
- b. Diagnostico Potencial de Parada No Irreversible
- c. Desprendimiento Prematuro de Placenta Normolinserta ✓

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los tipos de rotura uterina son

Seleccione una:

- a. Completa y parcial o incompleta ✓
- b. Total y No total
- c. Primaria y Secundaria
- d. Alta y Baja

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El único ítem que no se modifica en la escala de Glasgow pediátrica es

Seleccione una:

- a. Respuesta motora
 - b. Respuesta verbal
 - c. Apertura de ojos ✓
 - d. La GCS puede ser de "0" (cero)
-

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La puntuación de menor gravedad en la escala de Downes-Wood

Seleccione una:

- a. De 1 a 3 puntos ✓
 - b. De 4 a 7 puntos
 - c. De 8 a 14 puntos
 - d. Más de 14 puntos
-

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es una abruptio placentae lo mismo que un desprendimiento de placenta

Seleccione una:

- a. No
 - b. Sólo en mujeres que hablen latín
 - c. Si ✓
 - d. Varía si es anterior o posterior
-

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Son factores de riesgo de atonía uterina, todos menos uno, indica cual

Seleccione una:

- a. Parto prolongado
 - b. Múltipara
 - c. Parto prematuro ✓
 - d. Desprendimiento Prematuro de Placenta NormoInserta
-

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Por debajo de que frecuencia cardiaca necesita un recién nacido compresiones torácicas de reanimación

Seleccione una:

- a. 100 lpm
- b. 60 lpm ✓
- c. 110 lpm
- d. 120 lpm

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una DPPNI es

Seleccione una:

- a. Un tipo de aborto
- b. Igual que una vasa previa
- c. Despegamiento de la placenta antes de la salida del feto ✓
- d. Sólo se produce en el periodo de alumbramiento del parto

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La clasificación de Taussig se aplica para valorar la gravedad de

Seleccione una:

- a. Procesos respiratorios ✓
 - b. Insuficiencia cardiaca
 - c. Alergia cutánea
 - d. Dermatitis
-

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El babeo en el niño enfermo no está presente por norma general

Seleccione una:

- a. Laringitis viral ✓
 - b. Epiglotitis aguda
 - c. Traqueitis bacteriana
 - d. Absceso retrofaríngeo
-

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las medidas físicas para reducir la fiebre de un niño, los baños templados deberán estar a

Seleccione una:

- a. 1°C por debajo de la temperatura del niño ✓
 - b. 2° por debajo
 - c. A la misma temperatura que el niño
 - d. 1° por encima para conseguir la transferencia transversa de temperatura inversa
-

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La puntuación a partir de la cual se determina gravedad en la escala de trauma pediátrica es

Seleccione una:

- a. 8 ✓
 - b. 6
 - c. 5
 - d. 10
-

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La presencia de múltiples fracturas o alguna fractura abierta, en el Trauma Score pediátrico implica

Seleccione una:

- a. Restar 2 puntos (-2)
- b. Restar 1 punto (-1) ✓
- c. Sumar 1 punto (+1)
- d. Sumar 2 puntos (+2)

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No es un parámetro genérico de ventilación mecánica pediátrica

Seleccione una:

- a. En menores de 6 meses de 30-40 respiraciones/min
- b. Peep de 3 a 5 cmH₂O
- c. Peep de 5 a 10 cmH₂O ✓
- d. Entre 6 meses y 5 años de 20 a 30 respiraciones/min

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No es una medida para liberar presión sobre el cordón umbilical, en caso de prolapso

Seleccione una:

- a. Posición de Trendelenburg
 - b. Lateralización opuesta a la posición del cordón
 - c. Empujar el cordón ✓
 - d. Desplazar la presentación en sentido cefálico
-

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La relación de compresiones : ventilaciones torácicas para una RCP básica realizada por personal sanitario de un paciente pediátrico será

Seleccione una:

- a. 30:2
- b. 100-120 min
- c. 15:2 ✓
- d. 15:15

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la intubación pediátrica, los múltiples intentos y el consiguiente aumento de edema, nos llevarán

Seleccione una:

- a. Aumentar el diámetro del tubo necesario
- b. Cesar los intentos
- c. Buscar alternativas
- d. Disminuir el diámetro del tubo elegido ✓

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la escala de trauma pediátrica, que peso aumenta la puntuación en un punto (+1)

Seleccione una:

- a. mayor que 20 Kg
- b. Entre 10 a 20 Kg ✓
- c. menor que 10 Kg
- d. menor que 5 Kg

Actividad previa

◀ Documentación complementaria

Ir a...

Siguiente actividad

Caso práctico: Actualización en cuidados en las urgencias pediátricas y gineco-obstétricas ►

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>