

Comenzado el	
Estado	Finalizado
Finalizado en	
Tiempo empleado	1 hora 19 minutos
Puntos	25,00/30,00
Calificación	8,33 de 10,00 (83%)
Comentario -	Apto

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Paciente que acude a la consulta de Atención Primaria con una actitud distante, desconectada y huidiza, evita las relaciones sociales, con carencias afectivas hacia su familia. ¿A qué tipo de trastorno de la personalidad responde este perfil?

Seleccione una:

a.
Esquizoide.

b.
Neurótica.

c.

Antisocial.

d.

Narcisista.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esquizoide.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Los trastornos de la sexualidad se pueden dividir en:

Seleccione una:

a.

Disfunciones sexuales.

b.

Parafilias.

c.

Trastornos de la identidad sexual.

d.

Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Qué trastorno se caracteriza por uno o más episodios maníacos, generalmente alternando con episodios de depresión mayor?

Seleccione una:

-
- a.
Trastorno bipolar tipo I.
-
- b.
Depresión endógena.
-
- c.
Trastorno esquizofrénico.
-
- d.
Ciclotimia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Trastorno bipolar tipo I.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

La definición: “Conjunto de signos y síntomas que aparecen cuando de forma brusca se interrumpe el consumo de una sustancia a la cual tiene dependencia o la que ingiere es insuficiente” se refiere a:

Seleccione una:

-
- a.
Abuso de sustancias.
-
- b.
Adicción.
-
- c.
Síndrome de abstinencia.
-
- d.
Desintoxicación física.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síndrome de abstinencia.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

En relación a la posibilidad de que un paciente presente un intento de suicidio, ¿Cuál de estas afirmaciones es VERDADERA?

Seleccione una:

a.

El riesgo de suicidio no se asocia a la depresión.

b.

Las personas casadas tienen más riesgo de suicidio que las divorciadas.

c.

El porcentaje de suicidio aumenta en personas con antecedentes de intento de suicidio previo.

d.

Las personas menores de 19 años o mayores de 45 presentan menos tasa de suicidio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El porcentaje de suicidio aumenta en personas con antecedentes de intento de suicidio previo.

Pregunta **6**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

En la actualidad la terapia electroconvulsiva (TEC)

Seleccione una:

a.

No se utiliza.

b.

Se utiliza para cualquier patología psiquiátrica.

c.

Está indicada en la esquizofrenia.

d.

Está indicada en estados de depresión grave o manía resistentes a otros tratamientos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está indicada en estados de depresión grave o manía resistentes a otros tratamientos.

Pregunta **7**
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Según la OMS el suicidio:

Seleccione una:

a.

No es una prioridad de salud pública.

b.

Es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo.

c.

Se produce solo en países de altos ingresos.

d.

No es prevenible.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo.

Pregunta **8**
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Los síntomas graves de ansiedad después de experimentar un evento traumático se denomina:

Seleccione una:



a.
Trastorno de estrés postraumático.



b.
Trastorno mental.



c.
Trastorno depresivo.



d.
Trastorno obsesivo-compulsivo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Trastorno de estrés postraumático.

Pregunta **9**
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

En la anorexia nerviosa restrictiva el paciente:

Seleccione una:



a.
Provoca habitualmente el vómito.



b.
Realiza purgas con frecuencia.



c.
No recurre regularmente a atracones.



d.
Hace un uso excesivo de laxantes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No recurre regularmente a atracones.

Pregunta **10**
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

El manual de Diagnósticos y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) incluye:

Seleccione una:

a.
Dependencia al móvil.

b.
Dependencia a internet.

c.
Juego patológico.

d.
Dependencia a las relaciones tóxicas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Juego patológico.

Pregunta **11**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la Salud Mental, los trastornos que aparecen con mayor frecuencia a lo largo de la vida son:

Seleccione una:

a.
Trastornos depresivos.

b.
Trastornos de ansiedad.

c.
Trastornos derivados del consumo del alcohol.

d.
Trastornos derivados del consumo de tóxicos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Trastornos depresivos.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿En qué situación se sospecharán sobredosis por opiáceos?

Seleccione una:

a.
Cuando aparecen trastornos de conducta y crisis convulsiva.

b.
Cuando aparece miosis, depresión respiratoria y coma.

c.
Cuando aparecen euforia, HTA y taquicardia.

d.
Cuando aparecen paranoia y violencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando aparece miosis, depresión respiratoria y coma.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

La forma de comienzo de la esquizofrenia puede ser:

Seleccione una:

a.

De forma aguda o de forma insidiosa.

b.

De forma residual.

c.

De forma suspicaz.

d.

Las respuestas b y c son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De forma aguda o de forma insidiosa.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

En los pacientes con esquizofrenia es un síntoma positivo de enfermedad:

Seleccione una:

a.

El escaso autocuidado.

b.

Las ideas delirantes.

c.

El embotamiento afectivo.

d.

La pobreza de lenguaje y pensamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las ideas delirantes.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas manifestaciones no se corresponde con la anorexia nerviosa?

Seleccione una:

-
- a.
Comienzo siempre después de la pubertad.
-
- b.
Pérdida significativa de peso.
-
- c.
Distorsión de la imagen corporal.
-
- d.
Trastornos endocrino generalizado que afecta al sistema hipotalámico-hipofisario-gonadal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comienzo siempre después de la pubertad.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Son drogas activadoras del SNC?

Seleccione una:

-
- a.
Alcohol, anfetaminas y nicotina.
-
- b.
Nicotina, cocaína y los hipnóticos.
-
- c.
Cocaína y anfetaminas.
-
- d.

Heroína y cocaína (cuando se administran juntas).

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cocaína y anfetaminas.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Qué identifica la escala de Plutchick?

Seleccione una:

a.
La imagen corporal.

b.
Pacientes con tentativa de suicidio.

c.
Actitudes ante la alimentación.

d.
Mide la modificación de las conductas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pacientes con tentativa de suicidio.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

En la anorexia nerviosa, ¿cuál de los siguientes es un factor de buen pronóstico?

Seleccione una:

a.
Rasgos de personalidad histriónica.

- b. Atracciones o abusos de laxantes.
- c. Presencia de vómitos autoinducidos.
- d. Rasgos de personalidad obsesivo-compulsiva.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rasgos de personalidad histriónica.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

La enfermera, en el momento de hacer la valoración de enfermería a una persona, debe tener en cuenta que los síntomas negativos de la esquizofrenia son:

Seleccione una:

-
- a. Lenguaje y pensamiento desorganizado, alucinaciones y comportamiento desorganizado.
- b. Retraimiento social, ideas delirantes, alucinaciones, falta de energía y motivación.
- c. Trastornos emocionales, alogia, falta de energía y motivación, abulia y retraimiento social.
- d. Abulia, alogia, ideas delirantes, lenguaje y pensamiento desorganizado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Trastornos emocionales, alogia, falta de energía y motivación, abulia y retraimiento social.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Respecto a la evaluación y entrevista de enfermería a un paciente con amenaza de suicidio, señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

a. Siempre debe tomarse en serio toda amenaza de suicidio aunque parezca manipuladora.

b. Preguntar por la intencionalidad suicida es potenciar la misma.

c. La intervención en crisis no tiene como finalidad convencer al paciente.

d. Durante la entrevista debemos escuchar, para adoptar la actitud más conveniente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Preguntar por la intencionalidad suicida es potenciar la misma.

Pregunta **21**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Respecto a la esquizofrenia tipo paranoide, señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

a. Es el tipo más frecuente de esquizofrenia.

b. No hay lenguaje desorganizado.

c. Es frecuente afectividad aplanada o inapropiada.



d.
No hay comportamiento catatónico o desorganizado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es frecuente afectividad aplanada o inapropiada.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación incorrecta respecto a las características de la personalidad histriónica:

Seleccione una:



a.
Pertenece al grupo B de los trastornos de la personalidad.



b.
Carece de empatía por los demás.



c.
Se siente incómodo cuando no es el centro de atención.



d.
Actúa con un comportamiento sexualmente seductor.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Carece de empatía por los demás.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Criterio para el diagnóstico de la bulimia nerviosa:

Seleccione una:



- a.
Episodios frecuentes de ingesta compulsiva 2 o más por semana y durante más de tres meses.
-
- b.
Rechazo a mantener el peso dentro de parámetros por encima del 85% del peso teórico.
-
- c.
Alteración de la percepción del tamaño del cuerpo.
-
- d.
Miedo a la ganancia de peso.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Episodios frecuentes de ingesta compulsiva 2 o más por semana y durante más de tres meses.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Es criterio de la anorexia nerviosa:

Seleccione una:

-
- a.
Peso corporal significativamente bajo.
-
- b.
Dismenorrea.
-
- c.
Amenorrea.
-
- d.
Miedo intenso a perder peso.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Peso corporal significativamente bajo.

Pregunta **25**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

En relación a la conducta suicida, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

Seleccione una:

a.

Los factores de riesgo pueden clasificarse en modificables e inmodificables.

b.

Los ancianos presentan tasas de suicidio inferiores a los adolescentes.

c.

Un bajo nivel educativo se asocia también con un aumento del riesgo de suicidio.

d.

La conducta suicida es más frecuente entre individuos solteros y divorciados.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los ancianos presentan tasas de suicidio inferiores a los adolescentes.

Pregunta **26**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes manifestaciones no es propia del trastorno disocial?

Seleccione una:

a.

Destrucción de la sociedad.

b.

Violación de las normas.

c.

Delirios.

d.
Agresión a personas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Agresión a personas.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

De los siguientes trastornos, ¿cuál no es considerado un trastorno de ansiedad?

Seleccione una:

a.
Trastorno obsesivo-compulsivo.

b.
Trastorno de personalidad límite.

c.
Fobia social.

d.
Trastorno de estrés postraumático

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Trastorno de personalidad límite.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Entre los efectos más frecuentes del cannabis señala la opción incorrecta:

Seleccione una:

a.
Locuacidad.

-
- b. Euforia.
-
- c. Desinhibición.
-
- d. Somnolencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Euforia.

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) incluye:

Seleccione una:

-
- a. Dependencia al móvil.
-
- b. Juego patológico.
-
- c. Dependencia a internet.
-
- d. Ciberadicción.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Juego patológico.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

El test de Manchester Self-Harm para la conducta suicida, consta de las siguientes preguntas, señala la opción incorrecta:

Seleccione una:

a.

¿Tiene antecedentes de conducta suicida?

b.

¿Vive solo?

c.

¿Está actualmente en tratamiento psiquiátrico?

d.

¿El episodio actual es por sobredosis de benzodiazepinas?

Retroalimentación

La respuesta correcta es: ¿Vive solo?