



EVALUACIÓN

Módulo 2

1 — El trastorno por estrés postraumático engloba dos aspectos incluidos en el diagnóstico: el estrés y el trauma. ¿Cuál es la etimología de la palabra trauma?

- ☐ a ) Palabra originaria del latín que significa 'dolor'.
- ☒ b ) Palabra originaria de griego que significa 'herida'.
- ☐ c ) Palabra que proviene del latín que indica 'golpe'.
- ☐ d ) Palabra originaria del sumerio que significa 'hundido'.
- ☐ e ) Palabra originaria del griego que indica 'colaphus'.

2 — No es un motivo que propicia la práctica del chemsex:

- ☐ a ) Aumentar la libido.
- ☒ b ) Potenciar estados disfóricos.
- ☐ c ) Prolongar la duración de las sesiones.
- ☐ d ) Facilitar prácticas sexuales que podrían ser dolorosas.
- ☐ e ) Facilitar la desinhibición.

3 — A nivel educativo, el fenómeno que supone que los estudiantes no acaben sus actividades hasta el último momento se denomina:

- ☒ a ) Procrastinación académica.
- ☐ b ) Rendimiento académico.
- ☐ c ) Absentismo.
- ☐ d ) Fracaso escolar.
- ☐ e ) Abandono escolar.

4 — ¿Cuál es la población diana del cuestionario de salud EuroQol-5D?

- ☐ a ) Pacientes que sufren esquizofrenia.
- ☒ b ) Población general.
- ☐ c ) Pacientes con enfermedades crónicas.
- ☐ d ) Pacientes bipolares.
- ☐ e ) Pacientes de salud mental.

5 — ¿Cuál es la escala utilizada para medir el bienestar percibido?

- ☐ a ) Escala de Depresión de Beck.
- ☐ b ) Escala de Ansiedad de Hamilton.
- ☒ c ) Escala de Evaluación de la Calidad de Vida.
- ☐ d ) Escala de Evaluación de la Salud Mental.
- ☐ e ) Escala de Salud General de Goldberg.

6 — ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre el chemsex es correcto?

- ☒ a ) Es un problema de salud pública global.
- ☐ b ) Afecta a un colectivo que está expuesto a bajo riesgo.
- ☐ c ) Los pacientes que practican chemsex no necesitan de intervenciones sanitarias específicas.
- ☐ d ) Los profesionales de salud mental necesitan una mayor formación.
- ☐ e ) No es importante anticiparse a las necesidades de dichos pacientes.

7 — ¿Qué síntomas se pueden presentar en la entidad clínica del trastorno por estrés postraumático en una persona que se ha visto sometida a un hecho traumático y que puede ser especialmente vulnerable?

- ☐ a ) La respuesta c es correcta.
- ☐ b ) Comportamiento evitativo.
- ☐ c ) Sentimientos de fenómenos invasores.
- ☐ d ) Hipervigilancia.
- ☒ e ) Las respuestas b, c y d son correctas.

8 — Entre los siguientes cuestionarios o escalas, ¿cuál sería el más idóneo para evaluar las habilidades básicas de la vida diaria en las personas con diagnóstico de trastorno mental de larga evolución?

- ☐ a ) CSCV (Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida).
- ☐ b ) MHIQ (McMaster Health Index Questionnaire).
- ☒ c ) BELS (Basic Everyday Living Skills).
- ☐ d ) Cuestionario de salud general de Goldberg GHQ-28 (General Health Questionnaire-28 items).
- ☐ e ) WHO-DAS II (World Health Organization's Disability Assessment Scale II).

9 — ¿Cuál es la versión corta del cuestionario de bienestar percibido?

- ☐ a ) OHQ-29.
- ☒ b ) OHQ-SF.
- ☐ c ) BDI-II.
- ☐ d ) HAM-A.
- ☐ e ) GAD-7.

10 — Gran parte de las estrategias o planes preventivos sobre el suicidio se dirigen a aquellos sujetos que ya han presentado alguna forma de:

- ☐ a ) Ideación suicida.
- ☐ b ) Amenaza suicida.
- ☒ c ) Comportamiento suicida.
- ☐ d ) Comunicación suicida.
- ☐ e ) Pacto suicida.