

Pregunta 1

504.- Si el nervio afectado es el radial bajo, la pérdida motora será:

Seleccione una:

- a. Flexión plantar dedos y tobillo.
- b. Extensión de muñeca y dedos. Correcta Bien, correcto !!**
- c. Flexión de muñeca y dedos.
- d. Extensión del codo.

Pregunta 2

501.- Según la clasificación de las fracturas de pelvis, que tipo sería una disyunción sacroiliaca:

Seleccione una:

- a. Tile A2.
- b. Tile B3.
- c. Tile C1.2. Correcta Bien, correcto !!**
- d. Tile B2.2.

Pregunta 3

153.- En la clasificación Tile, la fractura Tile tipo A es:

Seleccione una:

- a. A) Inestable rotacional.
- b. B) Inestable vertical.
- c. C) Estable. Correcta Bien, correcto!**
- d. D) Todas son falsas.

Pregunta 4

160.- En una amputación traumática el miembro amputado tiene una viabilidad, si no es introducido en hielo, de:

Seleccione una:

- a. A) 2 horas.
- b. B) 4-6 horas. Correcta Bien, correcto!**
- c. C) 10-12 horas.
- d. D) 18 horas.

Pregunta 5

156.- ¿Cuál es la lesión neurológica más frecuente en las fracturas de pelvis?

Seleccione una:

- a. A) Plexo femoral.
- b. B) Plexo lumbosacro.
- c. C) Neuropraxia. Correcta Bien, correcto!**
- d. D) Todas son falsas.