

[Página Principal](#)[Mis cursos](#)[PERI-2](#)[Examen final](#)[Caso Clínico 1](#)

<b>Comenzado el</b>	miércoles, 25 de octubre de 2023, 01:22
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	miércoles, 25 de octubre de 2023, 01:24
<b>Tiempo empleado</b>	2 minutos 33 segundos
<b>Puntos</b>	6,00/6,00
<b>Calificación</b>	<b>10,00</b> de 10,00 (100%)
<b>Comentario -</b>	Apto

#### Información

G.R.P. Varón de 75 años de edad, ingresa en el hospital para practicarle un recambio de válvula aórtica. Tras la intervención pasa a la Unidad de UCI quirúrgica, termodinámicamente estable, con marcapasos externo, tubos de mediastino como drenaje, oxigenoterapia por gafas nasales a 4 litros por minuto, sonda vesical con diuresis clara y vía yugular externa con fluidoterapia de mantenimiento

#### Pregunta

**1****Correcta**

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la fase catabólica tras una operación se producen algunas alteraciones que influyen en la nutrición. Señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Inhibición del peristaltismo intestinal.
- b. Aumento del catabolismo proteico
- c. Balance positivo de nitrógenos ✓
- d. Entre las 12 y 48 horas siguientes puede aparecer retención de sodio,

La respuesta correcta es: Balance positivo de nitrógenos

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

En la extracción de muestras previas a la cirugía pueden cometerse algunos errores. Señale la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Errores de identificación de paciente
- b. No homogenización de la muestra.
- c. Extracción exageradamente lenta.
- d. Llenado suficiente de tubos de muestra. ✓

La respuesta correcta es: Llenado suficiente de tubos de muestra.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

A G. P.R. se le debe realizar una gasometría: ¿Que factores pueden alterar los resultados? Señale la incorrecta

Seleccione una:

- a. Oxigenoterapia.
- b. Posición del paciente ✓
- c. Broncodilatadores.
- d. Tabaco.

La respuesta correcta es: Posición del paciente

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

A G.P.R. se le va a realizar una anestesia general. ¿Cuándo no indicada la anestesia general? Señale la incorrecta

Seleccione una:

- a. Lactantes y niños hasta 7 años ✓
- b. En la mayoría de las cirugías de urgencia
- c. En politraumatizados graves
- d. En cirugía de vía aérea.

La respuesta correcta es: Lactantes y niños hasta 7 años

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Tras la intervención quirúrgica G.P.R. sufre una hemorragia y como consecuencia de ella entra shock. La fase no compensada del shock se caracteriza por : Señale la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Hipoxemia grave.
- b. Hipertensión. ✓
- c. Deterioro neurológico.
- d. Acidosis metabólica.

La respuesta correcta es: Hipertensión.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

¿Que tipo de shock ha sufrido el paciente?

Seleccione una:

- a. Cardiogénico.
- b. Anafiláctico.
- c. Hipovolémico. ✓
- d. Séptico.

Actividad previa

◀ Examen 1

Ir a...



Siguiente actividad

Encuesta de satisfacción  
del alumnado al finalizar  
la acción formativa ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>