



[Página Principal](#)

[Mis cursos](#)

[PERI-2](#)

[Examen final](#)

[Examen 1](#)

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Una unidad de concentrado de hematíes incrementa la Hb en un paciente adulto de 70 kg de peso, aproximadamente en:

Seleccione una:

- a. 1 gr/dl. ✓
- b. 3 gr/dl.
- c. 5 gr/dl.
- d. 7 gr/dl.

La respuesta correcta es: 1 gr/dl.

Pregunta

27

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Sobre la evidencia científica de las recomendaciones del CDC referidas a la categoría II:

Seleccione una:

- a. Se recomienda su aplicación en todos los hospitales.
- b. Sólo se recomienda su aplicación a determinados hospitales.
- c. Sobre las recomendaciones de esta categoría existen evidencias insuficientes. ✗
- d. Todas las anteriores respuestas son falsas.

La respuesta correcta es: Sólo se recomienda su aplicación a determinados hospitales.

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Sobre los pacientes ASA II:

Seleccione una:

- a. Son pacientes saludables no sometidos a cirugía electiva.
- b. Son pacientes con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante.
- c. Son pacientes con enfermedad sistémica leve controlada y no incapacitante relacionada con la causa de la intervención.
- d. Son pacientes con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante relacionada o no con la causa de la intervención. ✓

La respuesta correcta es: Son pacientes con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante relacionada o no con la causa de la intervención.

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando un paciente debe someterse a una intervención quirúrgica:

Seleccione una:

- a. Debe observar ayuno absoluto durante las 24 horas previas con ingesta liberalizada de líquidos.
- b. Debe observar ayuno absoluto durante las 12 horas previas con ingesta liberalizada de líquidos.
- c. Debe observar ayuno durante las 12 horas previas con ingesta de líquidos hipocalóricos hasta 4 horas antes. ✓
- d. Debe observar ayuno durante las 12 horas previas con ingesta de líquidos hipercalóricos hasta 4 horas antes.

La respuesta correcta es: Debe observar ayuno durante las 12 horas previas con ingesta de líquidos hipocalóricos hasta 4 horas antes.

Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes protocolos para el mejor y más eficaz tratamiento del dolor postoperatorio no es cierto?

Seleccione una:

- a. No planificar el tratamiento analgésico ya desde la fase preoperatoria. ✓
- b. Iniciar el tratamiento del dolor postoperatorio durante la intervención.
- c. Intentar realizar siempre que sea posible analgesia eficaz con una disminución en la aparición de efectos adversos.
- d. Seleccionar el protocolo de tratamiento en función del tipo de intervención quirúrgica.

La respuesta correcta es: No planificar el tratamiento analgésico ya desde la fase preoperatoria.

Pregunta

31

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes sería el diagnóstico enfermero más apropiado en un paciente con shock hipovolémico?

Seleccione una:

- a. Disminución del gasto cardíaco ✓
- b. Oxigenoterapia
- c. Control de infecciones
- d. Mejora de la ansiedad

La respuesta correcta es: Disminución del gasto cardíaco

Pregunta

32

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Las hemorragias venosas suelen caracterizarse por:

Seleccione una:

- a. La fragilidad estructural de las venas facilita su rotura.
- b. La sangre que mana suele ser espesa y de color rojo oscuro.
- c. La salida de sangre sigue un patrón continuo.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

33

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La Enfermería Basada en la Evidencia:

Seleccione una:

- a. Supone una herramienta esencial.
- b. Aporta racionalidad en el uso de los recursos.
- c. Ninguna de las anteriores.
- d. A y b son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta

34

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La lámina 10 de Rexed se sitúa en:

Seleccione una:

- a. Asta medular anterior.
- b. Asta medular posterior.
- c. Zona intermedia.
- d. Sustancia gris periependimaria. ✓

La respuesta correcta es: Sustancia gris periependimaria.

Pregunta

35

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

A la hora de introducir material al campo estéril:

Seleccione una:

- a. Lo harán los miembros del equipo no lavados. ✓
- b. Los paquetes se abren de cualquier manera, tan sólo tener la precaución de que no se caigan al suelo.
- c. Cuando es una solución, se echa con fuerza sobre el recipiente, que estará colocado en el centro de la mesa, para que no gotee sobre el campo.
- d. Todas son ciertas.

La respuesta correcta es: Lo harán los miembros del equipo no lavados.

Pregunta

36

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Referente al sistema renina-angiotensina-aldosterona es cierto que:

Seleccione una:

- a. La angiotensina I tiene efectos sobre el sistema circulatorio
- b. La angiotensina I se convierte en angiotensina II a nivel pulmonar
- c. La angiotensina II tiene efecto vasoconstrictor ✘
- d. B y C son ciertas

La respuesta correcta es: B y C son ciertas

Pregunta

37

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El riesgo de infección quirúrgica es:

Seleccione una:

- a. Inversamente proporcional a la dosis de contaminación bacteriana.
- b. Directamente proporcional a la resistencia del huésped.
- c. Inversamente proporcional a la virulencia del microorganismo.
- d. Todas las anteriores respuestas son falsas. ✔

La respuesta correcta es: Todas las anteriores respuestas son falsas.

Pregunta

38

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Una de las características de los procedimientos quirúrgicos es:

Seleccione una:

- a. Que a veces provocan hemorragias. ✘
- b. Si se toman las medidas adecuadas nunca se producirá sangrado.
- c. Que siempre se origina un sangrado.
- d. Los procedimientos quirúrgicos más simples no originan hemorragias.

La respuesta correcta es: Que siempre se origina un sangrado.

Pregunta

39

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre los riesgos potenciales de infección se encuentran:

Seleccione una:

- a. El uso de medicación antihipertensiva.
- b. El uso de inmunosupresores.
- c. La colonización nasal preoperatoria por *Staphylococcus aureus*.
- d. B y c son correctas. ✓

La respuesta correcta es: B y c son correctas.

Pregunta

40

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Tras una intervención quirúrgica se producen cambios metabólicos como:

Seleccione una:

- a. Balance de nitrógeno positivo.
- b. Disminución de la oxidación y utilización de carbohidratos. ✓
- c. Hipoglucemia persistente.
- d. Descenso de la pérdida urinaria de electrolitos.

La respuesta correcta es: Disminución de la oxidación y utilización de carbohidratos.

Pregunta

41

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

A la hora de valorar a la cuidadora.

Seleccione una:

- a. Es necesario conocer qué sabe del tratamiento médico que va a seguir el paciente.
- b. Es necesario saber si dispone de ayuda en el cuidado.
- c. Conviene saber si sabe leer y escribir.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

42

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La prestación por riesgos durante el embarazo la solicita:

Seleccione una:

- a. La trabajadora. ✓
- b. La empresa.
- c. Ambos indistintamente.
- d. El médico de empresa.

La respuesta correcta es: La trabajadora.

Pregunta

43

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En la espirometría forzada, el índice de Tiffeneau hace referencia a:

Seleccione una:

- a. La relación FEV1/FVC. ✓
- b. La relación FEF25%-75%/FVC.
- c. La relación CRF/CPT.
- d. La relación FEV1/CPT.

La respuesta correcta es: La relación FEV1/FVC.

Pregunta

44

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En la colostomía:

Seleccione una:

- a. Está alterada la absorción de nutrientes, aunque la motilidad intestinal no sufre modificación.
- b. Se altera la motilidad intestinal, aunque el nivel de aprovechamiento de nutrientes es adecuado.
- c. Se debe evitar inicialmente la ingestión de alimentos flatulentos y productos integrales. ✓
- d. Se debe limitar la ingesta de agua para evitar la aparición de diarreas.

La respuesta correcta es: Se debe evitar inicialmente la ingestión de alimentos flatulentos y productos integrales.

Pregunta

45

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿A qué grupo del lenguaje enfermero pertenecería la gestión del equilibrio ácido-base: acidosis respiratoria?

Seleccione una:

- a. Intervenciones NIC ✓
- b. Grupo relacionado con Diagnóstico
- c. Resultados NOC
- d. Diagnóstico de enfermería real NANDA

La respuesta correcta es: Intervenciones NIC

Pregunta

46

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En la valoración de seguridad del paciente.

Seleccione una:

- a. Es necesario contemplar datos biológicos de los pacientes.
- b. Es conveniente incluir los conocimientos que tiene sobre seguridad
- c. Conviene saber la actitud del paciente sobre la prevención.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

47

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Señale la opción incorrecta en relación al Metamizol:

Seleccione una:

- a. La acción analgésica es dosis dependiente. ✗
- b. No se puede administrar a pacientes con hipersensibilidad a las pirazolonas.
- c. En infusión intermitente se administra diluido y en 10 minutos.
- d. La dosis diaria intravenosa es de 2 gr/6-8 horas.

La respuesta correcta es: En infusión intermitente se administra diluido y en 10 minutos.

Pregunta

48

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La resolución del microscopio electrónico de barrido es de:

Seleccione una:

- a. Una calidad extraordinaria.
- b. Entre 1 y 20 nanómetros. ✓
- c. Aproximadamente 0,002 milímetros.
- d. Cerca de 10 micrometros.

La respuesta correcta es: Entre 1 y 20 nanómetros.

Pregunta

49

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El alcohol más empleado como antiséptico es:

Seleccione una:

- a. Alcohol metílico.
- b. Alcohol isopropílico.
- c. Alcohol etílico. ✓
- d. Alcohol isobutírico.

La respuesta correcta es: Alcohol etílico.

Pregunta

50

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En relación a la administración de fármacos por vía intravenosa directa señale la opción falsa:

Seleccione una:

- a. La administración dura entre 30 a 60 minutos. ✓
- b. Se recomienda diluir el medicamento en la jeringa con una cantidad adicional de solución salina o agua para inyectables, antes de su administración
- c. Se administran los medicamentos, tal como vienen presentados directamente en la vena.
- d. Se administran los medicamentos, tal como vienen presentados en el punto de inyección que disponen los equipos de administración, palomita o catéter.

Actividad previa

◀ Evaluación final
Módulo 4:
autoevaluación
asignatura 15

Ir a...



Siguiente actividad

Caso Clínico 1 ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>