



[Página Principal](#) > [Mis cursos](#) > [AV.Q079_24](#) > [Evaluación Febrero](#) >

[Curso: Cuidados enfermeros en las urgencias otorrinolaringológicas y oftálmicas en el ámbito asistencial de las emergencias extrahospitalarias](#)

Comenzado el	viernes, 16 de febrero de 2024, 21:11
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 16 de febrero de 2024, 23:39
Tiempo empleado	2 horas 28 minutos
Puntos	27,00/30,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)
Comentario -	Apto



Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En el tratamiento local de la epistaxis, se debe:

Seleccione una:

- a. Realizar un taponamiento anterior de la fosa nasal permaneciendo colocado 48 horas. ✓
- b. Cauterizar con nitrato de plata.
- c. Evitar evacuar los coágulos que taponan las fosas nasales.
- d. Realizar un taponamiento posterior que se dejará mínimo 72 horas.

La respuesta correcta es: Realizar un taponamiento anterior de la fosa nasal permaneciendo colocado 48 horas.





Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué es la enfermedad de Ménière?

Seleccione una:

- a. Es una inflamación del oído interno que puede ser de origen bacteriano o viral.
- b. Es un desequilibrio anormal de los líquidos del oído por absorción deficiente en el saco endolinfático. ✓
- c. Es un período breve de vértigo incapacitante, que ocurre cuando la posición de la cabeza del paciente cambia con respecto a la gravedad.
- d. Es un trastorno del equilibrio.

La respuesta correcta es: Es un desequilibrio anormal de los líquidos del oído por absorción deficiente en el saco endolinfático.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué prueba diagnóstica se utiliza para diferenciar glaucoma de ángulo cerrado y de ángulo abierto?

Seleccione una:

- a. Tonometría.
- b. Gonioscopia. ✓
- c. Carta de Snellen.
- d. Lámpara de hendidura.

La respuesta correcta es: Gonioscopia.





Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Se realizarán test vestibulares en una exploración otorrinolaringológica, siendo éstos:

Seleccione una:

- a. Test de Nysten-Barany y Romberg. ✓
- b. Test de Alien.
- c. Test de Weber.
- d. Test de Rinne.

La respuesta correcta es: Test de Nysten-Barany y Romberg.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La opacidad del cristalino del ojo, se denomina:

Seleccione una:

- a. Catarata. ✓
- b. Presbicia.
- c. Glaucoma.
- d. Degeneración maculopapilar.

La respuesta correcta es: Catarata.





Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La presencia de escamas palpebrales son propias de:

Seleccione una:

- a. Chalazión.
- b. Blefaritis. ✓
- c. Orzuelo.
- d. Pterigión.

La respuesta correcta es: Blefaritis.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué diferencia hay entre epistaxis y rinorragia?

Seleccione una:

- a. Rinorragia es un sangrado abundante y epistaxis es corto.
- b. Es lo mismo. ✓
- c. En la rinorragia el sangrado es de las fosas nasales y en la epistaxis es de la propia nariz.
- d. En cuanto a la epistaxis, la causa es un traumatismo y en cuanto a la rinorragia es una hipertensión arterial.

La respuesta correcta es: Es lo mismo.



Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En cuál de las siguientes situaciones está contraindicado extraer un tapón de cerumen por irrigación de agua.

Seleccione una:

- a. Sospecha de perforación timpánica. ✓
- b. Dolor de garganta al tragar fluidos.
- c. Fiebre.
- d. Estapedectomía

La respuesta correcta es: Sospecha de perforación timpánica.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La enfermedad de Ménière puede estar relacionada con las siguientes medidas, excepto con:

Seleccione una:

- a. Uso de fármacos como el ácido acetilsalicílico.
- b. Hipertensión arterial.
- c. Consumo de tabaco y alcohol.
- d. Limpieza con bastoncillos. ✓

La respuesta correcta es: Limpieza con bastoncillos.



Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre los cuidados de enfermería de una persona que ha sufrido una epistaxis se incluye la enseñanza de varias medidas de autocuidado, siendo la correcta:

Seleccione una:

- a. Tomar alimentos calientes y condimentados.
- b. Evitar sonarse la nariz con fuerza. ✓
- c. Realizar barridos suaves con bastoncillos de algodón en la nariz para favorecer la expulsión de coágulos residuales.
- d. En caso de sangrado nasal recurrente, el paciente tendrá que extender el cuello para disminuir la presión en el punto de sangrado.

La respuesta correcta es: Evitar sonarse la nariz con fuerza.





Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Mario es ingresado en la unidad de corta estancia de la urgencia donde trabaja, en el informe pone que presenta hemianopsia, ¿qué significa este hallazgo?

Seleccione una:

- a. Pérdida de visión en medio campo visual. ✓
- b. Movimiento involuntario, rápido y repetitivo del ojo.
- c. Caída permanente del párpado superior.
- d. Pérdida total de visión en ambos ojos.

La respuesta correcta es: Pérdida de visión en medio campo visual.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La irrigación para la extracción de un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo está contraindicada:

Seleccione una:

- a. El cuerpo extraño no ocluye totalmente el conducto auditivo.
- b. El cuerpo extraño no es un fruto seco.
- c. El paciente tuvo antiguamente una infección en el conducto auditivo.
- d. El paciente tiene una lesión timpánica. ✓

La respuesta correcta es: El paciente tiene una lesión timpánica.





Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cristóbal ha tenido una rotura timpánica tras la eliminación de un cuerpo extraño en su oído. ¿Cuál de las siguientes no es una recomendación al alta?

Seleccione una:

- a. Seguir el tratamiento antibiótico pautado.
- b. Taponar el oído para protegerlo y evitar la infección.
- c. No es necesario proteger el oído del agua. ✓
- d. Si no cierra en tres/seis meses, será preciso la reparación quirúrgica.

La respuesta correcta es: No es necesario proteger el oído del agua.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La visión de sombras puede corresponder a:

Seleccione una:

- a. Cataratas.
- b. Desprendimiento de retina. ✓
- c. Queratitis.
- d. Glaucoma.

La respuesta correcta es: Desprendimiento de retina.





Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En la exploración del sistema vestibular, tiene gran significación:

Seleccione una:

- a. Nistagmus. ✓
- b. Otorrea.
- c. Otorragia.
- d. Asteatosis.

La respuesta correcta es: Nistagmus.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Trabaja en un centro de salud laboral de una fábrica, un profesional ha tenido un accidente y ha sufrido una quemadura con lejía en el ojo ¿Durante cuánto tiempo deberemos realizar lavado ocular en este caso?

Seleccione una:

- a. 10 minutos.
- b. 2 días.
- c. 30 min. ✓
- d. 2 horas.

La respuesta correcta es: 30 min.





Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El músculo dilatador de la pupila, cuya inervación corre a cargo del sistema nervioso simpático, cuando se activa, va a provocar:

Seleccione una:

- a. Nistagmus.
- b. Miosis.
- c. Midriasis. ✓
- d. Anopsia.

La respuesta correcta es: Midriasis.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En pacientes con problemas de audición, podemos encontrar los siguientes signos auditivos, excepto:

Seleccione una:

- a. Cerumen.
- b. Enrojecimiento.
- c. Inflamación.
- d. Disminución de la sensibilidad. ✓

La respuesta correcta es: Disminución de la sensibilidad.





Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En un niño que presenta rinorrea unilateral persistente, lo que debemos descartar es:

Seleccione una:

- a. Hipertrofia de adenoides.
- b. Cuerpo extraño. ✓
- c. Sinusitis aguda.
- d. Epistaxis.

La respuesta correcta es: Cuerpo extraño.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Pablo es un niño de 4 años traído al SUAP por rinorrea purulenta y maloliente desde esta mañana por una narina, su madre comenta que parece que le cuesta respirar por la nariz. ¿Qué sospecha que le puede pasar a Pablo?

Seleccione una:

- a. Catarro nasal.
- b. Hipertrofia de adenoides.
- c. Cuerpo extraño nasal. ✓
- d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Cuerpo extraño nasal.





Pregunta

21

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Respecto a la otitis externa, señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Fiebre mayor de 39° C.
- b. Tinnitus. ✘
- c. Mastoiditis.
- d. Hay otorrea clara e inodora.

La respuesta correcta es: Hay otorrea clara e inodora.

Pregunta

22

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

En un barotraumatismo, se utiliza como prueba diagnóstica:

Seleccione una:

- a. Audiometría.
- b. Test de Romberg.
- c. Test de Weber.
- d. Timpanometría. ✘

La respuesta correcta es: Test de Romberg.





Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El cuerpo ciliar de ojo se encuentra en:

Seleccione una:

- a. Capa externa.
- b. Capa media. ✓
- c. Capa interna.
- d. Córnea.

La respuesta correcta es: Capa media.

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿A qué se le llama midriasis?

Seleccione una:

- a. Dilatación de la pupila por encima de 4 mm. ✓
- b. Dilatación de la pupila por encima de 2 mm.
- c. Contracción de la pupila por debajo de 4 mm.
- d. Contracción de la pupila por debajo de 2 mm.

La respuesta correcta es: Dilatación de la pupila por encima de 4 mm.





Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El examen con fluoresceína es muy útil en el diagnóstico de:

Seleccione una:

- a. Ojo seco.
- b. Ojo rojo. ✓
- c. Orzuelo.
- d. Chalazión.

La respuesta correcta es: Ojo rojo.

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Juan es un niño de 3 años que se ha tragado 3 pilas de botón.
¿Cuál de las siguientes medidas cree que será más efectiva?

Seleccione una:

- a. Endoscopia. ✓
- b. Carbón activado.
- c. Lavado gástrico.
- d. Irrigación intestinal completa.

La respuesta correcta es: Endoscopia.



Pregunta

27

Correcta

En una otitis media, ¿cuál es la complicación más frecuente?

Seleccione una:

a. Dolor.



Actividad previa

◀ Documento en PDF

Ir a...

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>



