

Cuidados enfermeros en las urgencias otorrinolaringológicas y oftálmicas en el ámbito asistencial de las emergencias extrahospitalarias (2024)

1. [Página Principal](#)
2. [Mis cursos](#)
3. [AV.Q079_24](#)
4. [Evaluación Febrero](#)
5. [Curso: Cuidados enfermeros en las urgencias otorrinolaringológicas y oftálmicas en el ámbito asistencial de las emergencias extrahospitalarias](#)

Comenzado el	viernes, 23 de febrero de 2024, 11:32
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 23 de febrero de 2024, 11:40
Tiempo empleado	8 minutos 15 segundos
Puntos	29,00/30,00
Calificación	9,67 de 10,00 (96,67%)
Comentario -	Apto

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué diferencia hay entre epistaxis y rinorragia?

Seleccione una:

a.

Rinorragia es un sangrado abundante y epistaxis es corto.

b.

Es lo mismo.

c.

En la rinorragia el sangrado es de las fosas nasales y en la epistaxis es de la propia nariz.

d.

En cuanto a la epistaxis, la causa es un traumatismo y en cuanto a la rinorragia es una hipertensión arterial.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es lo mismo.

Pregunta **2**
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

La enfermedad de Ménière puede estar relacionada con las siguientes medidas, excepto con:

Seleccione una:

a.

Uso de fármacos como el ácido acetilsalicílico.

b.

Hipertensión arterial.

c.

Consumo de tabaco y alcohol.

d.

Limpieza con bastoncillos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Limpieza con bastoncillos.

Pregunta **3**
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La presión intraocular se define como aquella presión que el ojo puede soportar sin lesionar sus estructuras y sin alterar su función. ¿Cuáles son los valores normales?

Seleccione una:

a.
Mayor de 50 mm Hg.

b.
Entre 0 y 5 mm Hg.

c.
Entre 10 y 21 mm Hg.

d.
Entre 30 y 50 mm Hg.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 10 y 21 mm Hg.

Pregunta **4**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué se le llama midriasis?

Seleccione una:

a.
Dilatación de la pupila por encima de 4 mm.

b.
Dilatación de la pupila por encima de 2 mm.

c.
Contracción de la pupila por debajo de 4 mm.

d.
Contracción de la pupila por debajo de 2 mm.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dilatación de la pupila por encima de 4 mm.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La opacidad del cristalino del ojo, se denomina:

Seleccione una:

a.
Catarata.

b.
Presbicia.

c.
Glaucoma.

d.
Degeneración maculopapilar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Catarata.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El músculo dilatador de la pupila, cuya inervación corre a cargo del sistema nervioso simpático, cuando se activa, va a provocar:

Seleccione una:

a.
Nistagmus.

b.
Miosis.

c.
Midriasis.

d.
Anopsia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Midriasis.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El examen con fluoresceína es muy útil en el diagnóstico de:

Seleccione una:

a.

Ojo seco.

b.

Ojo rojo.

c.

Orzuelo.

d.

Chalazión.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ojo rojo.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La presencia de escamas palpebrales son propias de:

Seleccione una:

a.

Chalazión.

b.

Blefaritis.

c.

Orzuelo.

d.

Pterigión.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Blefaritis.

Pregunta **9**
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se realizarán test vestibulares en una exploración otorrinolaringológica, siendo éstos:

Seleccione una:

a.
Test de Nysten-Barany y Romberg.

b.
Test de Alien.

c.
Test de Weber.

d.
Test de Rinne.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Test de Nysten-Barany y Romberg.

Pregunta **10**
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La visión de sombras puede corresponder a:

Seleccione una:

a.
Cataratas.

b.
Desprendimiento de retina.

c.
Queratitis.

d.
Glaucoma.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desprendimiento de retina.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la otitis externa, señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

a.
Fiebre mayor de 39° C.

b.
Tinnitus.

c.
Mastoiditis.

d.
Hay otorrea clara e inodora.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hay otorrea clara e inodora.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La irrigación para la extracción de un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo está contraindicada:

Seleccione una:

a.
El cuerpo extraño no ocluye totalmente el conducto auditivo.

b.
El cuerpo extraño no es un fruto seco.

c.

El paciente tuvo antiguamente una infección en el conducto auditivo.

d.

El paciente tiene una lesión timpánica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El paciente tiene una lesión timpánica.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El cuerpo ciliar de ojo se encuentra en:

Seleccione una:

a.

Capa externa.

b.

Capa media.

c.

Capa interna.

d.

Córnea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Capa media.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es la enfermedad de Ménière?

Seleccione una:

a.

Es una inflamación del oído interno que puede ser de origen bacteriano o viral.

b.

Es un desequilibrio anormal de los líquidos del oído por absorción deficiente en el saco endolinfático.

c.

Es un período breve de vértigo incapacitante, que ocurre cuando la posición de la cabeza del paciente cambia con respecto a la gravedad.

d.

Es un trastorno del equilibrio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un desequilibrio anormal de los líquidos del oído por absorción deficiente en el saco endolinfático.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Trabaja en un centro de salud laboral de una fábrica, un profesional ha tenido un accidente y ha sufrido una quemadura con lejía en el ojo ¿Durante cuánto tiempo deberemos realizar lavado ocular en este caso?

Seleccione una:

a.

10 minutos.

b.

2 días.

c.

30 min.

d.

2 horas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 30 min.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cristóbal ha tenido una rotura timpánica tras la eliminación de un cuerpo extraño en su oído. ¿Cuál de las siguientes no es una recomendación al alta?

Seleccione una:

a.
Seguir el tratamiento antibiótico pautado.

b.
Taponar el oído para protegerlo y evitar la infección.

c.
No es necesario proteger el oído del agua.

d.
Si no cierra en tres/seis meses, será preciso la reparación quirúrgica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No es necesario proteger el oído del agua.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la exploración del sistema vestibular, tiene gran significación:

Seleccione una:

a.
Nistagmus.

b.
Otorrea.

c.
Otorragia.

d.
Asteatosis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nistagmus.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué prueba diagnóstica se utiliza para diferenciar glaucoma de ángulo cerrado y de ángulo abierto?

Seleccione una:

a.
Tonometría.

b.
Gonioscopia.

c.
Carta de Snellen.

d.
Lámpara de hendidura.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gonioscopia.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En pacientes con problemas de audición, podemos encontrar los siguientes signos auditivos, excepto:

Seleccione una:

a.
Cerumen.

b.
Enrojecimiento.

c.
Inflamación.

d.
Disminución de la sensibilidad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminución de la sensibilidad.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Mario es ingresado en la unidad de corta estancia de la urgencia donde trabaja, en el informe pone que presenta hemianopsia, ¿qué significa este hallazgo?

Seleccione una:

a.
Pérdida de visión en medio campo visual.

b.
Movimiento involuntario, rápido y repetitivo del ojo.

c.
Caída permanente del párpado superior.

d.
Pérdida total de visión en ambos ojos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pérdida de visión en medio campo visual.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tratamiento local de la epistaxis, se debe:

Seleccione una:

a.
Realizar un taponamiento anterior de la fosa nasal permaneciendo colocado 48 horas.

b.
Cauterizar con nitrato de plata.

c.
Evitar evacuar los coágulos que taponan las fosas nasales.

d.
Realizar un taponamiento posterior que se dejará mínimo 72 horas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizar un taponamiento anterior de la fosa nasal permaneciendo colocado 48 horas.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los cuidados de enfermería de una persona que ha sufrido una epistaxis se incluye la enseñanza de varias medidas de autocuidado, siendo la correcta:

Seleccione una:

a.
Tomar alimentos calientes y condimentados.

b.
Evitar sonarse la nariz con fuerza.

c.
Realizar barridos suaves con bastoncillos de algodón en la nariz para favorecer la expulsión de coágulos residuales.

d.
En caso de sangrado nasal recurrente, el paciente tendrá que extender el cuello para disminuir la presión en el punto de sangrado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitar sonarse la nariz con fuerza.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale los signos y síntomas del síndrome de Ménière:

Seleccione una:

a.
Diarrea vespertina y heces acólicas.

b.
Dolor y fiebre mayor de 38° C.

c.
Sensación de plenitud en el oído afectado y tinnitus.

d.
Otorrea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sensación de plenitud en el oído afectado y tinnitus.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un niño que presenta rinorrea unilateral persistente, lo que debemos descartar es:

Seleccione una:

a.
Hipertrofia de adenoides.

b.
Cuerpo extraño.

c.
Sinusitis aguda.

d.
Epistaxis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuerpo extraño.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un barotraumatismo, se utiliza como prueba diagnóstica:

Seleccione una:

a.
Audiometría.

b.
Test de Romberg.

c.
Test de Weber.

d.
Timpanometría.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Test de Romberg.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Mariana refiere pérdida de visión con dolor, ve una mancha de color rojizo con el ojo izquierdo, además en la valoración se observa una midriasis de esa pupila ¿Qué tipo de medidas adoptaremos en el tratamiento?

Seleccione una:

a.
Masaje ocular.

b.
Hacer respirar al paciente en una bolsa de plástico o papel.

c.
Administrar vasodilatadores.

d.
Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuál de las siguientes situaciones está contraindicado extraer un tapón de cerumen por irrigación de agua.

Seleccione una:

a.
Sospecha de perforación timpánica.

b.
Dolor de garganta al tragar fluidos.

c.
Fiebre.

d.
Estapedectomía

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sospecha de perforación timpánica.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Pablo es un niño de 4 años traído al SUAP por rinorrea purulenta y maloliente desde esta mañana por una narina, su madre comenta que parece que le cuesta respirar por la nariz. ¿Qué sospecha que le puede pasar a Pablo?

Seleccione una:

a.
Catarro nasal.

b.
Hipertrofia de adenoides.

c.
Cuerpo extraño nasal.

d.
Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuerpo extraño nasal.

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una otitis media, ¿cuál es la complicación más frecuente?

Seleccione una:

a.
Dolor.

b.
Laberintitis.

c.
Mastoiditis.

d.
Supuración.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mastoiditis.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Juan es un niño de 3 años que se ha tragado 3 pilas de botón. ¿Cuál de las siguientes medidas cree que será más efectiva?

Seleccione una:

a.
Endoscopia.

b.
Carbón activado.

c.
Lavado gástrico.

d.
Irrigación intestinal completa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Endoscopia.