

24. El Periodo de tiempo en la vida del paciente en el que se identifica un cambio de tendencia en la trayectoria clínica de su enfermedad, manifestado como una aceleración en el empeoramiento clínico, lo llamamos:

Seleccione una:

- a. Síndrome de fragilidad.
- b. Empeoramiento irreversible.
- c. Enfoque paliativo.
- d. Punto de inflexión.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Punto de inflexión.

25. El ajuste del tratamiento a la situación del paciente, se reconoce como:

Seleccione una:

- a. Limitación del esfuerzo terapéutico.
- b. Adecuación de medidas.
- c. Plan específico de cuidados.
- d. Enfoque paliativo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adecuación de medidas.

26. Según la clasificación de la ACT un niño en situación de amenaza para la vida y en el que el tratamiento puede fracasar, pertenece al grupo de atención:

Seleccione una:

- a. Grupo 1
- b. Grupo 2
- c. Grupo 3
- d. Grupo 4

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Grupo 1

27. Según la EAPC, el nivel 1 de atención, el enfoque paliativo puede ser proporcionado por:

Seleccione una:

- a. Profesionales con formación y dedicación específica en un área concreta de la pediatría.
- b. Cuidadores principales.
- c. Profesionales con formación específica en cuidados paliativos pediátricos.
- d. Todos los profesionales de la salud.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos los profesionales de la salud.

28. Las úlceras terminales de Kennedy, se caracterizan por:

Seleccione una:

- a. Aspecto marronáceo.
- b. Forma de mariposa o herradura.
- c. Rápida evolución.
- d. Todas las anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

29. Aquellos síntomas que no pueden ser adecuadamente tratados sin comprometer la conciencia del paciente, son denominados:

Seleccione una:

- a. Síntomas difíciles.
- b. Síntomas de la agonía.
- c. Síntomas refractarios.
- d. Síntomas de final de vida.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síntomas refractarios.

30. El tiempo caracterizado por el shock inicial ante el diagnóstico y la negación de la muerte próxima, mantenida en mayor o menor grado hasta el final, es denominado:

Seleccione una:

- a.
Duelo agudo.
- b.
Duelo patológico.
- c.
Duelo anticipado.
- d.
Duelo temprano.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Duelo anticipado.