

Valoración y cuidados enfermeros al paciente pediátrico en el proceso quirúrgico (2024)

Página Principal

Mis cursos

AV.P042_24

Evaluación Febrero

Curso: Valoración y cuidados enfermeros en el proceso quirúrgico

Comenzado el lunes, 26 de febrero de 2024, 17:18

Estado Finalizado

Finalizado en lunes, 26 de febrero de 2024, 17:58

Tiempo empleado 40 minutos 32 segundos

Puntos 20,00/30,00

Calificación 6,67 de 10,00 (66,67%)

Comentario -

No apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la fase de maduración de una herida el principal evento fisiológico que ocurre es:

Seleccione una:

a.

Recanalización de vasos linfáticos.

b.

Migración de fibroblastos.

c.

Formación de costra.

d.

Epitelización.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Epitelización.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Carta Europea de los Derechos del Niño reconoce a todos los niños:

Seleccione una:

a.

Al derecho a la vida, y en caso de que sus padres o personas encargadas de él no puedan asegurar su supervivencia y desarrollo serán los Estados quienes tienen que garantizar su protección y cuidados.

b.

El derecho a gozar de unos padres o en su defecto personas que lo sustituyan, teniendo responsabilidad conjunta en su desarrollo y educación.

c.

El derecho a ser protegido contra toda forma de esclavitud, de violencia o de explotación sexual.

d.

Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La posición que se utiliza frecuentemente con pacientes para favorecer la eliminación de secreciones:

Seleccione una:

a.

Decúbito lateral.

b.

Posición de Sims.

c.

Fowler.

d.

Decúbito prono.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Posición de Sims.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La posición de litotomía está indicada para explorar:

Seleccione una:

a.

El tiroides.

b.

El abdomen.

c.

La vagina.

d.

Las mamas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La vagina.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica cuál de las siguientes suturas quirúrgicas es absorbible:

Seleccione una:

a.

Seda.

b.

Ácido poliglicólico.

c.

Poliéster.

d.

Polipropileno.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ácido poliglicólico.

Pregunta

6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La posición de Anti trendelemburg:

Seleccione una:

a.

Facilita el retorno venoso.

b.

Evita el reflujo gastro-esofágico.

c.

Previene las úlceras por decúbito.

d.

Se utiliza para las lesiones cervicales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evita el reflujo gastro-esofágico.

Pregunta

7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los drenajes abiertos se caracterizan por:

Seleccione una:

a.

No poder retirarse de forma progresiva.

b.

Reducir el riesgo de infección.

c.

Limitar la movilidad.

d.

Drenar por capilaridad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Drenar por capilaridad.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un factor asociado al riesgo de infección de la herida quirúrgica es el grado de contaminación de la zona quirúrgica. De acuerdo con esto, una colecistectomía se clasifica como cirugía:

Seleccione una:

a.

Limpia.

b.

Limpia-contaminada.

c.

Contaminada.

d.

Contaminada-sucia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Limpia-contaminada.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la mesa de operaciones se colocará al paciente en posición de Kraske cuando vaya a ser intervenido de:

Seleccione una:

a.

Cirugía maxilofacial.

b.
Cirugía ano-rectal.

c.
Cirugía torácica.

d.
Neurocirugía.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Cirugía ano-rectal.

Pregunta

10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la Unidad de Reanimación Post Anestésica en la que trabaja, tiene un paciente que porta un drenaje Penrose. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

a.
Es un drenaje activo que actúa por gravedad.

b.
Debe ser conectado a una bolsa recolectora de circuito cerrado.

c.
Es un drenaje pasivo cuyo mecanismo de acción es por capilaridad.

d.
Se coloca en las vías biliares.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Es un drenaje pasivo cuyo mecanismo de acción es por capilaridad.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un paciente con antecedentes de hipertensión bien controlada con medicación va a ser intervenido de una colecistectomía. ¿Qué riesgo anestésico encontraremos en su informe?

Seleccione una:

a.
ASA I.

b.
ASA II.

c.
ASA III.

d.

ASA IV.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: ASA II.

Pregunta

12

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las principales complicaciones y lesiones que se producen en la posición de litotomía, señale la incorrecta:

Seleccione una:

a.

Acortamiento del nervio ciático.

b.

Compresión del nervio safeno.

c.

Lesión en el nervio obturador.

d.

Hipotensión postural.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Acortamiento del nervio ciático.

Pregunta

13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes actividades no se deberá realizar en un paciente crítico en decúbito prono?

Seleccione una:

a.

Rotar la colocación de cabeza y los brazos periódicamente, colocando un brazo a un lado de la cabeza, hacia donde mire la cara, y el otro a lo largo del tronco.

b.

Colocar la cama en posición de trendelenburg para evitar el edema facial y ocular y facilitar la tolerancia a la dieta.

c.

Elevar los pies con almohadas de manera que la articulación del tobillo quede en un ángulo de 45° y los dedos de los pies libres de presión.

d.

Comprobar la correcta alineación de la columna y los miembros inferiores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocar la cama en posición de trendelenburg para evitar el edema facial y ocular y facilitar la tolerancia a la dieta.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la realización de un acceso al espacio intracraneal a través de un orificio en el hueso del cráneo, la posición quirúrgica es:

Seleccione una:

a.

Paciente en decúbito supino con apoyo bajo la cabeza (rodillo).

b.

Semisentado.

c.

Paciente en decúbito prono sobre trineo.

d.

Mahometana.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Paciente en decúbito supino con apoyo bajo la cabeza (rodillo).

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existen varios tipos de drenaje. Dentro de los aspirativos o hipobáricos se encuentran:

Seleccione una:

a.

Saratoga.

b.

Kher.

c.

Silastic.

d.

Penrose.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Saratoga.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de la cartera de servicios de Atención Primaria se recoge el servicio de Cirugía Menor, que incluye la realización de procedimientos terapéuticos o diagnósticos. ¿Qué características deben cumplir dichos procedimientos?

Seleccione una:

a.

Ser de baja complejidad y mínimamente invasivos.

b.

Tener un riesgo medio de hemorragia.

c.

Se practican sin anestesia local y no requieren cuidados postoperatorios.

d.

No pueden tener finalidad diagnóstica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ser de baja complejidad y mínimamente invasivos.

Pregunta

17

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A razón del sistema de clasificación de la American Society of Anesthesiologists (ASA) para estimar el riesgo anestésico, un sujeto con diabetes mellitus tipo 1 mal controlada, se clasificará como:

Seleccione una:

a.

ASA I.

b.

ASA II.

c.

ASA III.

d.

ASA IV.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: ASA III.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique la afirmación correcta en relación a los drenajes:

Seleccione una:

a.

El drenaje de Penrose es un drenaje activo.

b.

La utilización del tubo de Kher es común en cirugías de vías biliares.

c.

El drenaje de Jackson Pratt únicamente permite evacuar sangre, no pudiendo evacuar aire.

d.

El sellado de agua del drenaje torácico (pleur-evac®) facilita la entrada de aire exterior en el sistema durante la espiración.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La utilización del tubo de Kher es común en cirugías de vías biliares.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La posición quirúrgica en la que un paciente se coloca con los muslos en abducción, las rodillas y caderas flexionadas, y los pies quedan suspendidos con estribos o perneras que se fijan en la mesa se denomina:

Seleccione una:

a.

Posición de litotomía.

b.

Posición de trendelenburg invertida.

c.

Posición de Kraske.

d.

Posición de sedestación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Posición de litotomía.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Lucía es una niña de 10 años, que acude a la consulta de su enfermera en Atención Primaria tras recibir al alta hospitalaria por apendicectomía. Presenta una herida en el abdomen considerada limpia-contaminada. Según el grado de probabilidad de contaminación, una herida es de tipo limpia-contaminada cuando:

Seleccione una:

a.

Tiene tejido muerto.

b.
Son heridas quirúrgicas que han afectado a vías respiratorias, alimentarias, genitales o urinarias y no presentan signos de infección.

c.
Son heridas quirúrgicas en las que se ha violado de manera importante el campo estéril.

d.
Muestran signos de inflamación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son heridas quirúrgicas que han afectado a vías respiratorias, alimentarias, genitales o urinarias y no presentan signos de infección.

Pregunta

21

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El objetivo de la cirugía paliativa puede ser:

Seleccione una:

a.
Reparar o restaurar tejidos lesionados.

b.
Mejorar la calidad de vida.

c.
Extirpar una masa tumoral.

d.
Realizar una biopsia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mejorar la calidad de vida.

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La dehiscencia de una herida es:

Seleccione una:

a.
La protusión de las vísceras.

b.
La separación completa o parcial de los bordes de la herida.

c.
La cicatrización completa de la herida.

d.

El cierre por segunda intención.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La separación completa o parcial de los bordes de la herida.

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se pueden clasificar las cirugías?

Seleccione una:

a.

Cirugía diagnóstica, curativa, paliativa y reparadora.

b.

Cirugía mayor o menor.

c.

En función de la causa, complejidad, riesgo, tiempo, necesidad o grado de contaminación.

d.

Cirugía opcional o esencial.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En función de la causa, complejidad, riesgo, tiempo, necesidad o grado de contaminación.

Pregunta

24

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No se considera drenaje quirúrgico pasivo al:

Seleccione una:

a.

Penrose.

b.

Redón.

c.

Tejadillo.

d.

Drenaje de Kher.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Redón.

Pregunta

25

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes al proceso quirúrgico es falsa?

Seleccione una:

a.

El período intraoperatorio comienza cuando el paciente entra en quirófano.

b.

El período preoperatorio va desde que el paciente acepta someterse a la intervención quirúrgica hasta la entrada en quirófano.

c.

El período intraoperatorio abarca el tiempo que dura la intervención quirúrgica.

d.

El período postoperatorio se divide en inmediato y tardío.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El período intraoperatorio abarca el tiempo que dura la intervención quirúrgica.

Pregunta

26

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes tipos de drenaje se realiza por capilaridad?

Seleccione una:

a.

Penrose.

b.

Redón.

c.

Tubo de tórax.

d.

Transcístico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Penrose.

Pregunta

27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las posiciones quirúrgicas que se enuncian a continuación. ¿cuál no es una variante del decúbito prono?

Seleccione una:

a.
Craneotomía.

b.
Posición de Roser.

c.
Posición mahometana.

d.
Posición genupectoral.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Posición de Roser.

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los factores más estresantes en la separación del niño de su entorno familiar en el momento de la cirugía. Los autores de la teoría clásica de ansiedad por separación se la debemos a:

Seleccione una:

a.
Finnegan.

b.
Davis.

c.
Bowlby y Roberston.

d.
Ninguna es correcta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bowlby y Roberston.

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes escalas ha sido traducida en 2015 al español?

Seleccione una:

a.
The Yale Preoperative Anxiety Scale (YPAS-m).

b.
Cuestionarios Child behaviour checklist (CBCL).

c.
Escala de ansiedad y depresión de Goldberg (EAD-G).

d.
Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: The Yale Preoperative Anxiety Scale (YPAS-m).

Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

Seleccione una:

a.
No eliminar el vello si no es necesario.

b.
Eliminar el vello con cortadora eléctrica de pelo.

c.
Intervalo desde la eliminación del vello hasta la intervención mayor que 24 horas.

d.
Zona de eliminación del vello delimitada por protocolos y centrada en la zona de incisión.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Intervalo desde la eliminación del vello hasta la intervención mayor que 24 horas.