



[Página Principal](#)

[Mis cursos](#)

[AV.Q081_24](#)

[Evaluación Febrero](#)

Curso: Cuidados enfermeros en el paciente intoxicado en el ámbito asistencial de las urgencias extrahospitalarias

Comenzado el	lunes, 26 de febrero de 2024, 21:52
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 26 de febrero de 2024, 22:18
Tiempo empleado	25 minutos 33 segundos
Puntos	29,00/30,00
Calificación	9,67 de 10,00 (96,67%)
Comentario -	Apto



Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Indique la respuesta correcta respecto a los antídotos en el tratamiento de las intoxicaciones:

Seleccione una:

- a. Se trata de un producto químico capaz de combinarse con un tóxico para dar lugar a un nuevo compuesto, generalmente inerte y fácilmente eliminable.
- b. Actúa disminuyendo o neutralizando la acción del tóxico u oponiéndose a sus efectos a través de varios mecanismos.
- c. El principal inconveniente es que se dispone solo de antídotos para un pequeño número de tóxicos.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.



Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Indique la respuesta correcta respecto al tratamiento de prevención de absorción de un tóxico:

Seleccione una:

- a. Para la elección del tratamiento se tienen en cuenta distintos factores como el tipo de medicamento, la dosis de este y el estado del paciente. ✓
- b. Por lo general el lavado gástrico es el tratamiento de elección.
- c. El carbón activado se usará en aquellas situaciones en las que el lavado gástrico no este indicado.
- d. Todas las respuestas son correctas.

La respuesta correcta es: Para la elección del tratamiento se tienen en cuenta distintos factores como el tipo de medicamento, la dosis de este y el estado del paciente.



Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es el antídoto empleado para la intoxicación por benzodiazepinas?:

Seleccione una:

- a. Fisostigmina.
- b. Flumazenilo. ✓
- c. Cloruro cálcico.
- d. Protamina.

La respuesta correcta es: Flumazenilo.





Respecto a las intoxicaciones, indique la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. En España es obligatorio según el Código Penal realizar un informe judicial de todas las intoxicaciones agudas por parte del personal médico.
- b. La intoxicación aguda es el síndrome clínico que se presenta como consecuencia de la entrada de un tóxico en el organismo.
- c. En 1998 se inició el Programa Español de Toxicovigilancia por el cual se realizan informes anuales sobre la incidencia de intoxicaciones por productos químicos atendidas en los servicios de urgencias.
- d. Todas las respuestas anteriores son verdaderas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

En caso de intoxicación por cocaína, ¿cuál es el tratamiento indicado inicialmente?:

Seleccione una:

- a. Tratamiento sintomático (hiperpotasemia, deshidratación, bradicardia). Administración de naloxona 0.4 mg/2-3 min IV (max. 10 mg).
- b. Tratamiento sintomático (agitación, hipertermia, HTA, ✓ arritmias). Administración de diazepam 10 mg IV, midazolam 7.5-10 mg IV.
- c. Tratamiento sintomático (hipotensión, hipotermia, alucinaciones). Administración de piridoxina 300 mg IV.
- d. Tratamiento sintomático (acidosis metabólica, hipoTA, hipotermia). Administración de hidroxicoBALamina 5 g IV.

La respuesta correcta es: Tratamiento sintomático (agitación, hipertermia, HTA, arritmias). Administración de diazepam 10 mg IV, midazolam 7.5-10 mg IV.





Indique la respuesta incorrecta respecto a las intoxicaciones:

Seleccione una:

- a. Se debe tener en cuenta que la sintomatología y los hallazgos clínicos pueden ser muy variados en función del tipo de intoxicación.
- b. La historia clínica y el examen físico son de gran importancia para reconocer la intoxicación.
- c. En primer lugar realizaremos las medidas de prevención de la absorción del toxico y después las medidas de soporte vital necesarias. ✔
- d. Si fuese necesario, se administrarán los antídotos indicados o se iniciarán las medidas que faciliten la eliminación del toxico.

La respuesta correcta es: En primer lugar realizaremos las medidas de prevención de la absorción del toxico y después las medidas de soporte vital necesarias.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Indique la relación incorrecta entre el tratamiento de eliminación y el tóxico:

Seleccione una:

- a. Diuresis forzada neutra, indicado en caso de intoxicaciones por metotrexato. ✓
- b. Diuresis forzada alcalina, indicada en caso de intoxicaciones por barbitúricos.
- c. Diuresis forzada neutra, indicado en caso de intoxicaciones por amanitas.
- d. Diuresis forzada alcalina, indicado en caso de intoxicaciones por salicilatos.

La respuesta correcta es: Diuresis forzada neutra, indicado en caso de intoxicaciones por metotrexato.



Pregunta

8

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes tratamientos facilitan la eliminación de un tóxico?:

Seleccione una:

- a. Carbón activado ✘
- b. Endoscopia
- c. Exanguinotransfusión
- d. Irrigación intestinal completa

La respuesta correcta es: Exanguinotransfusión



Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Indique la respuesta correcta respecto a tratamiento por intoxicación con monóxido de carbono:

Seleccione una:

- a. Administración de O₂ al 100% inhalado.
- b. Se debe vigilar las posibles convulsiones y acidosis.
- c. En casos graves se puede plantear el uso de la cámara hiperbárica.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.



Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Indique cuál de las siguientes sustancias se pueden detectar en orina:

Seleccione una:

- a. Anfetaminas. ✓
- b. Hierro.
- c. Paracetamol.
- d. Monóxido de carbono.

La respuesta correcta es: Anfetaminas.



Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué antídoto se utiliza en caso de intoxicación por setas con efecto anticolinérgico?:

Seleccione una:

- a. Atropina.
- b. Silibina.
- c. Vitamina B6
- d. Fisostigmina. ✓

La respuesta correcta es: Fisostigmina.





Indique la respuesta incorrecta respecto a la irrigación intestinal completa como tratamiento de prevención de absorción de un tóxico:

Seleccione una:

- a. La dosificación en niños de 9 meses a 6 años es del 500 ml/h.
- b. Se administra una solución de polietilenglicol y electrolitos.
- c. No es una técnica recomendada de forma rutinaria.
- d. Está indicado en pacientes con íleo paralítico u obstrucción intestinal. ✓

La respuesta correcta es: Está indicado en pacientes con íleo paralítico u obstrucción intestinal.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué fármaco se puede administrar en caso de sospecha de intoxicación por opioides?:

Seleccione una:

- a. Naloxona. ✓
- b. N-Acetilcisteína.
- c. Etanol.
- d. Acido ascórbico.

La respuesta correcta es: Naloxona.





¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento en la ingestión de cáusticos?:

Seleccione una:

- a. Tratamiento sintomático, indicado el lavado gástrico y el carbón activado. Realizar endoscopia y cirugía.
- b. Tratamiento sintomático, contraindicado el lavado gástrico, indicado carbón activado. Realizar endoscopia y cirugía.
- c. Tratamiento sintomático, contraindicado el lavado gástrico y el carbón activado. Contraindicado realizar endoscopia y cirugía.
- d. Tratamiento sintomático, contraindicado el lavado gástrico y el carbón activado. Realizar endoscopia y cirugía. ✓

La respuesta correcta es: Tratamiento sintomático, contraindicado el lavado gástrico y el carbón activado. Realizar endoscopia y cirugía.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00



¿Qué parámetros se valoran en la escala de Glasgow?:

Seleccione una:

- a. Desorientación en estado, tiempo y persona, frecuencia respiratoria y edad.
- b. Insuficiencia cardíaca, menos de 65 años, diabetes, enfermedad vascular periférica entre otros.
- c. Respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. 
- d. Nivel de conciencia, ataxia de extremidades, sensibilidad, disartria y campos visuales.

La respuesta correcta es: Respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora.



Se puntúa 1,00
sobre 1,00



Respecto al tratamiento de la intoxicación por insecticidas organofosforados, indique la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. El tratamiento farmacológico se realiza con atropina y oximas.
- b. La pralidoxima debe administrarse siempre separada de la atropina, nunca juntas. ✓
- c. El tratamiento debe mantenerse 24 h tras la desaparición de los síntomas.
- d. La dosis de atropina inicial es de 1 a 5 mg y repetir en función de la respuesta.

La respuesta correcta es: La pralidoxima debe administrarse siempre separada de la atropina, nunca juntas.



¿Cuál es la definición correcta de "tóxico"?

Seleccione una:

- a. Sustancia que sirve para reducir efectos de una enfermedad sobre el organismo.
- b. Sustancia que se utiliza para potenciar el desarrollo físico o intelectual, que puede alterar el estado de ánimo o/y experimentar nuevas sensaciones.
- c. Cualquier sustancia química que sea capaz de producir la muerte, heridas u otros efectos perjudiciales en el organismo. ✓
- d. Todas las respuestas son correctas.

La respuesta correcta es: Cualquier sustancia química que sea capaz de producir la muerte, heridas u otros efectos perjudiciales en el organismo.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es el antídoto de elección para la intoxicación con heparina?:

Seleccione una:

- a. Protamina. ✓
- b. Vitamina K.
- c. AAS.
- d. Gluconato cálcico al 10%.

La respuesta correcta es: Protamina.



Se puntúa 1,00
sobre 1,00



¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al carbón activado es incorrecta?:

Seleccione una:

- a. No es útil en caso de intoxicaciones por alcoholes, cianuro, metales, potasio, ácidos y álcalis y derivados del petróleo.
- b. Se debe administrar después de una hora de la ingesta del toxico y su uso hasta 2 horas después parece ser beneficioso. 
- c. Está contraindicado en recién nacidos y pacientes con cirugías abdominales recientes.
- d. Presenta una gran porosidad para conseguir una superficie interna de contacto muy extensa y por tanto una capacidad de adsorción elevada.

La respuesta correcta es: Se debe administrar después de una hora de la ingesta del toxico y su uso hasta 2 horas después parece ser beneficioso.



Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00



¿En qué consiste la diuresis forzada alcalina como tratamiento para la eliminación de un tóxico?

Seleccione una:

- a. Consiste en incrementar la producción de orina mediante el aporte de volumen y diuréticos.
- b. Consiste en alcalinizar la orina con un PH de entre 6.5-7.5 y forzar su producción (3 ml/kg/h).
- c. Consiste en alcalinizar la orina con un PH de entre 7.5-9 y forzar su producción (5 ml/kg/h). ✓
- d. Consiste en incrementar la orina en aquellos pacientes con alcalosis metabólica.

La respuesta correcta es: Consiste en alcalinizar la orina con un PH de entre 7.5-9 y forzar su producción (5 ml/kg/h).



Se puntúa 1,00
sobre 1,00



¿Cuáles son las indicaciones de la plasmaféresis como tratamiento para la eliminación de un tóxico?:

Seleccione una:

- a. Es una técnica por la cual la sangre pasa a través de un filtro que contiene un material absorbente generalmente carbón activado o resinas.
- b. Se realiza la transfusión de parte o de la totalidad de la sangre del paciente por otra normal.
- c. Permite eliminar el tóxico de forma rápida y está indicado cuando la hemodiálisis u otras técnicas no están indicadas. Puede ser útil en intoxicaciones por digoxina u hormonas tiroideas. ✓
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: Permite eliminar el tóxico de forma rápida y está indicado cuando la hemodiálisis u otras técnicas no están indicadas. Puede ser útil en intoxicaciones por digoxina u hormonas tiroideas.

Se puntúa 1,00
sobre 1,00



Indique la respuesta correcta respecto a la endoscopia en un paciente con sospecha de intoxicación por vía oral:

Seleccione una:

- a. No es una técnica indicada por el riesgo de perforación.
- b. Debe realizarse durante las primeras 24-48 horas postingesta de cáusticos para valorar las lesiones digestivas. ✓
- c. Debe realizar 48 horas después de la supuesta intoxicación y nunca antes.
- d. Es una técnica indicada solo para el paciente pediátrico.

La respuesta correcta es: Debe realizarse durante las primeras 24-48 horas postingesta de cáusticos para valorar las lesiones digestivas.

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Indique el tratamiento indicado para la intoxicación por cannabis:

Seleccione una:

- a. Tratamiento sintomático de la agitación, convulsiones, hipotensión y retención de orina.
- b. Diazepam 5-10 mg IV, midazolam 5-10 mg/15 min IV.
- c. Si se ha realizado ingesta oral hace menos de 6 horas puede ser recomendable la administración de carbón activado.
- d. Las respuestas a y b son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Las respuestas a y b son correctas.



Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Indique cuáles de las siguientes se consideran contraindicaciones del lavado gástrico para eliminar la absorción de un tóxico:

Seleccione una:

- a. Ingesta de cáusticos, riesgo de perforación.
- b. Ingesta de hidrocarburos, vía aérea no protegida.
- c. Riesgo de hemorragia digestiva.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.





En caso de RCP de un paciente intoxicado, indique la respuesta correcta respecto a las medidas de SVA:

Seleccione una:

- a. Se realizarán durante un tiempo inferior al indicado en las guías de actuación clínica, ya que se ha demostrado que la eficacia de estas ante un paciente intoxicado es siempre menor.
- b. Se realizarán durante un tiempo superior al habitual,  ya que se han descrito casos de supervivencia tras 2-3 horas de masaje cardiaco y ventilación adecuada en intoxicaciones por determinados fármacos.
- c. Están desaconsejadas en pacientes con intoxicación por vía oral por el riesgo de reflujo del tóxico y quemaduras en esófago y cavidad bucal.
- d. Están aconsejadas solo en pacientes pediátricos con edad menor de 5 años e intoxicación por inhalación.

La respuesta correcta es: Se realizarán durante un tiempo superior al habitual, ya que se han descrito casos de supervivencia tras 2-3 horas de masaje cardiaco y ventilación adecuada en intoxicaciones por determinados fármacos.





Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00



Indique la dosis correcta de administración inicial de N-Acetilcisteína en caso de intoxicación por paracetamol:

Seleccione una:

- a. 250 mg/kg en 500 ml SG 5% en 1 hora.
- b. 150 mg/kg en 250 ml SG 5% en 1 hora. ✓
- c. 250 mg/kg en 250 ml SSF 0.9% en 1 hora.
- d. 150 mg/kg en 500 ml SSF 0.9% en 1 hora.

La respuesta correcta es: 150 mg/kg en 250 ml SG 5% en 1 hora.



Pregunta

27

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué acciones debemos llevar a cabo durante la exploración física de un paciente con sospecha de intoxicación?:

Seleccione una:

- a. Valoración de la coloración de piel y mucosas, y olor del aliento.
- b. Exploración respiratoria, búsqueda de signos de broncoespasmo o cianosis.
- c. Valoración de quemaduras y erosiones en cavidad bucal, sequedad de boca o sialorrea.
- d. Todas las respuestas anteriores son verdaderas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son verdaderas.



Se puntúa 1,00
sobre 1,00



¿Qué indicación debemos tener en cuenta respecto a la administración de Cloruro Cálcico al 10% como antídoto tras una intoxicación por calcioantagonistas?

Seleccione una:

- a. Las ampollas se pueden administrar también por vía oral.
- b. Administrarlo de forma rápida por vía intravenosa puede producir arritmias en el paciente. ✓
- c. En consumidores crónicos de benzodiazepinas puede producir convulsiones.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: Administrarlo de forma rápida por vía intravenosa puede producir arritmias en el paciente.

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes tratamientos están indicados para prevenir la absorción de un tóxico?

Seleccione una:

- a. Lavado gástrico.
- b. Plasmaféresis.
- c. Carbón activado.
- d. Las respuestas a y c son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Las respuestas a y c son correctas.



Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué técnica de depuración extrarrenal se puede utilizar en caso de intoxicación con sustancias hidrosolubles de bajo peso molecular y con escasa unión a proteínas?

Seleccione una:

- a. Hemodiálisis. ✓
- b. Plasmaféresis.
- c. Exanguinotransfusión.
- d. Hemoperfusión.

La respuesta correcta es: Hemodiálisis.

Actividad previa

◀ Documento de estudio PDF

Ir a...

Siguiente actividad

Encuesta de satisfacción del alumnado ▶



Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>

