Clasificación General de los Medicamentos (2024)

Regresar a la lista | Mis cursos | MI CAPTCAP | Evaluación ABAD | Curso: Clasificación general de los medicamentos

Comenzado el: miércoles, 10 de abril de 2024, 12:24
Estado: Finalizado
Finalizado en: miércoles, 10 de abril de 2024, 12:33
Tiempo empleado: 9 minutos 24 segundos
Puntos: 15,00/20,00
Calificación: 5,67 de 7,57 (**74,87%**)
Comentario: Apto

Pregunta **1**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

Los siguientes anestésicos locales todos son tipo amida excepto:

Seleccione una:
- a. Lidocaína.
- b. Procaína.✔
- c. Mepivacaína.
- d. Ropivacaína.

La respuesta correcta es: Procaína

Pregunta **2**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

Entre las reacciones adversas asociadas al uso del tiro encontramos:

Seleccione una:
- a. Hipoglucemias.
- b. Hipotiroidismo.✔
- c. Diabetes.
- d. Todas son verdaderas

La respuesta correcta es: Hipotiroidismo.

Pregunta **3**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

¿Se puede afirmar que el pancuronium es hepatotóxico?

Seleccione una:
- a. No.
- b. Sólo cuando se asocia con anestésicos.
- c. Sólo si la persona que lo toma es diabética.
- d. Sí.✔

La respuesta correcta es: Sí.

Pregunta **4**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

El efecto máximo o pico de acción de los mucilinos de acción intermedia se produce a los:

Seleccione una:
- a. 12-13 a las 6 inyección.
- b. 2-4 a las 6 inyección.
- c. 4-5 a las 6 inyección.✔
- d. 6-11 a las 6 inyección.

La respuesta correcta es: 4-5 a las 6 inyección.

Pregunta **5**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

Los de siguientes efectos hoy una que no es secundaria de los antidepresivos

Seleccione una:
- a. Somnolencia.
- b. Respuesta de fobia.
- c. Somnolencia.
- d. Hipertensión arterial.✔

La respuesta correcta es: Hipertensión arterial.

Pregunta **6**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

¿En qué situaciones se aconsejará sobredosis de opiáceos?

Seleccione una:
- a. Cuando aparecen trastornos de conducta y crisis convulsivas.
- b. Cuando aparecen crisis de hipertensión respiratoria y coma.✔
- c. Cuando aparecen edema, fiebre, taquicardia.
- d. Cuando aparecen psicosis y violencia.

La respuesta correcta es: Cuando aparecen miosis, depresión respiratoria y coma.

Pregunta **7**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

Según la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los opiáceos débiles están recomendados en el tratamiento del dolor:

Seleccione una:
- a. Leve-escalón primero.
- b. Moderado-escalón segundo.✔
- c. Severo-escalón tercero.
- d. Crítico-escalón cuarto.

La respuesta correcta es: Moderado-escalón segundo.

Pregunta **8**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

De los siguientes anestésicos señale el que no se administra por vía intratecal:

Seleccione una:
- a. Naloxona.
- b. Tubocurarina.✔
- c. Protoxido de nitrógeno.
- d. Todos los anestésicos son intratecales.

La respuesta correcta es: Tubocurarina.

Pregunta **9**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

En cuanto al tratamiento con Warfarina, es falso que:

Seleccione una:
- a. Se emplea en la profilaxis de hombres y ambulos.
- b. Se administra por vía oral.
- c. Se metabolizan por vía hepática.
- d. Su efecto terapéutico cesta entre 5 y 12 horas.✔

La respuesta correcta es: Su efecto terapéutico cesta entre 5 y 12 horas.

Pregunta **10**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

¿A partir de que cantidad diaria de alcohol se considera consumo de riesgo en España?

Seleccione una:
- a. 40 g/d de en hombres (30-50 años)
- b. 40 g/d de en hombres y 24 g/ d de en mujeres.✔
- c. 20 gr/ día en hombres y 10 gr/ día en mujeres.
- d. Cualquier cantidad se considera consumo de riesgo.

La respuesta correcta es: 40 g/d de en hombres y 24 gr / día en mujeres.

Pregunta **11**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

Son fármacos con riesgo de hipoglucemias

Seleccione una:
- a. Metformina.
- b. Pioglitazona.
- c. DPP-4 inhibidores de la dipeptidil- peptidasa 4 (Sitagliptina).
- d. Sulfonilureas.✔

La respuesta correcta es: Sulfonilureas.

Pregunta **12**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

El principio activo anaerovumanol pertenece al grupo de los antinociceptivos orales. De las siguientes opciones señale la correcta:

Seleccione una:
- a. Producen pseudoptosis.
- b. Incrementan la síntesis hepática de los factores dependientes de la vitamina K.
- c. La prueba diagnóstica que se utiliza para control de efectos de los anticoagulantes orales es el tiempo de protrombina, expresado como índice de Quick.✔
- d. Una dieta rica en vaninas (espinacas, alcachofas) aporta mucha vitamina K por lo que disminuirá el efecto de los anticoagulantes orales.

La respuesta correcta es: Una dieta rica en vaninas (espinacas, alcachofas) aporta mucha vitamina K por lo que disminuirá el efecto de los anticoagulantes orales.

Pregunta **13**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

¿Cuál de los de siguientes fármacos está indicado para el exceso de secreciones bronquiales/respiratorias cuando la muerte es inminente?

Seleccione una:
- a. Atropina inyectable.✔
- b. Ácido acetilsalicílico.
- c. Vitamina K inyectable.
- d. Salbutamol en aerosol.

La respuesta correcta es: Atropina inyectable.

Pregunta **14**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

Las recomendaciones de seguridad durante la preparación y administración de quimioterapia son las siguientes excepto:

Seleccione una:
- a. Usar guantes quirúrgicos cuando se manejen fármacos antineoplásicos y las excretas de pacientes que reciben quimioterapia.
- b. Usar guantes de nitrilo cuando se manejen drogas cuando se preparen y administren fármacos de quimioterapia.
- c. Usar cosmetosas (usar UA en todo lo tutelar del equipo de seguridad) con el que se trabaja con fármacos de quimioterapia.✔
- d. Desechar todos los residuos de quimioterapia en la propia habitación del paciente.

La respuesta correcta es: Desechar todos los residuos de quimioterapia en la propia habitación del paciente.

Pregunta **15**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

La digoxina se administrará por vía:

Seleccione una:
- a. Subcutánea.
- b. Intramuscular.
- c. Intravenosa directa.
- d. Intravenosa de perfusión continua.✔

La respuesta correcta es: Intravenosa directa.

Pregunta **16**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

¿Qué fármacos deben suspenderse antes de intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas con contrastes yodados?

Seleccione una:
- a. Bigunidina.✔
- b. Insulinas.
- c. Aciclovir o Miglitol.
- d. Sulfonilureas.

La respuesta correcta es: Bigunidina.

Pregunta **17**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

¿Cuál de estos efectos adversos no corresponden a simvastatina?

Seleccione una:
- a. Fotosensibilidad.
- b. Miopatía.✔
- c. Mareos y vértigos.
- d. Depresión grave de la contractilidad.✔

La respuesta correcta es: Depresión grave de la contractilidad.

Pregunta **18**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

¿Qué fármacos de los mencionados se puede administrar por vía intramuscular e intravenosa?

Seleccione una:
- a. Pirgotia.
- b. Etomidato.
- c. Midazolam.✔
- d. Tiopental sódico.

La respuesta correcta es: Midazolam.

Pregunta **19**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes sustancias de abuso no se considera depresor del sistema nervioso central?

Seleccione una:
- a. Opiáceos.✔
- b. Metadona.
- c. Cocaína.

La respuesta correcta es: Cocaína.

Pregunta **20**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

La halotano es:

Seleccione una:
- a. Una sustancia que impide la absorción de tóxicos.
- b. Una sustancia que provoca principalmente vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y contracción del músculo liso.✔
- c. Una sustancia que no desempeña ningún función en la respuesta inmunitaria.
- d. Una sustancia antiinflamatoria.

La respuesta correcta es: Una sustancia que provoca principalmente vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y contracción del músculo liso.

Pregunta **21**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

Los benzodiazepinas son fármacos hipnóticos sedantes, ¿cuál de el antagonista específico de las benzodiazepinas?

Seleccione una:
- a. Flumazenilo.✔
- b. Naloxona.
- c. Neostigmina.
- d. Dimercaprol.

La respuesta correcta es: Flumazenilo.

Pregunta **22**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es causa del aumento de la resistencia a los antibióticos?

Seleccione una:
- a. El exceso en la prescripción de antibióticos.
- b. El uso de antibióticos en la cría de ganado y pescado para uso alimentario.
- c. Control inadecuado de las infecciones nosocomiales.
- d. Completar los tratamientos antibióticos.✔

La respuesta correcta es: Completar los tratamientos antibióticos.

Pregunta **23**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

Entre los fármacos que producen miosis no se encuentra:

Seleccione una:
- a. Morfina.
- b. Barbitúricos.
- c. Anticolinérgicos.✔
- d. Parasimpaticomiméticos.

La respuesta correcta es: Anticolinérgicos.

Pregunta **24**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

Al referirnos a la respuesta de bajo peso molecular (HBPM), que enunciado es correcto:

Seleccione una:
- a. La HBPM no tiene función antitrombótica.
- b. La HBPM presenta riesgos menores en pacientes con problemas de sangrado.✔
- c. La HBPM no prolonga el tiempo de protrombina.
- d. El tiempo de hemorragia de vena es más corto que con la heparina no fraccionada (HNF)

La respuesta correcta es: La HBPM presenta riesgos menores en pacientes con problemas de sangrado.

Pregunta **25**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes fármacos destruyen por su curación inotrópico?

Seleccione una:
- a. Digoxinina.
- b. Galactosinina.
- c. Ubicaina.
- d. Son ciertas a y b.✔

La respuesta correcta es: Son ciertas a y b.

Pregunta **26**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

Cuál de estos antibióticos aminoglucósidos es más nefrotóxico

Seleccione una:
- a. Neomicina.✔
- b. Estreptomicina.
- c. Tobramicina.
- d. Netilmicina.

La respuesta correcta es: Neomicina.

Pregunta **27**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

En la clasificación de las Benzodiazepinas el ilprazolam se de vida:

Seleccione una:
- a. Vida media larga, mayor de 24 h.
- b. Vida media intermedia, de 5 a 24 h.✔
- c. Vida media corta, menor de 5 h.
- d. El ilprazolam no es una Benzodiazepina.

La respuesta correcta es: Vida media intermedia, de 5 a 12 h.

Pregunta **28**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes diuréticos no se eliminador de potasio?

Seleccione una:
- a. Espironolactona.
- b. Furosemida.
- c. Epleneria.
- d. Hidroclorotiazida.✔

La respuesta correcta es: Hidroclorotiazida.

Pregunta **29**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

Interacciones medicamento- alimento. Respecto a la carbamazepina, señale la respuesta correcta:

Seleccione una:
- a. Los alimentos salen todo los grasos aumentan su absorción.✔
- b. No hay interacción con ningún alimento.
- c. No deben tomar con una gran cantidad de agua.
- d. Los alimentos salen todo los grasos disminuyen su absorción.

La respuesta correcta es: Los alimentos salen todo los grasos aumentan su absorción.

Pregunta **30**
Correcta
No puntúa hasta cierre 2 de noviembre de 2024, 12:24
Marcar pregunta

¿Señale cuál de las siguientes manifestaciones clínicas le harían sospechar de una intoxicación digitálica en pacientes con insuficiencia cardiaca?

Seleccione una:
- a. Bradicardia y vértigos.
- b. Bradicardia.
- c. Anemia y vahídos.
- d. Todas las respuestas son correctas.✔

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Navegación por el cuestionario

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Finalizar revisión

Finalizar revisión

Actividad previa
Documento en PDF

Siguiente actividad
Encuesta de satisfacción del alumnado

Esta web solo utiliza cookies y otras identificadores en línea facilitar la navegación, personalizar su experiencia y analizar el uso del sitio. Política de cookies
CUSTOMIZE
ACCEPT