

Prevención de complicaciones quirúrgicas. El papel de la enfermería

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

De acuerdo con la lista de verificación de seguridad de la cirugía de la OMS, ¿cuál es el volumen que falta en esta declaración?

El sangrado perioperatorio se considera importante cuando supera _____ en adultos o 7 mL/kg en pediatría.

Seleccione una:

- a. 250 mL
- b. 500 mL**
- c. 750 mL
- d. 1.000 mL

Respuesta correcta

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

¿Según Stokes, et al. la mortalidad de los pacientes puede ser tan alta como el 20% para los pacientes que experimentan qué?

Seleccione una:

- a. Sin sangrado intraoperatorio
- b. Sangrado intraoperatorio leve
- c. Sangrado intraoperatorio grave**

Respuesta correcta

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

¿Qué palabra falta en esta descripción?

La hemostasia primaria es un proceso en gran parte _____

Seleccione una:

- a. Químico
- b. Artificial

c. Mecánico

Respuesta correcta

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

¿Verdadero o falso? Después de la cirugía ginecológica, las adherencias intraperitoneales se forman en 55% a 100% de los pacientes

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Respuesta correcta

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

¿Verdadero o falso? La vía común es independiente de las vías intrínsecas o extrínsecas por encima de ella

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Respuesta correcta

Pregunta 6

Parcialmente correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

¿Cómo podría ayudar [la Escala VIBe](#) a los médicos? Marque todo lo que corresponda

Seleccione una o más de una:

- a. [La Escala VIBe](#) permite identificar, comunicar y tratar de manera eficiente el sangrado intraoperatorio
- b. [La Escala VIBe](#) permite identificar y etiquetar eficientemente la pérdida total de sangre intraoperatoria**
- c. [La Escala VIBe](#) puede ayudar a la evaluación, selección y uso adecuado de agentes hemostáticos**
- d. [La Escala VIBe](#) crea un lenguaje común dentro del equipo del quirófano**

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos factores de riesgo podrían predisponer a un paciente al sangrado intraoperatorio? Marque todos los que correspondan

Seleccione una o más de una:

- a. Uso de medicamentos antiplaquetarios**
- b. Elección del abordaje quirúrgico**
- c. El gusto del cirujano por la música
- d. Comorbilidades de los pacientes, incluyendo diabetes y tabaquismo**
- e. Mala calidad del tejido**

Respuesta correcta

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

Complete esta declaración con la opción correcta. Agentes

ACTIVOS_____

Seleccione una:

a. Funcionan independientemente del estado de coagulación de los pacientes

b. Su funcionamiento depende del estado de coagulación de los pacientes

Respuesta correcta

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

¿Qué es [la Escala VIBe](#)?

Seleccione una:

a. [La Escala VIBe](#) permite identificar, comunicar y tratar de manera eficiente el sangrado intraoperatorio

b. La Escala VIBe es la primera escala validada por el cirujano diseñada para una evaluación consistente y confiable de la gravedad del sangrado intraoperatorio.

c. [La Escala VIBe](#) es una escala no validada diseñada para una evaluación consistente y confiable de la gravedad del sangrado intraoperatorio.

Respuesta correcta

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes podría ser una consecuencia de un sangrado quirúrgico inesperado?

Seleccione una:

- a. Aumento de la duración de la estancia
- b. Necesidad de transfusión de sangre
- c. Mayores costes de tratamiento

d. Todas

Respuesta correcta

Pregunta **11**

Parcialmente correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles de estos productos se clasifican como hemostáticos PASIVOS? Marque todo lo que corresponda

Seleccione una o más de una:

a. Celulosa oxidada

b. Colágenos

c. Sellante de fibrina

d. Matriz hemostática fluida de gelatina y trombina

e. Esferas de polisacáridos

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

Seleccione la opción correcta para completar esta declaración:

Los hemostáticos adyuvantes pueden indicarse cuando los métodos convencionales son

Seleccione una:

- a. No disponible o ineficaz
- b. Poco práctico o ineficaz**
- c. Imposible o no disponible

Respuesta correcta

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

¿Qué respuesta describe mejor los hemostáticos adyuvantes?

Seleccione una:

- a. Son un costoso último recurso
- b. Cuando se usan adecuadamente, pueden ser de acción rápida, rentables y mejorar los resultados de los pacientes**

Respuesta correcta

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

El estudio de Piek comparó los procedimientos de neurocirugía con y sin fugas de líquido cefalorraquídeo (LCR).

¿Cuánto aumentaron los costes por procedimiento cuando se involucró una fuga de líquido cefalorraquídeo?

Seleccione una:

- a. Aproximadamente el 40%**
- b. Aproximadamente el 30%
- c. Aproximadamente el 20%

Respuesta correcta

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto tiempo después de un procedimiento quirúrgico se desarrollan adherencias postoperatorias?

Seleccione una:

- a. Las adherencias comienzan durante las primeras 24 horas. No se desarrollarán nuevas adherencias después del día 3
- b. Las adherencias comienzan durante las primeras 48 horas. No se desarrollarán nuevas adherencias después del día 5
- c. Las adherencias comienzan durante las primeras 24 horas. No se desarrollarán nuevas adherencias después del día 7**
- d. Las adherencias comienzan durante las primeras 72 horas. No se desarrollarán nuevas adherencias después del día 10

Respuesta correcta

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

¿Aproximadamente cuántos pacientes quirúrgicos experimentan una complicación relacionada con el sangrado?

Seleccione una:

- a. 1 de cada 15 pacientes
- b. 1 de cada 10 pacientes
- c. 1 de cada 7 pacientes
- d. 1 de cada 3 pacientes**

Respuesta correcta

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles de las siguientes complicaciones están asociadas con las adherencias? Marque todas las que correspondan

Seleccione una o más de una:

a. Obstrucción del intestino delgado

b. Simplificación de futuras cirugías

c. Esterilidad

d. Dolor crónico

Respuesta correcta

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

¿Qué palabra falta en esta declaración? _____ puede causar molestias al paciente, movimiento restringido de las estructuras internas o consecuencias más graves, como problemas de fertilidad en pacientes de ginecología

Seleccione una:

a. Dehiscencia

b. Adherencias postquirúrgicas

c. Evisceración

d. Fuga de líquido cefalorraquídeo

Respuesta correcta

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

La efectividad de los hemostáticos pasivos se limita a sangrados _____

Seleccione una:

- a. Severos
- b. Arteriales
- c. Menores**

Respuesta correcta

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Enunciado de la pregunta

¿Después de la colectomía, la obstrucción adherencial del intestino delgado se desarrollará en cuántos pacientes?

Seleccione una:

- a. 1 de cada 10 pacientes**
- b. 1 de cada 30 pacientes
- c. 1 de cada 50 pacientes

Respuesta correcta