

[Página Principal](#) » [Mis cursos](#) » [AV.P036 G 24](#) » Evaluación Mayo »[Curso: Valoración y cuidados de enfermería al niño con deterioro de la piel](#)

Comenzado el	miércoles, 8 de mayo de 2024, 21:14
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 8 de mayo de 2024, 22:39
Tiempo empleado	1 hora 24 minutos
Puntos	26,00/30,00
Calificación	8,67 de 10,00 (86,67%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Lucía es una niña de 8 años que acude a la consulta de su enfermera de Atención Primaria tras recibir el alta hospitalaria por apendicectomía. Presenta una herida en el abdomen considerada contaminada limpia. Según el grado y la probabilidad de contaminación, una herida es de tipo contaminada limpia cuando:

Seleccione una:

- ☐ a. Tiene tejido muerto.
- ☒ b. Son heridas quirúrgicas que han afectado a vías respiratorias, alimentarias, genitales o urinarias y no presentan signos de infección. ✓
- ☐ c. Son heridas quirúrgicas en las que se ha violado de manera importante el campo estéril.
- ☐ d. Muestran signos de inflamación.

La respuesta correcta es: Son heridas quirúrgicas que han afectado a vías respiratorias, alimentarias, genitales o urinarias y no presentan signos de infección.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La herida en la que los tejidos se rasgan con bordes irregulares, es la producida por:

Seleccione una:

- ☒ a. Laceración. ✓
- ☐ b. Contusión.
- ☐ c. Abrasión.
- ☐ d. Incisión.

La respuesta correcta es: Laceración.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los cuidados de prevención de úlceras por presión está CONTRAINDICADO:

Seleccione una:

- ☐ a. Incrementar la ingesta de proteínas.
- ☐ b. Mojar la piel.
- ☐ c. Proporcionar alimentos azucarados.
- ☒ d. Masajear las prominencias óseas con jabón. ✓

La respuesta correcta es: Masajear las prominencias óseas con jabón.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Alfredo tiene una úlcera por presión irregular, con gran cantidad de exudado y sin tejido necrótico. Señale que apósito estaría indicado para absorber el exudado y rellenar el espacio muerto:

Seleccione una:

- ☐ a. Hidrogel.
- ☒ b. Alginato. ✓
- ☐ c. Hidrocoloide.
- ☐ d. Gasas vaselinadas.

La respuesta correcta es: Alginato.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La úlcera por presión de un paciente que está cavitada, presenta una gran cantidad de exudado y apenas hay tejido necrótico. El apósito indicado es:

Seleccione una:

- ☐ a. Hidrocoloide.
- ☒ b. Alginato. ✓
- ☐ c. Transparente semipermeable.
- ☐ d. Acrílico absorbente trasparente.

La respuesta correcta es: Alginato.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al valorar la úlcera por presión de Ana, observa una serie de características que la hace susceptible de ser tratada con un apósito hidrocoloide EXCEPTO por una de ellas:

Seleccione una:

- ☐ a. La úlcera es dolorosa.
- ☐ b. Tiene ligero olor.
- ☐ c. El drenaje es lento y moderado.
- ☒ d. Está infectada. ✓

La respuesta correcta es: Está infectada.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique cuál de las siguientes suturas quirúrgicas es absorbible:

Seleccione una:

- ☐ a. Seda.
- ☒ b. Ácido poliglicólico. ✓
- ☐ c. Poliéster.
- ☐ d. Polipropileno.

La respuesta correcta es: Ácido poliglicólico.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Uno de los factores que promueven la cicatrización de una herida quirúrgica es:

Seleccione una:

- ☐ a. Actividad intensa del paciente.
- ☐ b. Aplicación de compresas calientes en incisiones edematosas.
- ☒ c. Respiraciones profundas periódicas. ✓
- ☐ d. Administración de esteroides.

La respuesta correcta es: Respiraciones profundas periódicas.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes acciones para eliminar el vello favorece una mayor incidencia de infección de la herida quirúrgica?:

Seleccione una:

- ☐ a. Rasurar la piel con cuchilla inmediatamente antes de la cirugía.
- ☒ b. Rasurar la piel con cuchilla el día anterior a la cirugía. ✓
- ☐ c. Rasurar la piel con maquinilla eléctrica inmediatamente antes de la cirugía.
- ☐ d. Aplicar crema depilatoria inmediatamente antes de la cirugía.

La respuesta correcta es: Rasurar la piel con cuchilla el día anterior a la cirugía.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la historia clínica de un paciente postquirúrgico se cita “cicatrización por tercera intención”. La interpretación es que se trata de:

Seleccione una:

- ☒ a. Una herida contaminada que se deja abierta y se sutura después de controlar la infección. ✓
- ☐ b. Una herida irregular con separación amplia de bordes, en la que el proceso de cicatrización es lento y la granulación se hace desde el fondo hacia la superficie, resultando cicatriz aparente.
- ☐ c. Una cicatriz con profusión de tejido que se extiende más allá de los bordes de la herida.
- ☐ d. Una separación de los bordes de una herida previamente unida.

La respuesta correcta es: Una herida contaminada que se deja abierta y se sutura después de controlar la infección.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la clasificación-estadía de las úlceras por presión, el GNEAUPP y el NPUAP-EPUAPPPPIA refieren una categoría denominada “lesión de tejidos profundos” con unas características muy definidas. ¿A qué son debidas este tipo de lesiones?:

Seleccione una:

- ☐ a. A la acción de la presión.
- ☐ b. A la acción combinada de la presión y la humedad.
- ☒ c. A la acción combinada de presión y cizalla. ✓
- ☐ d. A la acción de la fricción en combinación con la presión.

La respuesta correcta es: A la acción combinada de presión y cizalla.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La localización de úlceras por presión en niños cambia en función de la edad. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo de presentar lesiones en menores de 3 años?:

Seleccione una:

- ☒ a. Occipucio y orejas. ✓
- ☐ b. Talones y zona sacra.
- ☐ c. Nariz y talones.
- ☐ d. Cara y talones.

La respuesta correcta es: Occipucio y orejas.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique la opción correcta, en relación a la retirada de una garrapata anclada a la piel:

Seleccione una:

- ☐ a. Aplicaremos una solución sobre la garrapata que no permita que respire, alcohol o vaselina, y esperaremos a que se desprenda, aplicando posteriormente desinfectante.
- ☐ b. Desinfectaremos previamente la zona de trabajo y con pinzas de borde romo giraremos y traccionaremos de la garrapata, aplicando posteriormente desinfectante.
- ☐ c. Sujetaremos el cuerpo de la garrapata con pinzas de borde romo, apretándola ligeramente con el fin de desprenderla, mientras giramos y traccionamos de ella, aplicando posteriormente desinfectante.
- ☒ d. Mediante pinzas de borde romo, sujetaremos la garrapata lo más cerca de la piel, traccionaremos lentamente de forma constante, aplicando posteriormente desinfectante. ✓

La respuesta correcta es: Mediante pinzas de borde romo, sujetaremos la garrapata lo más cerca de la piel, traccionaremos lentamente de forma constante, aplicando posteriormente desinfectante.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ante un paciente con epidermólisis bullosa que presenta heridas altamente exudativas se recomienda proteger la piel perilesional mediante:

Seleccione una:

- ☒ a. Películas barrera no irritantes o pomadas a base de óxido de zinc. ✓
- ☐ b. Apósitos hidrocoloides.
- ☐ c. Apósitos de film de poliuretano.
- ☐ d. Povidona iodada en solución.

La respuesta correcta es: Películas barrera no irritantes o pomadas a base de óxido de zinc.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué no está recomendado para prevenir la dermatitis del pañal?:

Seleccione una:

- ☐ a. Uso de cremas barrera ante leves irritaciones.
- ☒ b. Uso de pañales de tela. ✓
- ☐ c. Airear la zona de pañal entre cambios de pañal.
- ☐ d. Disminuir la ingesta hídrica.

La respuesta correcta es: Uso de pañales de tela.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el sistema de clasificación de las Úlceras por presión propuesto por el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP) y el Panel Consultivo Nacional para las Úlceras por Presión (NPUAP) y el Panel Consultivo Europeo para las Úlceras por Presión (EPUAP), se define como Úlcera por presión de categoría II:

Seleccione una:

- ☐ a. La pérdida de espesor parcial de la dermis que se presenta como una úlcera abierta muy profunda con un lecho de la herida entre rosado y rojizo, con esfacelos. También puede presentarse como una ampolla intacta o abierta/rota llena de suero o de suero sanguinolento.
- ☒ b. La pérdida de espesor parcial de la dermis que se presenta como una úlcera abierta poco profunda con un lecho de la herida abierta entre rosado y rojizo, sin esfacelos. También puede presentarse como una ampolla intacta o abierta/rota llena de suero o de suero sanguinolento. ✓
- ☐ c. La pérdida completa del grosor del tejido. La grasa subcutánea puede resultar visible, pero los huesos, tendones o músculos no se encuentran expuestos. Pueden aparecer esfacelos. Puede incluir cavitaciones y tunelizaciones.
- ☐ d. La pérdida total del espesor del tejido con hueso, tendón o músculo expuestos. Pueden aparecer esfacelos o escaras. Incluye a menudo cavitaciones y tunelizaciones.

La respuesta correcta es: La pérdida de espesor parcial de la dermis que se presenta como una úlcera abierta poco profunda con un lecho de la herida abierta entre rosado y rojizo, sin esfacelos. También puede presentarse como una ampolla intacta o abierta/rota llena de suero o de suero sanguinolento.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aspectos hemos de tener en cuenta a la hora de valorar la piel del niño en riesgo de desarrollar Úlceras por Presión?:

Seleccione una:

- ☐ a. La textura, coloración, presencia de lesiones.
- ☐ b. Valorar la piel sobre las prominencias óseas, decoloración de la piel, aumento de temperatura.
- ☐ c. Ausencia de dolor, dureza en la zona y eritema no blanqueable.
- ☒ d. Presencia de eritema, calor, edema, induración, dolor y localización. ✓

La respuesta correcta es: Presencia de eritema, calor, edema, induración, dolor y localización.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la opción correcta ante la actitud a tomar frente a una herida con tejido desvitalizado que va a ser sometida a desbridamiento cortante:

Seleccione una:

- ☒ a. Debemos retirar los restos del antiséptico utilizado con agua bidestilada, solución salina o ringer lactato. ✓
- ☐ b. No existen evidencias que justifiquen el uso de anestésicos locales a la hora de realizar un desbridamiento cortante.
- ☐ c. Debemos realizar cortes por planos comenzando por los bordes de la herida y avanzar hacia el centro de esta.
- ☐ d. El sangrado facilita la recuperación de la herida al permitir la llegada de sustancias reparadoras al lecho.

La respuesta correcta es: Debemos retirar los restos del antiséptico utilizado con agua bidestilada, solución salina o ringer lactato.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP) y la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), a través del proyecto Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España, coordinado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, recomiendan:

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar masajes sobre prominencias óseas con piel integra para la prevención de las úlceras por presión.
- ☒ b. No utilizar flotadores para la prevención de las úlceras por presión. ✓
- ☐ c. Utilizar de forma rutinaria povidona yodada en niños menores de dos años como antiséptico de elección frente a otros de carácter fungicida.
- ☐ d. Aplicar de manera habitual clorhexidina para limpiar las heridas crónicas para disminuir la carga bacteriana.

La respuesta correcta es: No utilizar flotadores para la prevención de las úlceras por presión.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un anestésico local está indicado en el tratamiento de las arritmias ventriculares, como aquellas que resultan de un infarto agudo de miocardio, toxicidad por digital, cirugía cardíaca o cateterismo cardíaco. Se trata de:

Seleccione una:

- ☐ a. Bupivacaína.
- ☒ b. Lidocaína. ✓
- ☐ c. Mepivacaína.
- ☐ d. Procaína.

La respuesta correcta es: Lidocaína.

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta correcta. Cuando se aplican apósitos de plata en el tratamiento de las heridas, ¿cuál es la función principal de los mismos entre las siguientes respuestas?:

Seleccione una:

- ☒ a. Reducir la carga microbiana en heridas agudas o crónicas infectadas. ✓
- ☐ b. Impedir la barrera antimicrobiana en heridas agudas o crónicas infectadas.
- ☐ c. Eliminar el olor de las heridas crónicas.
- ☐ d. Eliminar el exudado de las heridas crónicas.

La respuesta correcta es: Reducir la carga microbiana en heridas agudas o crónicas infectadas.

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Elija respuesta correcta en relación al desbridamiento autolítico:

Seleccione una:

- ☒ a. Las células encargadas del desbridamiento autolítico son los macrófagos y fagocitos. ✓
- ☐ b. Ocurre de forma natural en todas las heridas, pero puede inhibirse por el uso de hidrogeles de estructura amorfa.
- ☐ c. Una de las ventajas es que presenta una acción más corta en el tiempo.
- ☐ d. Constituye un tipo de desbridamiento traumático y poco selectivo.

La respuesta correcta es: Las células encargadas del desbridamiento autolítico son los macrófagos y fagocitos.

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué profilaxis antitetánica indicaría a un adolescente de 12 años que ha sufrido un pinchazo accidental con un clavo en la calle, si el paciente ya está vacunado con 4 dosis de vacuna antitetánica (última dosis hace 7 años)?

Seleccione una:

- ☐ a. No precisa profilaxis antitetánica.
- ☒ b. Requiere una dosis de vacuna antitetánica (dT/dTpa). ✓
- ☐ c. Requiere una dosis de vacuna antitetánica (dT/dTpa) y una dosis de inmunoglobulina antitetánica.
- ☐ d. Solo requiere inmunoglobulina antitetánica.

La respuesta correcta es: Requiere una dosis de vacuna antitetánica (dT/dTpa).

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la afirmación correcta en relación a las úlceras por presión:

Seleccione una:

- ☐ a. En la escala de Norton, puntuaciones altas indican un mayor riesgo de desarrollar úlceras por presión.
- ☐ b. La única escala validada para población pediátrica es la escala NSRAS de riesgo neonatal.
- ☒ c. Se ha de realizar la cura en ambiente húmedo (CAH), ya que los materiales empleados han demostrado una mejor reparación de la integridad cutánea que el tratamiento en ambiente seco, además de ser más costo-efectivos y gestionar mejor el exudado. ✓
- ☐ d. Como norma, se debe limpiar la úlcera por presión con antisépticos locales.

La respuesta correcta es: Se ha de realizar la cura en ambiente húmedo (CAH), ya que los materiales empleados han demostrado una mejor reparación de la integridad cutánea que el tratamiento en ambiente seco, además de ser más costo-efectivos y gestionar mejor el exudado.

Pregunta

25

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Con respecto a las suturas, cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

Seleccione una:

- ☒ a. Hay que tener en cuenta que mayor grosor no siempre implica mayor resistencia; sólo será más resistente si se trata del mismo material. ✗
- ☐ b. Debe utilizarse el grosor mínimo de sutura que permita asumir la tensión del procedimiento. Cada sutura, en función del material que la compone, soportará tensiones mayores o menores. Cuanto menor sea el grosor, menor será el traumatismo tisular.
- ☐ c. La resistencia se mide según la tensión que la sutura es capaz de soportar, tras ser anudada, antes de romperse.
- ☐ d. El grosor de la sutura se mide por un sistema de ceros. La sutura de menor diámetro es aquella que menor número de ceros contiene en su numeración.

La respuesta correcta es: El grosor de la sutura se mide por un sistema de ceros. La sutura de menor diámetro es aquella que menor número de ceros contiene en su numeración.

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una característica utilizada en la valoración de la cicatrización por segunda intención en una herida quirúrgica?:

Seleccione una:

- ☐ a. Exudado o tejido necrótico.
- ☐ b. Bordes de la herida.
- ☒ c. Tipo de sutura. ✓
- ☐ d. Tejido de granulación.

La respuesta correcta es: Tipo de sutura.

Pregunta

27

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué escala no usarías para valorar el grado de dolor durante la cura de una herida quirúrgica en un niño?:

Seleccione una:

- ☒ a. Escala de caras. ✗
- ☐ b. Sistema de puntuación FLACC.
- ☐ c. Escala Likert.
- ☐ d. Score de Finnegan.

La respuesta correcta es: Score de Finnegan.

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación a la dermatitis del pañal, indique la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Las lesiones eritematosas aparecen inicialmente en las zonas convexas que tienen un contacto más directo con el pañal, como son: los genitales externos, las nalgas, los muslos y el periné. ✓
- ☐ b. Es conveniente el uso profiláctico de cremas con corticoides suaves.
- ☐ c. El número de cambios de pañal NO tiene repercusión en el desarrollo de la dermatitis del pañal.
- ☐ d. Usar siempre productos barrera para la protección de la piel sana.

La respuesta correcta es: Las lesiones eritematosas aparecen inicialmente en las zonas convexas que tienen un contacto más directo con el pañal, como son: los genitales externos, las nalgas, los muslos y el periné.

Pregunta

29

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ a. El granuloma piógeno es un tumor vascular pedunculado, que suele sangrar con pequeños roces. ✗
- ☐ b. Las verrugas están producidas por el VPH y son frecuentes en la infancia.
- ☐ c. Existen enfermedades y síndromes genéticos que se manifiestan con lesiones cutáneas.
- ☐ d. Los hemangiomas infantiles están presentes desde el nacimiento y hasta la edad adulta.

La respuesta correcta es: Los hemangiomas infantiles están presentes desde el nacimiento y hasta la edad adulta.

Pregunta

30

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Señale la respuesta correcta respecto al gel LAT:

Seleccione una:

- ☐ a. Está indicado su uso en heridas pequeñas evitando partes acras (labios, dedos, párpados).
- ☐ b. Tiene un inicio de acción de pocos minutos.
- ☐ c. Se aplica en el lecho de la herida y tapa con apósito oclusivo.
- ☒ d. Se debe realizar la limpieza e inspección de la herida antes de aplicarlo. ✖

La respuesta correcta es: Está indicado su uso en heridas pequeñas evitando partes acras (labios, dedos, párpados).

Actividad previa

◀ Documento en PDF

Ir a...

Siguiente actividad

Encuesta de satisfacción del alumnado ►

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>