

[Página Principal](#) » [Mis cursos](#) » [AV.Q078_24](#) » [Evaluación Mayo](#) »

[Curso: Cuidados enfermeros en las urgencias digestivas en el ámbito asistencial de las emergencias extrahospitalarias](#)

Comenzado el	jueves, 16 de mayo de 2024, 10:59
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 16 de mayo de 2024, 11:41
Tiempo empleado	41 minutos 19 segundos
Puntos	29,00/30,00
Calificación	9,67 de 10,00 (96,67%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes, ¿Cuál no es considerado un signo/síntoma perteneciente a la valoración de las patologías digestivas?

Seleccione una:

- a. Hemorragia y dolor abdominal.
- b. Ictericia y fiebre.
- c. Náuseas, vómitos y diarrea.
- d. Bradipnea y empleo de musculatura intercostal. ✓

La respuesta correcta es: Bradipnea y empleo de musculatura intercostal.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes no suele ser causa de dolor abdominal?

Seleccione una:

- a. Pancreatitis.
- b. Edema maleolar. ✓
- c. Aneurisma aórtico abdominal.
- d. Enfermedad de Crohn.

La respuesta correcta es: Edema maleolar.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes opciones, ¿cuál se considera riesgo vital en relación al dolor abdominal?

Seleccione una:

- a. Rotura de aneurisma de aorta abdominal. ✓
- b. Ictericia.
- c. Colitis ulcerosa.
- d. Ascitis.

La respuesta correcta es: Rotura de aneurisma de aorta abdominal.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El dolor abdominal sin posición antiálgica, producido por la distensión de las terminaciones nerviosas que rodean los órganos internos y vísceras. El cual, es típico que se refiera en forma de calambre, cólico o sensación de gases, se denomina:

Seleccione una:

- a. Dolor somático.
- b. Dolor irradiado.
- c. Dolor visceral. ✓
- d. Dolor difuso.

La respuesta correcta es: Dolor visceral.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un hematoma en ombligo con probable relación con una pancreatitis hemorrágica o embarazo ectópico, se corresponde a:

Seleccione una:

- a. Signo de Rovsing negativo.
- b. Signo de Grey Turner positivo.
- c. Signo de Cullen positivo. ✓
- d. Signo de Murphy negativo.

La respuesta correcta es: Signo de Cullen positivo.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El signo de Grey Turner se observa por:

Seleccione una:

- a. Hematoma subcutáneo en el costado por hemorragia pancreática.
- b. Hematoma esternal por úlcera digestiva.
- c. Hematoma en ombligo por pancreatitis hemorrágica o embarazo ectópico.
- d. Hematoma subcutáneo en el costado por hemorragia retroperitoneal. ✓

La respuesta correcta es: Hematoma subcutáneo en el costado por hemorragia retroperitoneal.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El dolor que se alivia al comer, suele estar relacionado con:

Seleccione una:

- a. Gastroenteritis aguda.
- b. Peritonitis.
- c. Pancreatitis.
- d. Úlcera gástrica. ✓

La respuesta correcta es: Úlcera gástrica.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un dolor que es característico de la apendicitis aguda que se produce mientras se palpa o se percute la fosa iliaca izquierda, se corresponde con:

Seleccione una:

- a. Signo de Kehr.
- b. Signo de Rovsing. ✓
- c. Signo de Murphy.
- d. Signo de Cullen.

La respuesta correcta es: Signo de Rovsing.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un vómito que presenta acumulaciones de contenido gástrico de color marrón oscuro, podría corresponder a qué tipo de vómito:

Seleccione una:

- a. Vómito en posos de café. ✓
- b. Vómito bilioso.
- c. Vómitos por hemorragia digestiva alta.
- d. Vómito por GEA.

La respuesta correcta es: Vómito en posos de café.

Pregunta

10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las melenas se caracterizan por:

Seleccione una:

- a. Ser heces bien conformadas mezcladas con sangre. El origen está por debajo del ángulo de Treitz. ✗
- b. Expulsar sangre roja por el ano, con o sin la deposición.
- c. Ser heces negras, pegajosas malolientes y de aspecto alquitranado.
- d. Ser vómitos de sangre roja, marrón o negra en "posos de café."

La respuesta correcta es: Ser heces negras, pegajosas malolientes y de aspecto alquitranado.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El esófago presenta tres estrecheces anatómicas donde suelen impactarse los cuerpos extraños. De las siguientes áreas, ¿cuál no es una de esas?:

Seleccione una:

- a. Arco aórtico.
- b. Esfínter pilórico. ✓
- c. Esfínter esofágico superior.
- d. Hiato diafragmático.

La respuesta correcta es: Esfínter pilórico.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las complicaciones asociadas a la ingesta de cuerpos extraños son (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Bacteriemia.
- b. Laceraciones y perforaciones.
- c. Obstrucción intestinal y úlceras.
- d. Diarreas y vómitos. ✓

La respuesta correcta es: Diarreas y vómitos.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El síndrome de Boerhaave, es una causa espontánea asociada a:

Seleccione una:

- a. Edema y ascitis.
- b. Pancreatitis.
- c. Perforación esofágica aguda. ✓
- d. Colitis ulcerosa.

La respuesta correcta es: Perforación esofágica aguda.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sintomatología se correspondería con una perforación cervical de esófago?

Seleccione una:

- a. Dolor retroesternal/epigástrico, disnea, enfisema subcutáneo cervical o mediastínico, MEG, fiebre y neumotórax.
- b. Dolor, disfagia, sialorrea, enfisema subcutáneo y tumoración cervical. ✓
- c. Dolor epigástrico/ retroesternal, omalgia, neumomediastino, neumoperitoneo, disnea, reacción peritoneal, MEG y fiebre.
- d. Dolor mesogástrico, tumoración cervical, disartria y hemorragia.

La respuesta correcta es: Dolor, disfagia, sialorrea, enfisema subcutáneo y tumoración cervical.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una afectación de la capa submucosa y muscular a nivel gastrointestinal, donde los fenómenos de reparación cicatricial a menudo conducen a la aparición de estenosis únicas o múltiples dentro de las 8 semanas. Cuya manifestación suele ser sangrado y exudación. ¿A qué grado pertenecerían las lesiones que se corresponden con esta descripción dentro de la clasificación de las lesiones gastrointestinales por cáusticos?

Seleccione una:

- a. Grado I.
- b. Grado IV.
- c. Grado III.
- d. Grado II. ✓

La respuesta correcta es: Grado II.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las manifestaciones tardías de las lesiones por ingesta de cáusticos suelen aparecer:

Seleccione una:

- a. A los días.
- b. En las primeras 2 semanas tras la ingesta.
- c. Tras 4 a 6 semanas tras la ingesta. ✓
- d. No suele haber complicaciones tardías de la ingesta de cáusticos.

La respuesta correcta es: Tras 4 a 6 semanas tras la ingesta.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique la incorrecta respecto al tratamiento ante la ingesta de cáusticos:

Seleccione una:

- a. Si ingesta de pilas extracción de las mismas mediante gastroscopia.
- b. Administrar inhibidores de la bomba de protones y no usar antibióticos de forma profiláctica.
- c. Inducción del vómito. ✓
- d. Uso de corticoides en lesiones grado IIb y III en caso de edema laríngeo.

La respuesta correcta es: Inducción del vómito.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un paciente presenta reflujo gastroesofágico, ¿cuáles serán las recomendaciones higiénico-dietéticas que se le indicarán? Señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Evitar tabaco, café y alcohol.
- b. Evitar la toma de diltiazem, benzodiazepinas, morfina, barbitúricos...es decir, aquellos que relajen el cardias.
- c. Toma de procinéticos que aceleren el vaciamiento gástrico.
- d. Dieta hipercalórica, poco copiosa. ✓

La respuesta correcta es: Dieta hipercalórica, poco copiosa.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué punto anatómico diferencia el tipo de hemorragia en alta o baja?:

Seleccione una:

- a. El punto cístico.
- b. Triángulo de Willis.
- c. El fondo abdominoestomacal.
- d. El ángulo de Treitz. ✓

La respuesta correcta es: El ángulo de Treitz.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una HDA se manifiesta clínicamente con (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Hematemesis.
- b. Melenas.
- c. "Posos de café".
- d. Hematoquecia. ✓

La respuesta correcta es: Hematoquecia.

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las causas de origen colónico de las HDB pueden ser (indique la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Síndrome Mallory-Weiss. ✓
- b. Divertículos.
- c. Neoplasias.
- d. Colitis por AINES.

La respuesta correcta es: Síndrome Mallory-Weiss.

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique la falsa, respecto a los cuidados enfermeros en relación a las hemorragias digestivas:

Seleccione una:

- a. Reposición de volemia: es la intervención primordial, con suero isotónico, Ringer Lactato, hemoderivados, etc.
- b. Valoración del estado hemodinámico y de constantes vitales: TA, FC, Tª y SpO2.
- c. Si se produce hemorragia o nuevos episodios observar sus características: coloración, cantidad, mezcla con alimentos o heces.
- d. Realizar lavados gástricos a través de SNG siempre, incluso en pacientes con cirugías previas. ✓

La respuesta correcta es: Realizar lavados gástricos a través de SNG siempre, incluso en pacientes con cirugías previas.

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique la respuesta correcta respecto al manejo de la GEA:

Seleccione una:

- a. En las GEAs leves se aconseja la rehidratación oral con suero oral hiposódico, evitando las bebidas isotónicas para deportistas, ya que contienen proporciones de sales y azúcares inadecuadas para la reposición electrolítica en casos de GEA.
- b. Parte del tratamiento habitual de las GEAs será el uso de ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas o cotrimoxazol 800/160 mg cada 12 horas VO durante 1 semana. Cuando se conoce el patógeno causante, se emplearán tratamientos específicos. ✓
- c. Tras mejoría de una GEA moderada o grave se reanuda dieta astringente de forma progresiva según tolerancia oral (arroz, galletas saladas, pan tostado, pasta, patatas, plátanos), evitando lácteos la primera semana, excepto yogur.
- d. El uso de antidiarreicos está contraindicado en diarreas disintéricas. En el resto de los casos solo tomar en caso de que la diarrea sea muy molesta, sino se recomienda solo la repleción de líquidos.

La respuesta correcta es: Parte del tratamiento habitual de las GEAs será el uso de ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas o cotrimoxazol 800/160 mg cada 12 horas VO durante 1 semana. Cuando se conoce el patógeno causante, se emplearán tratamientos específicos.

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes, no forma parte de la clínica inicial de la obstrucción intestinal?

Seleccione una:

- a. Deshidratación y sed.
- b. Dolor abdominal tipo cólico.
- c. Distensión abdominal y ausencias de emisión de heces y gases.
- d. Fiebre. ✓

La respuesta correcta es: Fiebre.

Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para determinar a qué altura puede encontrarse la obstrucción intestinal las características de los vómitos pueden ayudar a determinarlo. ¿Cómo serían los vómitos asociados a una obstrucción intestinal alta?:

Seleccione una:

- a. Vómitos fecaloideos.
- b. Vómitos escasos o ausencia de vómitos.
- c. Vómitos abundantes, claros y alimentarios. ✓
- d. Vómitos de contenido bilioso.

La respuesta correcta es: Vómitos abundantes, claros y alimentarios.

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué se debe el íleo paralítico o funcional?:

Seleccione una:

- a. Debido a bridas de cirugías abdominales previas o hernias inguinocrurales.
- b. Debido a procesos intra o extra abdominales que producen abolición del peristaltismo intestinal tales como pancreatitis, isquemia intestinal, etc. ✓
- c. Debido a tumores, vólvulos o fecalomas.
- d. Debido a procesos infecciosos.

La respuesta correcta es: Debido a procesos intra o extra abdominales que producen abolición del peristaltismo intestinal tales como pancreatitis, isquemia intestinal, etc.

Pregunta

27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente de 60 años con un recuento leucocitario 22500/mm³, una glucosa sérica de 273 mg/dl, calcio 3.7 mg/dl y un nitrógeno ureico en sangre de 7.2 mg/dl será considerado como (según la escala de Ranson):

Seleccione una:

- a. Una pancreatitis leve.
- b. Una obstrucción intestinal.
- c. Una pancreatitis severa con mayor riesgo de mortalidad. ✓
- d. Una colitis ulcerosa.

La respuesta correcta es: Una pancreatitis severa con mayor riesgo de mortalidad.

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El tratamiento de la pancreatitis consistirá en (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- a. En estadios avanzados de la enfermedad, la reposición adecuada de volumen se ha asociado a una reducción de la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. ✓
- b. Control del dolor: por lo general, el síntoma característico de esta enfermedad es el dolor, por lo que el manejo ha de ser adecuado. La reposición adecuada de volumen puede mejorar el dolor al evitar la isquemia y acidosis láctica derivada de la hemoconcentración y depleción vascular.
- c. Reposición de líquidos agresiva de volumen (5- 10 ml/kg/h de RL o SSF en casos leves o 20ml/kg en 30 min seguidos de 3 ml/kg/h si se acompaña de taquicardia e hipotensión), salvo que existan contraindicaciones.
- d. Dieta absoluta, profilaxis con omeprazol/pantoprazol (evitar hemorragia digestiva), profilaxis antibiótica y corrección de la acidosis metabólica.

La respuesta correcta es: En estadios avanzados de la enfermedad, la reposición adecuada de volumen se ha asociado a una reducción de la morbilidad y la mortalidad de los pacientes.

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los cuidados enfermeros de la encefalopatía hepática, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Toma de constantes vitales: TA, FC, Tª, satO2 y glucemia, junto con estabilización de la vía aérea.
- b. Valoración del nivel de consciencia mediante la escala de Glasgow y la escala de
- c. Perfundir SG 10% para prevenir la hipoglucemia alternando con SSF 0.9% (2000 ml/día).
- d. Favorecer el estreñimiento para evitar deshidratación por diarreas. ✓

La respuesta correcta es: Favorecer el estreñimiento para evitar deshidratación por diarreas.

Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes, ¿Cuál es una causa de ascitis con hipertensión portal?

Seleccione una:

- a. Síndrome de Meigs.
- b. Hepatitis aguda alcohólica. ✓
- c. Síndrome nefrótico.
- d. Hipoalbuminemia por desnutrición.

La respuesta correcta es: Hepatitis aguda alcohólica.

Actividad previa

◀ Documento en PDF

Ir a...

Siguiente actividad

Encuesta de satisfacción del alumnado ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>